

055363

12. 28,890/A/3
81. A.X.O.4

~~CB~~

Presented
by
Dr. Lema

~~372~~ 15924
129

34/5706





HIPPOCRATIS COI

*Genuina effigies ex antiquo numismate
græco Constantinopoli reperto.*

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ,
HIPPOCRATIS
APHORISMI,

Variorum Auctorum, maxime
HIPPOCRATIS & CELSI,
Locis Parallelis Illustrati.

Subjiciuntur

CELSI SENTENTIÆ.

Studio & cura

THEODORI JANSSONII
ab ALMELOVEEN, M. D.

Editio nova diligenter correctæ.

ARGENTORATI,

Apud AMANDUM KÖNIG.
CLIO MDCC LVI.

DEDICATIO.

nisi Tibi , Vir Eruditissime , inscribi debere lubens agnosco. Si enim ipsum respiciam volumen , cui æquius præceptoris offerre possum monita, quam Tibi a quo & ipse non pauca studiorum cursu percepi saluberrima. Si verò meum qualemcunque intuear laborem , is ipse , utpote diligentioris lectionis & cum Celso collatio-

DEDICATIO.

lationis , quandoquidem in collegiis ea exponenda præscribere nobis solebas , auctorem , Te flagitare videtur. Dabis itaque hoc bene mereri de Te cupienti discipulo , & me , ut spero , amare perges. *Vale.*

THEODOR. JANSSON.

A B

ALMELOVEEN
BENIVOLO
LECTORI
S.

M*Agni Hippocratis Aphorismos recensuro bibliopolæ , è me nunquid novam hanc suam editionem exornare quod posset , haberem animadversio- num , sciscitanti , singula ab aliis tam sollicite esse pertra- ctata , ut vel parum vel ni- hil specilegio foret relictum , respondi. Haftenus tamen edi-*

PRÆFATIO.

*editionem , quæ variorum
autorum , maxime verò Hip-
pocratis & Celsi loca paral-
lela contineret , desiderari.
Virum autem Cl. Lucam
Verhoofd omnia pene quæ
ad Hippocratem spectant præ-
stitisse , subjungo , eaque pro-
pter sequendam esse ejus edi-
tionem. Celsi verò ob exem-
plarum editionis Lindanæ
defectum studio neglexisse.
Rogat itaque nos obnixè ty-
pographus , Vellemus illa ad-
aptare aliis quoque editioni-
bus , simulque addere quæ
nobis forent observata , quod*
★ 3 *huma-*

PRÆFATIO.

*humanissime publici commodi
causa petenti facile concessi-
mus, eoque lubentius, quod
in animo nobis sit, eandem
illam Lindani editionem,
cum virorum doctorum con-
jecturis & variantibus le-
ctionibus exornatam, cum
aliis auctoribus, præcipue ve-
rò cum ipso textu collatam
brevis, Deo ita volente, de-
nuo exhibere; quapropter pa-
ginarum versuumque retinui-
mus numerum. Subjiciuntur
elegantiores Celsi Sententiæ
a Lygæo quondam aliisque
collectæ, a nobis librorum ca-
pitum-*

PRÆFATIO.

*pitumque ordini restitutæ,
Et pluribus Celsi locis au-
ctæ, quod nescire te nolui-
mus. Vale.*



CL. VIRO
D. THEODORO JANSS.
AB ALMELOVEEN.

A M I C O O P T.

Hippocratis Aphorismos locis ex Celso
parallelis ornatos edenti.

*Quantum parva suo quondam debe-
bat alumno*

*Coa, suo tantum maxima Roma tulit.
Horum nunc opera ingenio complexus
& artis*

*Una opera nobis, ô Theodore, refers.
Quid de Te dicam? Latium Tibi plau-
dit & Hellas:*

*Alter & Hippocrates, Celsus & al-
ter eris.*

G. THOMASII.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ

ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ.

HIPPOCRATIS

APHORISMI.

Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ
Α Φ Ο Ρ Ι Σ Μ Ω Ν

Τμήμα πρῶτον.

Α.



(a) Βίβραχυς, 1) ἡ δὲ τέχνη μακρῇ, 2) ὁ δὲ καιρὸς ὀξύς, 3) ἡ δὲ πείρα σφαλερῇ, ἡ δὲ κρίσις χαλεπῇ. 4) δεῖ ὁ μόνον ἑαυτὸν παρέχειν τὰ

δέοντα ποιέοντα, ἀλλὰ καὶ τὸν (b) νοσέοντα, καὶ τὰς (c) παρεόντας, καὶ τὰ ἔξωθεν.

1) Loc. in Hom. L. I. 3) Humor. I. 6. 7.

2) Loc. in Hom. L. IV. I. Artic. IX. 7.

II. Prædict. XIX. 13. 4) I. Epid. II. 93. 94

XXIX. 8. VI. Epid. II. 78.

I. Morb. IV. 1. 2. ad 82.

I. Morb. Mul. LXVI. (a) Cicer. A. Q. 13.

L. I. IV. Joan. Sarisbur. de

β'. 1) Ἐν τῇσι ταραχῇσι τῆς κοιλίης, καὶ τοῖσιν ἐμέτοισι, 2) τοῖσιν αὐτομάτως γινόμενοισιν, 3) ἣν μὲν, οἷα δεῖ καθαίρεσθαι, καθαίρωνται, συμφέρει τε, καὶ εὐφόρως φέρουσιν· ἣν δὲ μὴ, τὸναντίον· 4) ὅτω δὲ καὶ ἡ κενεαγχείη, ἣν μὲν οἷον δεῖ γίνεσθαι, γίγνηται, συμφέρει τε, καὶ εὐφόρως φέ-

HIPPOCRATIS

APHORISMORUM

Sectio Prima.

I.

VIta brevis, 1) ars longa, 2) occasio celeris, experimentum periculofum, 3) iudicium difficile. 4) Oportet autem non modo fe ipsum exhibere quæ oportet facientem, (b) fed etiam ægrum, (c) & præfentes, & externa.

Nug. Curial. Prol. (b) Celf. III. 6. p. 127.
 L. 1. Ifidor. Pelufiot. L. 20. & L. VI. 6. §.
 L. 5 Epift. CCXLIV. 14. pag. 358. L. 8.
 Senec. de Brev. Vit. (c) Art. XI. 2.
 L. 5. Cap. I.

2. 1) In perturbationibus alvi, & vomitibus 2) fponde evenientibus, 3) fi quidem, qualia oportet purgari, purgentur, confert, & facile ferunt: fin minus, contrà. 4) Sic & vaforum evacuatïo, fi quidem, qualem fieri decet, fiat, confert, & facile ferunt: fin minus, contrà. 5) Refpicere igitur oportet & re-

ρασιν. ἢν δὲ μὴ, τὸναντίον. 5) ἐπιβλέπειν ἔν
δεῖ καὶ χάρην, καὶ ὥρην, καὶ ἡλικίην (a)
καὶ νέσους, ἐν ᾗσι δεῖ, ἢ ἔ.

- Verat. uf. I. 9. 3) Vid. Aph. I. 25.
1) Aph. II. 14. 4) Humid uf. V. 11.
I. Prædict. XX. 8. Vict. Acut. V. 24.
II. Epid. XLVII. 11. XXI. 5.
2) Aph. IV. 2. 21. Aph. II. 29.
VI. 15. 5) Aph. I. 17.

γ'. 1) Εἰν τοῖσι γυμνασικοῖσιν 2) (a) αἱ
ἐπ' ἄκρον εὐεξίαι, σφαλεραί, ἢν ἐν τῷ ἐχά-
τῳ ἔωσιν. 3) ὃ γὰρ δύνανται μένειν ἐν τῷ
αὐτέῳ, ὃδὲ ἀτρεμέειν· ἐπεὶ δὲ οὐκ ἀτρε-
μέουσιν, ὃδὲ τι δύνασθαι ἐπὶ τὸ βέλτιον ἐπι-
διδόναι, λείπεται ἔν ἐπὶ τὸ χεῖρον· τρεῖς
ἔν εἵεκα τὴν εὐεξίην λύειν συμφέρει μὴ βρα-
δέως, ἵνα πάλιν ἀρχὴν ἀναθρέψῃ· λάβῃ
τὸ σῶμα. μηδὲ τὰς συμπτώσεις εἰς τὸ
ἐχάτον ἄγειν. 4) σφαλερόν γάρ· 5) ἀλλ'
ὁκοίη ἂν ἡ φύσις ἢ τῷ μέλλοντι ὑπομέ-
νειν, εἰς τὸτο ἄγειν. 6) ὡσαύτως δὲ καὶ αἱ
κενώσεις αἱ εἰς τὸ ἐχάτον ἄγασαι, σφαλε-
ραί. καὶ πάλιν αἱ ἀναθρέψεις αἱ ἐν τῷ ἐχά-
τῳ ἔξσαι, σφαλεραί.

- 1) Aph. I. 15. 3) IV. Morb. XI.
2) Epist. Hipp. ad 15. 16.
Damag. II. 209. 4) Aph. II. 51.
5) Oedimeft. III. 26.

δ'. 1) Αἱ λεπταὶ καὶ ἀκριβεῖς δόξαι. καὶ
ἐν

gionem, & tempestatem, & ætatem,
& morbos, (a) in quibus convenit,
aut non.

Humor. I. 14. ad 19. Celf. præf. I. p.

II. Morb. Mul. IV. 1. 18. l. 33. III. 4.

Epist. Democ. ad pag. 119. l. 31. V.

Hipp. 30. ad 34. 26. §. 6. pag. 284.

(a) Orat. Theff. filii 130. l. 31.

I. Diæt. II. 12. 13. &c.

3. 1) In exercitantibus 2) (a) boni
habitus ad summum progressi, pericu-
losi, si in extremo fuerint. 3) Non
enim possunt in eodem manere, neque
quiescere. Cum vero non quiescant,
neque ultra possint in melius profice-
re, reliquum igitur in deterius. Horum
igitur causa bonum habitum solvere
confert haud cunctanter, quò rursus
renutritionis principium sumat cor-
pus. Neque confidentiæ ad extremum
ducendæ: 4) periculosum enim: 5) sed
qualis natura fuerit ejus qui perferet,
eò usque ducendæ. 6) Sic & evacua-
tiones ad extremum ducentes, peri-
culosæ. Et rursus refectiones, cum ex-
tremæ fuerint, periculosæ.

6) Aph. II. 22. 51. (a) Celf. II. 2. pag. 48.

Vet. Medic. XII. 1. l. 5. Basilii Magni

Viêt. Acut. XVII. 10. de vera Virg. p. 131.

4. 1) Tenuis & exquisitus victus, &

ἐν τοῖσι μακροῦσιν αἰεὶ πάθει (α), 2) καὶ ἐν τοῖσιν ὀξεσιν ἢ μὴ ἐπιδέχειν, σφαιραῖ. 3) καὶ πάλιν αἰ εἰς τὸ ἔχατον λεπτότητος ἀφίγμεναι δίαται, χαλεπαί. 4) καὶ γὰρ αἰ πληρώσεις αἰ εἰς τὸ ἔχατον ἀφίγμεναι, χαλεπαί.

1) Aph. I. 5.

3) Aph. I. 5. II. 51.

Præcept. XI. 4.

4) Aph. VI. 39. Ægi-

2) Vict. Acut. XX. 6. 7. net. lib. 1. c. 32.

ε. 1) Ἐν τῇσι λεπλῆσι διαίτητιν ἀμαρτάνουσιν οἱ νοσέοντες. 2) διὸ μάλλον βλάπτονται. πᾶν γὰρ τὸ ἀμάετλημα, ὃ ἂν γίνηται, μέγα γίνεται μάλλον (ἐν τῇσι λεπλῆσι) ἢ ἐν τῇσιν ὀλίγων ἀδροτέρησι διαίτησι. Διὰ τῆτο καὶ τοῖσιν ὑγιεινῶσι σφαιραῖ αἰ πάνυ λεπτὰ καὶ καθεστηκυῖαι καὶ ἀκριβεῖς διαίται ὅτι τὰ ἀμαρτανόμενα χαλεπώτερον φέρουσι. Διὰ τῆτο ἐν αἰ λεπταὶ καὶ ἀκριβεῖς δίαται σφαιραῖ εἰς τὰ πλεῖστα τῶν μικρὸν ἀδροτέρων.

1) Aph. I. 4.

ε'. (α) Εἰς δὲ τὰ ἔχιστα νοσήματα, αἰ ἔχεται θεραπεία εἰς ἀκριβεῖν κράτισαι.

(α) Cels. II. 10. p. 84. l. 8. IV. 9. pag. 232. l. 15. Cicero de Officiis lib. I. cap. 24.

ζ. 1) Ὅτε μὲν ἐν κάτοξυ τὸ νόσημα, 2) αὐτίκα τὰς ἐχάτας πόνας ἔχει, καὶ τῇ
ἐχά-

in longis morbis semper (a), 2) & in acutis, ubi non convenit, periculosus. 3) Et rursus ad extremum tenuitatis progressus victus, difficilis. 4) Nam & repletiones ad extremum progressæ, difficiles sunt.

(a) Cels. III. 2. pag. 114. l. 3. III. 15. pag. 145. l. 21.

5. 1) In tenui victu delinquent ægri: 2) ob id magis læduntur. Omne enim delictum, quod committitur, multò majus fit (in tenui) quam in paulò pleniore victu. Propterea etiam sanis periculosus est valde tenuis & constitutus & exquisitus victus; quia delicta gravius ferunt. Ob hoc igitur tenuis & exquisitus victus periculosus magis quam paulò plenior.

2) Vet. Medic. XV. 9. ad 14.
Vict. Acut. XX. 6. 7. 11.

6. (a) Ad extremos morbos, extrema remedia exquisitè optima.

Loc. in Hom. XXXVI. 14.
LV. 7. ad 11.

Articul. I. 9.

7. 1) Ubi igitur peracutus est morbus, 2) statim extremos habet labores,

ἐχάτως λεπτοτάτῃ (α) διαίτῃ ἀναγκαῖον
 χρεέσθαι, ὅς τ' ἢ μὴ, ἀλλ' ἐνδέχεται ἀδρο-
 τέως διαιτᾶν, τοσοῦτον ὑποκαταβαίνειν,
 ὅσον ἂν ἡ νῆσος μαλθακωτέρῃ τῶν ἐχά-
 των ᾗ.

1) Aph. IV. 10.

2) I. Epid. III. 29. 33.

ἡ. 1) Ὄκóταν ἢ ἀκμάζῃ τὸ νέσημα,
 τότε καὶ τῇ λεπτοτάτῃ διαίτῃ ἀναγκαῖον
 χρεέσθαι.

Vict. Acut. XVII. 11.

XX. 1. ad 6.

2'. Συντεκμαίρεσθαι δὲ χρὴ (α) καὶ τὸν
 νοσέοντα, εἰ ἐξαρκέσει τῇ διαίτῃ πρὸς τὴν
 ἀκμὴν τῆς νῆσου, 1) (b) καὶ πότερον ἐκεῖν
 ἀπαυδήσει πρότερον, καὶ ἔκ ἐξαρκέσει τῇ
 διαίτῃ, ἢ ἡ νῆσος πρότερον ἀπαυδήσει καὶ
 ἀμβλυνέϊται.

Vict. Acut. XIX. 5. 1) Aph. I. 23.

ad 10.

Humor. III. 87.

ί. (α) 1) Ὄκóσοισι μὲν ἔν αὐτίκα ἡ ἀκμή,
 αὐτίκα λεπτοῦς διαιτᾶν. ὀκóσοισι δὲ ἐς
 ὑπερον ἢ ἀκμὴν, 2) ἐς ἐκεῖνο καὶ πρὸ ἐκείνου
 μικρὸν ἀφαιρετέον. ἔμπροσθεν ἢ πιωτέως
 διαιτᾶν, ὡς ἂν ἐξαρκέσῃ ὁ νοσέων.

1) Vict. Acut. XIX. 2) Affection. XLII.

8. 9.

3.

ιά.

& extremè tenuissimo victu uti necesse est. (a) Ubi vero non, sed plenius cibare licet, tantum à *tenui* recedendum, quantum morbus remissior extremis fuerit.

II. Epid. I. 24.

(a) Cels. III. 6. p. 131. l. 28.

8. 1) Cum morbus in vigore fuerit, tunc vel tenuissimo victu uti necesse est.

1) Aph. II. 29.

9. Considerare oportet etiam ægro-
tantem, (a) num ad morbi vigorem
victu sufficiet, 1) (b) & an prius ille
deficiet, & victu non sufficiet, vel
morbus prius deficiet, & obtundetur.

(a) Cels. III. 4. p. 120. Psal. VII. p. 86. ed.
l. 7. II. 10. pag. 78. in fol. 1614.

l. 13. III. 6. p. 131. (b) Cels. III. 4. p. 119.

l. 21. V. 26. p. 295. l. 34.

l. 21. Chrysoft. in

10. (a) 1) Quibus igitur statim vi-
gor adest, statim tenuiter alendi. Qui-
bus vero in posterum vigor, 2) his ad
illud & paulo ante illud *tempus* sub-
trahendum. Antea vero uberius alen-
dum, ut sufficiat æger.

(a) Cels. III. 2. p. 114. l. 1.

A 5

II. 1) In

ια. 1) Ἐν δὲ τοῖσιν παροξυσμοῖσιν ὑποσέλλεσθαι χρή· τὸ προσιδέναι γὰρ βλάβη· καὶ ὁκόσα κατὰ περιόδους παροξύνεται, ἐν τοῖσι παροξυσμοῖσιν ὑποσέλλεσθαι χρή.

1) Aph. I. 19. Loc. in Hom. XXXIX. Natur. Hum. XII. 30. 1.

31. Affection. XLII. 3. Humor. III. 82. LI. 14.

ιβ. (a) 1) Τὰς δὲ παροξυσμὸς καὶ τὰς κατεσάσιας δηλώσεσιν αἱ νῆσοι, καὶ αἱ ὥραι τῆς ἔτεος, καὶ αἱ τῶν περιόδων πρὸς ἀλλήλας ἐπιδόσεις, ἥν τε καθ' ἡμέρην, ἥν τε παρ' ἡμέρην, ἥν τε καὶ διὰ πλείονος χρόνου γίνωσκειν. ἅτῃ καὶ τοῖσιν ἐπιφαινομένοισιν, 2) οἷον ἐν πλευριτικοῖσι πτύελον, ἥν αὐτίκα ἐπιφαίνεται ἀρχομένη, βραχύνει· ἥν δὲ ὑστερον ἐπιφαίνεται, μακύνει. 3) καὶ ἔρα, καὶ ὑποχωρήματα, καὶ ἰδρωῖτες, καὶ εὐκρετα, καὶ δύσκριτα, 4) καὶ βραχεία, καὶ μακρὰ τὰ νύκτα, ἐπιφαινόμενα δηλοῖ.

1) II. Epid. I. 26. Coac. pr. III. 132. 143. ad 30. III. Morb. XXI. 33.

2) Aph. V. 8. 15. 34. Prænot. XIII. 1. 12. Affection. VIII. 19. XIV. 11. Vict. Acut. VII. 1.

ιγ. Γέροντες εὐφορώτατα νησεῖν φέρουσι δεύτερον, (a) ὁ κατὰ τὴν ἡλικίαν, (b) μερῶν. πάντων δὲ μάλιστα, παιδία. τῶν

11. 1) In exacerbationibus *cibum* (a) subtrahere oportet. Exhibere enim noxium est. Et quæcunque per circuitus exacerbantur, in exacerbationibus subtrahere oportet.

Viçt. Acut. X. 2. 1. 19. Cœlius Aure-
(a) Celf. III. 4. p. 122. lian. de Morb. Acut.
1. 21. III. 6. p. 116. 1. 11. p. 30.

12. (a) 1) Exacerbationes autem & constitutiones indicabunt morbi, & anni tempora, & periodorum ad invicem *collata* incrementa, sive quotidie, sive alternis diebus, sive longiore fiant tempore. Sed etiam iis quæ *mox* apparent *eadem indicantur*, 2) velut in pleuriticis sputum, si statim appareat veniente *morbo*, abbreviat: si verò postea appareat, producit. 3) Et urinæ, & alvi excrementa, & sudores, cum apparent, vel judicatu faciles, vel difficiles, 4) vel breves, vel longos morbos *fore* indicant.

3) Aph. IV. 71. 4) Viçt. Acut. VI. 6. 7.
Coac. pr. V. 82. (a) Celf. III. 4. p. 122.
I. Epid. III. 10. 1. 17.

13. Senes facillime jejunium ferunt, secundò ætate consistentes. Minimè
(a) adolescentes. (b) Omnium mini-
me

τέων δὲ αὐτέων, ἅπερ ἂν τύχη αὐτὰ ἐαυ-
τῶν προθερμότερα ἔοντα.

(a) Cels. præf. I. p. 19. l. 12. 13. p. 32.
l. 24.

ιδ'. 1) Τὰ αὐξανόμενα πλείον ἔχει τὸ
ἔμφυτον θερμὸν, πλείους ἔν δειλται (a) τρο-
φῆς. εἰ δὲ μὴ, τὸ σῶμα ἀναλίσκεται.
(b) γέρει δὲ ὀλίγον τὸ θερμὸν· διὰ τῆτο
ἄρα ὀλίγων ὑπεκκαυμάτων δέονται· ὑπὸ
πολλῶν γὰρ ἀποσφέννυται. 2) Διὰ τῆτο καὶ
οἱ πυρετοὶ τοῖσι γέρουσιν ἔχ' ὁμοίως ὀξέες.
3) Ψυχρὸν γὰρ τὸ σῶμα.

1) Arte XXII. 2. 2) Aph. III. 7.
I. Diæt. XXIX. 5. I. Morb. XX. 15. 16.
6. 7. XXI. 16.
Natur. Hum. XXIV. 3) I. Diæt. XXIX.
7. 8. 20.

ιέ. 1) (a) Αἱ κοιλίαι χειμῶν ☉ καὶ ἡ ☉
θερμότεραι φύσει, καὶ ὕπνοι μακρότατοι.
2) ἐν ταύτησιν ἔν τῇσιν ὥρησι καὶ τὰ προ-
σάρματα πλείω δοτέον. καὶ γὰρ τὸ ἔμφυτον
θερμὸν πλείον ἔχουσι· τροφῆς ἔν πλείον ☉
δέονται. σημεῖον, (b) αἱ ἡλικίαι καὶ οἱ
(c) ἀθληταί.

1) Humor. V. 4. 2) Aph. I. 18.
Aër. Aq. Loc. II. 2. Salub. Diæt. I. 2. 26.

ις'. (a) 1) Αἱ ὑγραὶ δίαίλαι πᾶσι τοῖσι
πυρε-

me pueri: ex his autem, qui inter ipsos sunt alacriores.

(b) Cels. præf. l. 1. p. 19. l. 21.

14. 1) Quæ crescunt, plurimum habent calidi (a) innati: plurimo igitur egent alimento: sin minus, corpus consumitur. (b) Senibus autem paucus calor: propterea paucis fomitibus indigent, à multis enim extinguitur. 2) Idcirco etiam febres senibus non similiter acutæ. 3) Frigidum enim est corpus.

XVIII. 9. 10. 11. (a) Cels. I. 3. p. 32. l. 28. I. Morb. XX. 14. 24. (b) Æginet. I. 23. Morb. Sac. X. 10.

15. 1) (a) Ventres hyeme & vere natura sunt calidissimi, & somni longissimi. 2) In his igitur temporibus etiam alimenta plura exhibenda. Innatum enim calorem majorem habent. Nutrimto igitur copiosiore indigent. Indicium sunt, (b) ætates & (c) athletæ.

IV. Morb. XVII 9. (b) Cels. I. præf. p. 19. (a) Cels. I. præf. p. 1. 21. 19. l. 23. Ægin. I. 53. Plin.

XI. 53.

Cels. I. 3. p. 33. l. 7. (c) Cels. I. præf. p. 19. l. 25.

16. (a) 1) Victus humidus febricitan-

B

14 H I P P. A P H O R.

πυρεταίνουσι· συμφέρουσι· 2) μάλιστα ὅ πα-
ιδίοισι καὶ τοῖσιν ἄλλοισι τοῖσιν ἕτως εἰδισ-
μένοισι διαιτᾶσθαι. •

1) Infomn. XV. 13. 15. 16. 17.

III. Morb. XXXI. 11.

ιζ. 1) Καὶ οἷσιν ἅπαξ, ἢ δις, καὶ πλείω,
ἢ ἐλάσσω, καὶ κατὰ μέρῳ. 2) (a) δοτέον δέ
τι καὶ τῷ ἔθει, καὶ τῇ ὥρῃ, καὶ τῇ χώρῃ, καὶ τῇ
ἡλικίῃ.

1) Vet. Medic. XVIII. 2) Aph. II. 49. 50.

4. 5. &c.

I. Diæt. II. 10. ad 21.

Viæt. Acut. V. 19. 20. III. Diæt. I. 13. ad 15.

XIX. 6. Natur. Hum. XVIII.

ιη. Θέρεῳ, (a) καὶ φθινοπώρῃ, σιτία
δυσφορώτατα φέρουσι· 1) χειμῶνῳ, ῥήισα-
κῆρῳ, δεύτερον.

1) Aph. I. 15.

Humor. VIII. 24.

ιθ'. Τοῖσιν ἐν τῇσι περὶόδοισι παροξυν-
μένοισι, (a) μηδὲν δίδόναι, μηδ' ἀναγκά-
ζειν, ἀλλ' ἀφαιρέειν τῶν προῤυεσίων, πρὸς
τῶν κρισίων.

Aph. I. 11.

Humor. III. 82.

κ'. Τὰ κρινόμενα, καὶ τὰ κεκριμένα ἀρ-
τίως,

tantibus omnibus confert, 2) maximè verò pueris, & aliis tali victu uti consuetis.

2) Salub. Diæt. II. 5. 11.

(a) Celf. III. 6. p. 130. l. 32.

17. 1) Et quibus semel aut bis, & plura vel pauciora, & per partes *offerri conducatur, videndum.* 2) (a) Concedendum autem aliquid & consuetudini, & tempestati, & regioni, & ætati.

30. ad 34.

Humor. I. 14.

VIII. 23.

(a) Celf. I. 3. p. 24. l. 25.

I. 3. pag. 119. l. 30.

& III. 5. pag. 126.

l. 24. 29.

18. Æstare (a) & autumnus cibos difficillimè ferunt: 1) hyeme facillimè, deinde vere,

(a) Celf. I. 3. p. 33. l. 23. & 29.

19. His qui per circuitus exacerbantur, (a) nihil dare *oportet*, neque cogere, sed auferre de appositionibus ante iudicationes.

(a) Celf. III. 4. p. 122. l. 31. III. 5. pag. 127. l. 5. 10. III. 6. p. 133. l. 17.

20. Quæ iudicantur & iudicata sunt

B 2

per-

τίως, μὴ κινέειν, 1) μηδὲ νεωτεροποιέειν, μήτε Φαρμακεύησι, μήτ' ἄλλοισιν ἐρεθισμοῖσιν, 2) ἀλλ' ἑᾶν.

Humor. III. 83.

1) Nat. Hum. XIX. 8.

κα'. Α' δεῖ ἄγειν, 1) ὅκῃς ἂν μάλιστα ῥέπη, ταύτῃ ἄγειν, 2) διὰ τῶν ξυμφερόντων χωρίων.

Humor. I. 2. 24. 1) VII. Epid. XXXII. 4.
III. 85. 2) Aph. VII. 61.

κβ'. 1) Πέποντα Φαρμακεύειν, καὶ κινέειν, 2) μὴ ὥμα, 3) μηδὲ ἐν ἀρχῇσιν, 4) ἢν μὴ ὀργᾷ. τὰ δὲ πλεῖστα ἐκ ὀργᾷ.

Aph. IV. 13. VII. Epid. XXXII. 1.

Humor. III. 84. 2) Aph. VII. 68.

1) Humor. I. 3. 3) Aph. I. 24.

V. Epid. XXV. 12. II. 29.

κγ'. 1) Τὰ χωρέοντα μὴ τῷ πλήθει τεκμαιρίζεσθαι, ἀλλ' ὡς ἂν χωρὲν οἷα δεῖ, καὶ φέρει εὐφόρως. 2) (α) καὶ ὅκῃς δεῖ μέχρι λειποδυμίας ἄγειν, 3) καὶ τῷτο ποιεῖν, ἢν ἐξαρκέσῃ ὁ νοσέων.

Humor. III. 86. 87. 2) Loc. in Hom.

1) Vid. Aph. I. 25. XXXIX. 9.

κδ'. 1) Ἐν τοῖσιν ὀξέσι πάθεσιν ὀλιγάκις, 2) καὶ ἐν ἀρχῇσι, τῇσι Φαρμακεύησι
κρῆε-

perfectè , neque movere oportet , 1) neque innovare , five purgantibus , five aliis irritamentis , 2) sed finire.

II. Epid. I. 17.

2) Aph. II. 29.

21. Quæ ducere oportet , 1) quò maximè vergant , eò ducenda , (a) per loca convenientia.

Loc. in Hom. XXXIII. LV. 11. 12.

13.

22. 1) Concocta purgare & movere oportet , 2) non cruda , 3) neque in principiis , 4) nisi turgeant. Plurima verò non turgent.

Loc. in Hom. XXXVIII.

V. 29.

9. 10.

I. Morb. mul. XXVI.

VII. Epid. XXXII. 5. 31.

4) Aph. IV. I. 10.

LXIII. 11.

23. 1) Quæ prodeunt non copià sunt æstimanda , sed si prodeant , qualia oportet , & facilè ferat. 2) (a) Et ubi ad animi deliquium ducere oportet , 3) hoc etiam faciendum , si æger sufficiat.

Vict. Acut. LII. 8. 9. II. Morb. mul. XXIX. 9.

24. 1) In acutis affectionibus rarò , 2) & in principiis , purgante utendum ,

B 3

3) atque

χρέεσθαι, 3) καὶ τῆτο προσξευκρινήσαντας
ποιέειν.

Humor. III. 97.

V. 4.

Purgant. IV. 1.

1) Aph. IV. 10.

κέ. Ἦν, οἷα δεῖ καθαίρεσθαι, καθαίρων-
ται, ξυμφέρει τε, καὶ εὐφώρας φέρει. τὰ
δ' ἐναντία, δυσχερῶς.

Aph. I. 2. 23.

IV. 3.

Τμήμα δεύτερον.

A'.

A' 1) ὡ νοσήματι (a) ὑπνῶ πόνον ποίει,
θανάσιμον· ἢν δ' ὑπνῶ ὠφελέη, ε' θανα-
τάσιμον.

I. Epid. III. Æg. VII.

II. Epid. III. 12.

13.

1) Aph. IV. 67.

β'. Ὅκς παραφροσύνην ὑπνῶ (a) παύη,
ἀγαθόν.

I. Epid. III. Æg. VII. 13. 16.

II. Epid. III. 11. 12.

γ'. 1) ὕπνῶ, (a) ἀγρυπνίη, ἀμφοτέρω
τῶ μετρίῃ μαῖλλον γενόμενα, κακόν.

Aph. VII. 71.

Humor. III. 78.

δ'.

3) atque hoc diligenti prius adhibita cautione faciendum.

2) Vid. Aph. I. 22.

3) I. Morb. Mul. XXIII. 9.

25. Si, qualia purgari oportet, purgentur, confert & facile ferunt: si verò contraria, difficulter.

Humor. II. 49.

VI. Epid. IV. 30.

Seçtio Secunda.

I.

QUO 1) in morbo (a) somnus laborem facit, lethale: si verò somnus juvet, non est lethale.

I. Prædict. XV. 5. 17. (a) Celf. II. 6. pag. VI. Epid. VIII. 5. 55. l. 32.

2. Ubi somnus delirium (a) sedat, bonum.

(a) Celf. III. 18. p. 152. l. 4.

3. 1) Somnus, (a) vigilia, utraque modum excedentia, malum.

1) Coac. II. 35.

VI. Epid. VI. 6.

(a) Celf. II. 4. pag. 51. l. 7. & l. 4.

B 4

4. 1) Non

δ'. 1) (α) Οὐ πλησμονή, ἔλιμός, ἐδ' ἄλλο ἐδ' ἐν ἀγαθόν, 2) ὅ, τι, ἂν μᾶλλον τῆς φύσις ᾖ.

VI. Epid. VIII. 16. 1) Aph. II. 22.
II. Morb. XVI. 13. 2) Aph. II. 51.

έ. Κόποι (α) αὐτόματοι φράζῃσι νέ-
τους.

Aph. IV. 31.

ς'. Οὐόσοι πονέοντές τι τῷ σῶματι, τὰ
πολλά τῶν πόνων ἐκ αἰσθάνονται, (α) τε-
τέοισιν ἡ γνώμη νοσέει.

(α) Cels. II. 7. pag. 62. l. 27.

ζ'. Τὰ ἐν πολλῷ χρόνῳ λεπτυνόμενα σώ-
ματα, νωθρῶς ἐπανατρέφειν δεῖ· 1) τὰ
δὲ ἐν ὀλίγῳ, ὀλίγως.

Aliment. XI. 6. 7.

η'. Ἦν ἐκ νέσου τροφήν λαμβάνων τις μὴ
ἰσχύη, 1) σημαίνει, ὅτι πλείονι τροφῇ τὸ
σῶμα χρέεται· ἢν δὲ, τροφήν μὴ λαμβά-
νοντι, τῷτο γίγνηται, 2) χρὴ εἰδέναι,
ὅτι κενώσις δέϊται.

Aph. II. 31.

Coac. I. 179.

ς'. Τὰ

4. 1) (a) Non fatietas , non fames ,
neque aliud quicquam bonum est, 2)
quod naturæ modum excedat.

Vet. Medic. XV. 10. 15.

(a) Celf. I. 2. p.23. l.26. I. 3. p.24. l. 32.
Tertullianus ad Senatorem. Leon. No-
vell. Const. pag. 15. Aristot. de Morib.
II. 2.

5. Spontanæ (a) lassitudines mor-
bos denuntiant.

6. Quicumque aliqua corporis parte
dolentes , dolorem ferè non sentiunt ,
(a) his mens ægrotat.

(a) Celf. II. 2. p. 48. l. 13. & 31.

7. Quæ longo tempore extenuan-
tur corpora , lentè reficere oportet :
1) quæ verò brevi , celeriter.

1) Aph. II. 11. 18.

8. Si à morbo cibum quis capiens
non roboretur , indicat corpus uberio-
ri alimento uti. Si verò cibum non ca-
pienti hoc eveniat , 2) evacuatione
opus habere nosse oportet.

1) Aph. IV. 41. 45. 2) Aph. II. 22.
VII. 64.

9. Cor-

θ'. Τὰ σώματα κρῆ, ὅκx ἄν τις βάληται καθαίρειν, (a) εὖρoα ποίειν.

Aph. IV. 13.

VII. 70.

ι'. Τὰ μὴ καθαρὰ τῶν σωμάτων, ὁκόσον ἂν θρέψῃς, μᾶλλον βλάψεις.

Aph. VII. 65. 67.

XIX. 10. ad 14.

Vet. Medic. XII. 11. 12. Præcept. XI. 4.

ια'. Ρᾶον πληρῆσθαι (a) ποτῆ, ἢ σιτίx.

Vet. Medic. XII. 3. 9. Aliment. XI. 5.

ιβ'. Τὰ ἐγκαταλιμπανόμενα ἐν τῇσι νύ-
σοισι μετὰ κρίσιν, 1) (a) ὑποσφοφὰς ποίειν
εἴωθεν.

Humor. VII. 16. 17.

IV. Epid. XVIII. 20.

II. Epid. I. 81.

VI. Epid. II. 32.

III. 72.

III. 62.

ιγ'. 1) Ὀκόσοισι κρίσις γίνεται, τετέοι-
σιν ἢ νύξ δύσφορx, πρὸ τῆ παροξυσμῆς
(a) ἢ δὲ ἐπιῆσα εὐφερωτέρη ὡς ἐπὶ τὸ
πολύ.

VI. Epid. II. 42.

1) I. Epid. III. Æg. VII.

13.

ιδ'. 1) Ἐν τῇσι τῆς κοιλίης ῥίσεσιν αἱ με-
ταβολαὶ τῶν διαχωρημάτων ὠφελέσιν,
2) ἢ μὴ ἐς τὰ πονηρὰ μεταβάλλῃ.

II. Epid. II. 3.

1) Aph. I. 2.

ιε'. 1) Ὀκx

9. Corpora ubi quis purgare voluerit, facile fluentia reddere oportet.

IV. Morb. IX. 1.

(a) Cels. III. 18. p. 155. l. 1.

10. Impura corpora, quò magis nutritiveris, eò magis lædes.

II. Morb. XVI. 13. XXI. 20.

11. Facilius est repleri potu, (a) quàm cibo.

(a) Cels. I. 2. p. 23. l. 29. Aph. II. 7. 18.

12. Quæ in morbis post crîsim relinquuntur, 1) (a) recidivas facere solent.

II. Morb. XVI. 12. 13. I. Prædict. I. 1.

X. XI. 20. (a) Cels. II. 14. p. 89.

XXXVII. 19. l. 16.

1) Aph. IV. 36.

13. Quibus crîsis fit, his nox ante exacerbationem gravis est: (a) Subsequens verò levior plerumque.

III. Epid. III. 66. (a) Cels. III. 5. p. 124. l. 32.

14. 1) In alvi profluviis mutationes excrementorum juvant, 2) nisi in prava mutantur.

2) Aph. IV. 21.

15. 1) Ubi

ιέ. Ι) Όκx φάρυγξ νοσέει, ἡ φύματα ἐν τῷ σώματι ἐκφύεται, σκέπτεσθαι χρὴ τὰς ἐκκρίσιας· ἦν γὰρ χολώδεις ἔωσι, τὸ σῶμα ξυνοσέει· ἦν δὲ ὅμοιαι τοῖσιν ὑγιαίνεισι γίνωνται, ἀσφαλές τὸ σῶμα τρέφειν.

1) Aph. III. 26.

ις'. (α) Όκx λιμός, ἔδει πονέειν.

(α) Cels. I. 2. p. 24. 1. 17.

ιζ'. Όκx ἂν τροφή παρὰ φύσιν πλείων ἐσέλθῃ, τῷτο νῆσον ποιεῖ. δηλοῖ δὲ ἡ ἴη-
σις.

Aph. II. 22.

XIII. 11. 24.

Vet. Medic. VIII. 16. XIX. 6. 31.

XII. 10. I. Diæt. XXX. 15.

ιη'. Τῶν τρεφόντων ἀθρόως καὶ ταχέως, ταχεῖαι καὶ αἱ διαχωρήσεις γίνονται.

Aph. II. 7. 11.

Aliment. XI. 4. 5.

ιβ'. Τῶν ὀξέων νεσημάτων ἔπάμπαν (α) ἀσφαλέες αἱ προδιαρρεΐσεις, ἔτε τῷ θανάτῳ, ἔτε τῆς ὑγείης.

Decent. Ornat. X. 7. 8.

κ'. Όκόσοισι (α) νέοισιν ἔστιν αἱ κοιλίαι
ὕγραί

15. 1) Ubi fauces ægrotant, aut tubercula in corpore exoriuntur, excretiones inspicere oportet: Si enim biliosæ fuerint, corpus unà ægrotat: Si verò similes fanis fiant, tutum est corpus nutrire.

16. Ubi fames, non oportet labo-
rare.

17. Ubi cibus præter naturam copio-
fior ingressus fuerit, id morbum facit.
Ostendit autem sanatio.

III. Diæt. XV. 16. Affe&t. XXVIII. 1. 2.
Loc. in Hom. LII. 8. 9. Morb. Sacr. XVIII. 30.
San. Tuend. ad De- Epist. Abderit. ad Hip.
met. 8. 40.

18. Eorum quæ confertim & celeriter nutriunt, celeres etiam fiunt egestiones.

VI. Epid. V. 37. 53.

19. Acutorum morborum non omnino (a) tutæ sunt prædictiones, neque mortis, neque sanitatis.

(a) Celf. II. 6. pag. 57. l. 33.

20. Quibus, dum sunt juvenes, al-

ὕγραί εἰσι, τετέοισιν ἀπογρηάσκει ξηραίνονται. ὁκόσοισι δὲ νέοισιν ἔξουσιν αἱ κοιλίαι ξηραί εἰσι, τετέοισι πρεσβυτέροισι γινομένοιςιν ὑγραίνονται.

Aph. II. 53.

κά. (α) Λιμὸν θώρηξις λύει.

(α) Celf. I. 3. p. 26. l. 29.

κβ'. 1) (α) Ἀπὸ πλησμονῆς ὁκόσα ἂν νησήματα γένηται, κένωσις ἵηται. καὶ ὁκόσα ἀπὸ κενώσεως, πλησμονή. 2) καὶ τῶν ἄλλων ἢ ὑπεναντίως.

Nat. Human. XVII. 11. 1) Aph. II. 8.

12. 13.

Flat. II. 9. ad 16.

San. Tuend. ad Dem. 8.

III. 2. 3.

VI. Epid. VIII. 16.

κγ'. Τὰ ὀξέα τῶν νησημάτων κρίνεται ἐν τεσσαρεσκαίδεκα ἡμέρησι.

Aph. II. 19.

Judicat. IV. 12.

κδ'. Τῶν ἑπτὰ ἢ (α) τετάρτη ἐπίδηλ. ἑτέρης ἑβδομαδὴς ἢ ὀγδόη ἀρχή. θεωρητὴ ἢ ἑνδεκάτη. αὕτη γάρ ἐστι τετάρτη τῆς ἑτέρης ἑβδομαδὴς. θεωρητὴ δὲ πάλιν ἢ ἑπτακαιδεκάτη. αὕτη γάρ ἐστι τετάρτη μὲν ἀπὸ τῆς τεσσαρεσκαίδεκάτης ἑβδομῆς δὲ ἀπὸ τῆς ἑνδεκάτης.

Aph. IV. 36. 71. Judicat. II. 7. ad 12.

Septimest. VIII. 6. Prænot. XX. 5. ad 10.

κέ'. Οἱ

vi sunt humidæ, iis fenefcentibus ficcantur. Quibus vero, dum sunt juvenes, alvi sunt ficcæ, his fenefcentibus humectantur.

21. (a) Famem vini potio solvit.

22. 1) (a) A repletionem quicumque fiunt morbi, evacuatio fanat. Et quicumque ab evacuatione, repletio : 2) Et aliorum contrarietas *fanat*.

2) Aph. II. 48.

LIV. 6.

Vet. Medic. XXXII. 1. I. Epid. II. 95.

18.

Morb. Sac. XVIII.

Loc. in Hom. LI. 6.

30. 32. 33. 35.

LII. 2. (a) Celf. 1.3. 28.1.5.

23. Acuti morbi in quatuordecim diebus judicantur.

Coac. I. 190. 211.

24. Septimorum quartus est index.

a) Alterius septimanæ octavus est initium. Notandus verò undecimus : is enim quartus est alterius septimanæ. Notandus rursus decimus septimus : hic enim est quartus quidem à decimo quarto, septimus verò ab undecimo.

(a) Celf. III. 4. p. 121. l. 1. ad 9.

κέ. Οἱ θερinoὶ (α) τεταρταῖοι τὰ πολλὰ γίνονται βραχέες · οἱ δὲ φθινοπωρινοί, καὶ 1) μάλιστα οἱ πρὸς τὸν χειμῶνα συνάπτοντες.

Nat. Human. XXIX. 5. I. Epid. III. 17.
6. 7. 1) Coac. I. 236.

κε'. 1) Πυρετὸν (α) ἐπὶ σπασμῶ. βέλτιον γενέσθαι, 2) ἢ σπασμὸν ἐπὶ πυρετῶ.

Coac. III. 80. 82. Coac. I. 231.
I. Morb. VI. 13. 14. San. Tuend. ad Dem.
10.

1) Vid. Aph. IV. 57. 2) Aph. VII. 13.
V. 5. 70. Judicat. XII. 11.

κε'. 1) Τοῖσι (α) μὴ κατὰ λόγον κρφίζουσιν, ὅ δεῖ πιεῦειν, ὅδε φοβεῖσθαι λίην τὰ μοχθηρὰ γινόμενα παραλόγως. τὰ γὰρ πολλὰ τῶν τοιχτέων ἴσιν ἀθεῖσθαι, καὶ ὅ πάνυ τοι διαμένειν, ὅδε χρονίζειν εἴωθε.

1) I. Prædict. VI. 16. II. Prædict. XXIX. 6.
VII. 7. Coac. I. 73.

κή. Τῶν πυρεσσόντων μὴ παντάπασιν ἐπιπολαίως, 1) τὸ διαμένειν καὶ μηδὲν ἐνδιδόναι τὸ σῶμα, 2) ἢ καὶ συντήκεσθαι (α) μᾶλλον τῷ κατὰ λόγον, μοχθηρόν. τὸ μὲν γὰρ μῆκρον (b) νέος σημαίνει, τὸ δ' ἀσθενεῖαν.

1) Humor. III. 17. 2) Aph. V. 55.

25. Quartanæ æstivæ (a) plerumque fiunt breves : autumnales verò longæ, 1) & maximè quæ prope hyemen incidunt.

(a) Cels. II. 8. p. 76. l. 9. III. 16. p. 147. l. 7.

26. 1) Febrem convulsioni supervenire melius est, 2) quàm convulsionem feбри.

(a) Cels. II. 8. p. 70. l. 2. Coac. II. 207. & 5. III. 82.

27. 1) His, (a) quæ non secundum rationem levant, credere non oportet, neque timere valdè quæ præter rationem fiunt prava. Multa enim horum sunt inconstantia, nec admodum permanere, neque durare solent.

III. 100. 109. 110. & II. 14. pag. 89.

II. Epid. III. 132. l. 16.

(a) Cels. II. 7. p. 60. l. 12.

28. Febricitantium non omninò leviter, 1) permanere, & nihil remittere corpus, 2) aut etiam magis quàm pro ratione colliquesceri (a) malum est. Illud enim morbi longitudinem indicat, (b) hoc verò infirmitatem.

Humor. III. 52.

(b) Cels. II. 5. p. 53.

(a) Cels. II. 2. p. 48. l. 8.

l. 24. & II. 7.

& II. 4. p. 51. l. 21.

p. 58. l. 19.

κθ'. 1) Ἀρχομένων τῶν νόσων, 2) ἥν τι δο-
κῆν κινέειν, κίνει. 3) ἀκμαζουσῶν ᾗ, ἡτυχίην
ἔχειν βέλτιόν ἐστι.

Loc. in Hom. XXXVIII. 1) Vid. Aph. I. 22. 12.
9. 10. 11. 2) II. Morb. Mul.
Purgant. IV. 1. XXIV. 18.

λ'. Περὶ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰ τέλη πάντα
ἀσθενέστερα · περὶ δὲ τὰς ἀκμὰς, ἰχυρό-
τερα.

1) Aph. II. 29.

λα'. Τῷ ἐξ ἀρρώστιας εὐσιτέοντι, μηδὲν
ἐπιδιδόναι τὸ σῶμα, μοχθηρόν.

Aph. II. 8.

λβ'. Ὡς τὰ πολλὰ πάντες οἱ φαύλως ἔχον-
τες, κατ' ἀρχὰς μὲν εὐσιτέοντες, καὶ μηδὲν
ἐπιδιδόντες, πρὸς τῷ τέλει πάλιν ἀσιτέ-
ουσιν · 1) οἱ δὲ κατ' ἀρχὰς μὲν ἀσιτέοντες,
ἰχυρῶς, ὑπερον ᾗ εὐσιτέοντες, βέλτιον ἀπαλ-
λάσσοσιν.

Coac. I. 179.

λγ'. Ἐν πάσῃ νόσῳ, (α) τὸ ἐρρῶσθαι τὴν
σπλιάνοιαν, καὶ εὖ ἔχειν πρὸς τὰς προσφορὰς,
αἰγαθόν · τὸ δὲ ἐναντίον, κακόν.

De Medico. III. 9.

Coac. I. 72.

λδ'. Εἰ

29. 1) Incipientibus morbis, 2) si quid movendum videatur, move: 3) vigentibus vero, quiescere melius est.

3) Aph. I. 24. II. Morb. XII. 34. 35.
II. 30. III. XXIV. 57. 58. 59.
I. Epid. III. 29.

30. Circa principia & fines omnia sunt debiliora. 1) Circa vigores verò vehementiora.

31. A morbo bellè comedenti, nihil proficere corpus, malum est.

Coac. I. 179.

32. Ut plurimum omnes qui malè habent, circa principia quidem benè comedentes, & nihil proficientes, ad finem rursus cibum non appetunt. 1) Qui verò circa initia quidem cibum omninò non appetunt, postea autem benè appetunt, meliùs liberantur.

1) Aph. VII. 6.

33. In omni morbo mente valere, (a) & benè se habere ad ea quæ offeruntur, bonum est: contrarium verò, malum.

(a) Cels. II. 3. p. 49. l. 32.

λδ'. Ἐν τῇσι νέσοισιν ἥσσον κινδυνεύουσιν, οἷσιν ἂν οἰκείῃ τῆς φύσις, καὶ τῆς ἡλικίης, καὶ τῆς ἐξέως, καὶ τῆς ἄρης ἢ νῆτος ἢ μᾶλλον, ἢ οἷσιν ἂν μὴ οἰκείῃ κατὰ τι τετέων.

Aph. VIII. 1. 8. Dieb. judicat. I. 11.
Humor. VI. 1. ad 5. ad 15.

λε'. Ἐν πάσῃσι τῇσι νέσοισι, 1) τὰ περὶ τὸν (α) ὀμφαλὸν, καὶ τὸ ἥτρον, πᾶς ἔχειν, βελτιόν ἐστι. τὸ δὲ σφόδρα λεπτὸν (b) καὶ ἐκτετηκὸς, μοχθηρόν. ἐπισφαλές δὲ τὸ τοιᾶτον, καὶ πρὸς τὰς κάτω καθάρσεις.

Prænot. X. 2. I. Morb. Mul. LXXVII.
1) Aph. 11. 28. 9.

λς'. Οἱ ὑγιεινῶς ἔχοντες τὰ σώματα, (α) ἐν τῇσι φαρμακείῃσι καθαιρόμενοι ἐκλύονται ταχέως, καὶ οἱ πονηρῇ τροφῇ κρεᾶμενοι.

Aph. II. 37. Verat. uf. I. 12.
IV. 16. Epitt. Dem. ad Hip. 16.

λζ'. Οἱ εὖ τὰ σώματα ἔχοντες, 1) φαρμακεύεσθαι ἐργάδες.

Aph. II. 36. IV. 16.

λη'. Τὸ σμικρὸν χεῖρον, καὶ πόμα, καὶ σι-
τίον,

34. In Morbis minùs periclitantur , quorum naturæ , & ætati , & habitui , & tempori magis similis fuerit morbus , quàm *in* quibus horum nulli *fuerit* similis.

VI. Epid. VIII. 43. ad Affection. VII. 3. 46.

35. In omnibus morbis , 1) quæ *partes* ad umbilicum & imum ventrem *sunt* , crassitudinem habere, melius est. Valdè autem tenues & (b) eliquatas *ip-sas habere* , malum : Periculofum verò illud est, etiam ad infernas purgationes.

(a) Celf. II. 3. pag. 49. (b) Celf. II. 4. pag. 51.
l. 21. l. 16.

36. Qui sana habent corpora , (a) pharmacis purgati citò exsolventur , *ut* & qui pravo utuntur cibo.

(a) Celf. II. 13. pag. 87. l. 24.

37. Qui benè valent corpore, 1) purgatu sunt difficiles.

Verat. uf. I. 5. 12. 1) Aph. IV. 5.

38. Paulò deterior , & potus , & ci-
bus,

τίον, ἥδιον δ', τῶν βελτιόνων μὲν, ἀηδεσέρων
 εἰς, μάλλον αἰρετέον.

De Arte XII. 10. IV. Morb. XII. 7.
 VI. Epid. IV. 26. Affection. XLII. 1.2.

λθ'. 1) Οἱ πρεσβύτεροι (a) τῶν νέων τὰ
 μὲν πολλὰ νοσέουσιν ἥσσον, 2) ὅσα δ' ἂν αὐ-
 τέοισι χρόνια (b) νοσήματα γένηται, τὰ
 πολλὰ ξυναποθνήσκει.

1) I. Morb. XX. 13. 15. 2) Aph. V. 7.

μ'. Βράγχιοι, καὶ κόρυζαι, τοῖσι σφίδρα
 πρεσβύτεροις ἔπεπαίνοντο.

μα'. Οἱ ἐκλυόμενοι πολλάκις καὶ ἰχυρῶς,
 ἀνευ φανερῆς προφάσεως, ἐξαπίνης τελευ-
 τῶσι.

Coac. I. 83.

μβ'. Λύειν (a) ἀποπληξίην, ἰχυρὴν μὲν,
 ἀδύνατον· ἀσθενέα δ' εἰς, ἔρῃδιον.

(a) Celf. II. 8. p. 76. l. 3.

μγ'. Τῶν (a) ἀπαγχομένων, καὶ κατα-
 λυομένων, μηδέπω δ' εἰς τεθνηκότων, ἔκ ἀνα-
 φέουσιν, 1) οἰσιν ἂν ἀφροῶς ἢ περὶ τὸ σῶμα.

1) Morb. Sac. VIII. 18.

μδ'. Οἱ

bus , jucundior autem , eligendus potius , quàm meliores quidem , sed ingratiore.

Viét. Acut. XV. 1. 2. XVIII. 2. 4.

39. 1) Senes ut plurimùm (a) quidem juvenibus minùs ægrotant. 2) Quicumque verò iplis (b) morbi fiunt diuturni, plerumque commoriuntur.

(a) Celf. II. 1. p. 43. (b) Celf. II. 8. p. 73.
 1. 14. 1. 8.

40. Raucedines , & gravedines , *in* valdè senibus non coquuntur.

41. Qui sæpè & vehementer, absque manifestâ causâ , animo linquntur, ex improvîso moriuntur.

42. Solvere (a) apoplexiam , vehementem quidem , impossibile : debilem verò , non facile.

43. Ex (a) iis , qui strangulantur , & resolvuntur , nondum autem sunt mortui , non se recolligunt , 1) quibus spuma circa os fuerit.

(a) Celf. II. 8. p. 76. 1. 17.

44. Qui

μδ'. Οἱ παχέες (α) σφόδρα κατὰ φύσιν, ταχυθάνατοι γίνονται μᾶλλον τῶν ἰχνῶν.

(α) Celf. II. 1. p. 47. l. 25.

μέ'. Τῶν ἐπιληπτικῶν τοῖσι νέοισιν ἀπαλλαγὴν αἱ μεταβολαὶ, 1) μάλιστα τῆς ἡλικίης, 2) καὶ τῶν χωρίων, καὶ τῶν βίων, ποιεῖσι.

Vid. Aph. V. 7. II. Prædict. XVI. 1.2.3.

μς'. Δύο πόνων ἅμα γινομένων, μὴ κατὰ τὸν αὐτὸν τόπον, ὁ σφοδρότερος 1) ἀμυνροί τὸν ἕτερον.

Humor. XI. 16. 17.

μζ'. Περὶ τὰς γενέσιας τῶ πύς, οἱ πόνοι, καὶ οἱ πυρετοὶ ξυμβαίεσι μᾶλλον, ἢ γενομένοις.

Vet. Medicin. XXXIII. 8. ad 12.

μη'. Ἐν πάσῃ (α) κινήσει τῶ σώματι, ὁκόταν ἀρχηται πονεῖν, τὸ διαναπαυεῖν εὐθὺς ἀκοπον.

Aph. II. 22. (α) Celf. I. 3. p. 25. l. 11. Præcept. XIII. 4. & p. 26. l. 33.

μθ'. Οἱ εἰθισμένοι τὰς συνήθεις πόνας φέρειν, καὶ ὥσιν ἀσθενέες (α) ἢ γέροντες, τῶν ἀσυνήθων, ἰχυρῶν τε καὶ νέων, ῥᾶον φέρουσι.

Celf. I. 3. p. 25. l. 7. Cicero Tusc. Q. II. 17.

γ'. Τὰ

44. Qui natura (a) sunt valde crassi, magis subito moriuntur, quam graciles.

45. Epilepticis pueris, mutationes, 1) maxime ætatis, 2) & regionum, & vitarum, liberationem faciunt.

Morb. Sac. XIII. 6. 1) Aph. III. 28.
2) VI. Epid. VI. 36.

46. Duobus doloribus simul obortis, non in eodem loco, vehementior 1) obscurat alterum.

1) Aliment. I. 11.

47. Circa puris generationes, dolores, & febres magis accidunt, quam *ipso facto*.

Prænot. XVII. 6. Ulcerib. II. 8. ad 11.

48. In omni (a) corporis motu, quando dolere cœperit, interquiescere statim lassitudinem curat.

Nat. Human. XVII. 14. Flatib. II. 14.
15.

49. Consueti solitos labores ferre, etiamsi fuerint debiles (a) aut senes, infuetis, robustis *licet* & juvenibus, facilius ferunt.

II. Diæt. XLIV. 2. 3. 4.

ν'. Τὰ ἐκ πολλῶ (a) χρόνος συνήθεα, καὶ ἢ χεῖρω, τῶν ἀσυνήθων (b) ἥσσαν ἐνοχλεῖν εἶωθε· 1) δεῖ ἔν καὶ ἐς τὰ (c) ἀσυνήθεα μεταβάλλειν.

II. Diæt. X.LIV. 4. Viçt. Acut. XVIII. 2.

Humor. III. 115. ad 6.

Humid. ul. III. 8. XXXII. 5. 6.

να'. Τὸ κατὰ πολὺ, καὶ ἐξαπίνης, 1) κε-
νῶν, 2) (a) ἢ πληρῶν, 3) ἢ (b) θερμαίνειν,
4) ἢ ψύχειν, ἢ ἄλλως ὀκωσοῦν 5) τὸ σῶμα
(c) κινεῖν, σφαλερόν. 6) καὶ γὰρ πᾶν τὸ
πολὺ τῇ φύσει πολέμιον. 7) τὸ ἢ κατ' (d)
ὀλίγον, ἀσφαλές· καὶ ἄλλως, ἣν καὶ τίς 8) ἐξ
ἐτέρου ἐφ' ἑτέρον μεταβαίνει.

Viçt. Acut. XVII. 12. V. 17. 18. 20. 22. 23. 24.

XXIII. 15. 5) Aph. IV. 14.

1) Aph. I. 3.

6) Aph. II. 4.

VI. 27. 39.

Vet. Medicin. XVIII.

2) Aph. I. 3. 4.

1. Præcept. XIII. 4.

II. 4. 17.

I. Morb. Mul. XXXIII.

VI. 39.

4.

3) Aph. III. 1.

XCVIII. 15.

V. 16.

7) Vet. Medic. XV.

4) Aph. III. 1.

17. 11.

νβ'. Πάντα κατὰ (a) λόγον ποιεόντι, καὶ
μὴ γινομένων τῶν κατὰ λόγον, μὴ μεταβαί-
νειν ἐφ' ἑτέρον, (b) μενοῦν τε δόξαν τε ἐξ
ἀρχῆς.

Loc. in Hom. XX. (a) Celf. III. 2. pag. 112.

11. 12.

1. 25. Cæl. Aurelian.

νγ'. Ὁκό-

50. A multo tempore (a) consueta , etiam si fuerint deteriora , (b) insuetis minus turbare solent. 1) Oportet igitur etiam ad insolita mutare.

1) Aph. I. 17. (b) Cels. I. 3. p. 27. l. 1.
 II. 22. 51. Agatharch. Excerpt.
 (a) Macrob. Saturn. L. V. Cap. 50. p. 70.
 VII. 8. (c) Cels. I. 3. p. 25. l. 9.

51. Multum , & derepentè , 1) evacuare , 2) (a) aut replere , aut 3) calefacere , (b) aut 4) frigefacere , aut aliter quocunque modo corpus 5) movere , (c) periculosum est. 6) Nam etiam omne multum (i. e. *nimum*) naturæ est inimicum. 7) Quod verò (d) paulatim fit , tutum est : tum aliàs , tum si quis 8) ex altero ad alterum transeat.

II. Diæt. XLIV. 5. 8) Aph. II. 50. 52.
 Nat. Hum. XIX 7. 8. (a) Cels. II. 16. pag. 92.
 Humor. VIII. 17. 18. l. 19.
 Humid. usq. III. 5. (b) Cels. I. 9. p. 40. l. 7.
 VI. Epid. II. 47. (c) Cels. I. 3. p. 24 l. 28.
 Affect. XLII. 3. (d) Cels. I. 3. p. 25. l. 6.
 Vi& Acut. V. 22. X. 8.

52. Omnia secundum rationem facienti , & non secundum rationem evenientibus , non transeundum ad aliud , manente eo , quod visum est ab initio.

Tard. passion. IV. 3. (b) Cels. III. 9. pag.
 p. 454. 138. l. 9.

γ'. Οκόσοι τὰς (α) κοιλίας ὑγρὰς ἔχουσιν, νέοι μὲν ὄντες, βέλτιον ἀπαλλάσσει τῶν τὰς ξηρὰς ἐχόντων. ἐς δὲ τὸ γῆρας, χεῖρον ἀπαλλάσσει· ξηραίνονται γὰρ, ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ, τοῖσιν ἀποξηράσκει.

Aph. II. 20.

νδ'. Μεγίθει ᾧ (α) σώματι ἐνστάσαι μὲν, ἐλευθέριον καὶ ἄκ' αἰεὶδές. ἐγξηράσαι δὲ, οἷσ' χρησεν, καὶ χεῖρον τῶν ἐλασσόνων.

Præcept. XI. 10.

Τμήμα τρίτον.

A'.

Α' 1) (α) μεταβολαὶ τῶν ὠρέων, μάλιστα τίκτεσι νοσήματα· 2) καὶ ἐν τῇσιν ὥρῃσιν αἱ μεγάλοι μετακταγαὶ, ἢ ψύξις, ἢ θάλψις, καὶ τ' ἄλλα κατὰ λόγον ἔστω.

Ostimestr. III. 29.

Vict. Acut. XVII. 9.

Humor. VI. 5.

Morb. Sac. XII. 7.

VIII. 15. 16. 2) Aph. II. 51.

Aër. Aq. Loc. I. 19.

II. Diæt. VI. 7.

β'. Τῶν φύσεων, αἱ μὲν πρὸς (α) θερμότητα, αἱ δὲ πρὸς χειμῶνα, εὖ ἢ κακῶς πεφύκασιν.

Vet. Medicin. XXXVII. I. Diæt. XXV. 12.

14.

III. Diæt. I. 6.

γ'. Τῶν

53. Quicunque alvos habent humidas, dum quidem juvenes sunt, melius liberantur his, qui siccas habent. Ad senectutem verò, pejùs liberantur: siccantur enim ut plurimum senescentibus.

(a) Cels. I. 3. p. 33. l. 3.

54. Procero corpore (a) juventutem quidem degere liberale est, nec deformè: infenescere verò, incommodum, & parvis deterius.

(a) Cels. II. 1. p. 43. l. 16.

Seçtio Tertia.

I.

1) (a) **M**utationes *anni* temporum, maximè pariunt morbos:
2) & in ipsis temporibus magnæ mutationes, aut frigoris, aut caloris, & alia pro ratione eodem modo.

Humor. VII. 7. (a) Cels. I. 3. p. 33. l. 32.

Boeth. de Consol. Phil. II. 1. pag. 42. l. 21.

L. 11. in principio.

2. Naturarum, aliæ quidem (a) ad æstatem, aliæ verò ad hyemen, benè aut malè sunt constitutæ.

Aër. Aq. Loc. XXXIV. Morb. Sac. XVIII. 24.

9.

(a) Cels. I. 9. pag. 39.

LVI. 7. 8. l. 18.

D 3

3. Mor-

γ'. Τῶν νέσων (α) ἄλλαι πρὸς ἄλλας εὔ-
 1) ἢ κακῶς πεφύκασι· καὶ ἡλικίαι τινὲς πρὸς
 ὥρας, καὶ χώρας, καὶ θιγαίτας.

Humor. VIII. 11. 22. 1) Aph. VIII. 6.

δ'. Ἐν τῇσιν ἄρῃσιν, ὅταν τῆς αὐτῆς ἡ-
 μέρης, ὅτε μὲν θάλλω, ὅτε δὲ ψύχῃ
 γίνηται, φθινοπωρινὰ (α) τὰ νεσήματα
 προσδέχεσθαι χρή.

Humor. VI. 5. 6. VII. 7.

ε'. Νότοι (α) βαρυήκοι, ἀχλυώδεις, κα-
 ρηΐαριχοί, νωθροί, διαλυτικοί. ὁκόταν ἔτος
 δυναστεύῃ, τοιαῦτα ἐν τῇσιν ἀρρώσισι πά-
 σκωσιν. ἢν δὲ βόρειον ᾖ, βῆχες, (b) φάρυ-
 γες, κοιλίαι σκληραί, δυσκρίαι, φρεκώδεις,
 ὁδύνηαι πλευρέων, σηθέων. ὁκόταν ἔτος δυ-
 ναστεύῃ, τοιαῦτα ἐν τῇσιν ἀρρώσισι προσδέ-
 χεσθαι χρή.

Humor. VIII. 1. (α) Celf. II. 1. p. 44.
 Morb. Sac. XV. 3. 8. 1. 27.

19. ad 22.

ς'. Ὅκοταν θερμὸν γένηται ἤρι ὅμοιον,
 ἰδρωτάς (α) ἐν τοῖσι πυρετοῖσι πολλὰς προσ-
 δεχέσθαι χρή.

Humor. VII. 11.

ζ'. 1) Ἐν τοῖσιν (α) αὐχμοῖσι πυρετοὶ ὀξέες
 γίνονται

3. Morborum (a) alii ad alia *tempora* benè 1) aut malè se habent : & ætates quædam ad tempora , & regiones , & victus.

(a) Celf. II. 1. p. 43. l. 12.

4. In temporibus , quando eâdem die , modò calor , modò frigus fit , autumnales (a) morbos exspectare oportet.

(a) Celf. I. 3. p. 33. l. 32. & II. 1. p. 42. l. 21.

5. Austri (a) auditum gravantes , caliginosi , caput gravantes , segnes , dissolventes. Quum hic dominatum tenuerit , talia in morbis patiuntur. Si verò aquilonium fuerit *anni tempus* , (a) tussis , fauces *asperæ* , alvi duræ , urinæ difficultates , horrores , dolores costarum , pectorum. Quum hic dominatus fuerit , talia in morbis exspectare oportet.

(b) Celf. II. 1. pag. 44. l. 22.

6. Quum æstas fit veri similis , sudores (a) in febribus multos exspectare oportet.

(a) Celf. II. 1. p. 45. l. 28.

7. In 1) siccitatibus (a) febres acutæ
D 4 fiunt.

γίνονται. 2) καὶ ἥν μὲν ἐπὶ πλεόν ἢ τὸ ἔτ-
τοιχτέον εἶν, οἷν τὴν κατάστασιν ἐποίησεν,
3) ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ καὶ τὰ νερήματα τοιαῦτα
δεῖ προσδέχεσθαι.

1) Humor. VIII. 6. II. Epid. I. 10.

ή. Ἐν τοῖσι καθεσέωσι καιροῖσιν, ἥν ὠ-
ραίως τὰ ὠραῖα ἀποδιδῶσιν, εὐσαθές, καὶ
εὐκρινές αἱ νῆσοι γίνονται ἐν ᾗ τοῖσιν (b)
ἀκαταστάτοισιν, ἀκατάστατοι, καὶ δύσκρι-
στοι.

Humor. VII. 3. 15. II. Epid. I. 20. 21.

θ'. 1) Ἐν (a) φθινοπώρῳ ὀξύταται αἱ νῆ-
σοι, καὶ θανατωδέστατοι τὸ ἐπίπαν 2) ἥρ δὲ
ὑγιεινότατον, καὶ ἥκιστα θανατωδές.

1) II. Prædict. XIII. 4. (a) Cels. I. 3. p. 33.

II. Epid. I. 15. I. 23. & II. I. p.

2) Epid. I. 23. 42. I. 19. & 29.

ι. Τὸ φθινόπωρον (a) τοῖς φθίνεσι κακόν.
Aph. III. 22. II. Prædict. XIII. 3.

ια. Περὶ ᾗ τῶν ὥρέων, ἥν μὲν ὁ χειμῶν,
(a) αὐχμηρὸς καὶ βόρειος γένηται, τὸ ᾗ ἑαρ
ἐπομβρὸν καὶ νότιον, 1) ἀνάγκη τῷ θέρει πυ-
ρετὸς ὀξείας, καὶ ὀφθαλμίας, 2) καὶ δυσεντε-
ρίας γίνεσθαι, μάλιστα ᾗ τῇσι γυναῖξι, καὶ
ἀνδράσι τοῖσιν ὑγροῖσι τὰς φύσιας.

Ær. Aq. Loc. XXV. 7. 1) II. Epid. I. 10.

ιβ. Ἡν

funt. 2) Et, si quidem annus pro majori parte talis fuerit, qualem fecit constitutionem, 3) ut plurimum etiam tales morbos expectare oportet.

2) Humor. IX. 8. (a) Celf. II. I. p. 45.

3) Aph. III. 19. l. 5.

8. In constantibus (a) temporibus, si tempestivè tempeſtiva reddantur, constantes, & judicatu faciles sunt morbi, in inconstantibus autem, inconstantes: & difficiles judicatu.

(a) Celf. II. I. p. 42. (b) Celf. II. I. pag. 43. l. 19. l. 5.

9. In 1) (a) autumno morbi acutissimi, & perniciosissimi omnino: 2) ver autem saluberrimum, & minimè exitiale.

(a) Celf. II. I. pag. 42. l. 17.

10. Autumnus tabidis malus.

VI. Epid. VII. 77. (a) Celf. II. 8. p. 72. l. 3.

11. De temporibus, si quidem hyems (a) sicca & aquilonia fuerit, ver autem pluviosum & australe, 1) æstate necesse est febres acutas fieri, & ophthalmias, 2) & dysenterias, maximè autem mulieribus, & viris naturâ humidis.

2) Aer. Aq. Loc. XXV. (a) Celf. II. I. p. 45. l. 13. l. 12.

12. Si

ιβ'. Ἦν ᾗ νότιον ὁ χειμῶν, (a) καὶ ἐπομβριον, καὶ εὐδινόν γένηται, I) τὸ δ' ἔαρ αὐχμηρὸν καὶ βόρειον, αἱ μὲν γυναῖκες, ἥσιν οἱ τόκοι πρὸς τὸ ἥρ, ἐκ πάσης προφάσις ἐκτιτρώσκουσιν· αἱ δ' ἂν τέκωσιν, ἀκρετέα καὶ νοσώδεα τὰ παῖδιά τέκωσιν, ὥστε ἢ παρὰυτὰ ἀπόλλυθαι, ἢ λεπτὰ καὶ νοσώδεα ζῆν ἑόντα. τοῖσι δ' ἄλλοις βροτοῖσι δυσεντερίαί, καὶ ὀφθαλμῖαι ξηραὶ γίνονται. τοῖσι δ' πρεσβυτέροις κατάρροι συντόμως ἀπολλύντες.

Aër. Aq. Loc. XXVI. 4. 5. 6.

ιγ'. Ἦν ᾗ τὸ θερμὸν (a) αὐχμηρὸν καὶ βόρειον γένηται, τὸ δ' φθινόπωρον ἐπομβριον (b) καὶ νότιον, κεφαλαλγῖαι ἐς τὸν χειμῶνα γίνονται, καὶ βῆχες, καὶ βράγλαι, καὶ κόρυζαί ἐνίοισι δ' καὶ φθίσεις.

Aër. Aq. Loc. 5. XXVIII. (a) Celf. II. i. pag. 45. I. 31.
4.

ιδ'. Ἦν ᾗ (a) βόρειον ἢ καὶ ἀνδρον, τοῖσι μὲν ὑγροῖσιν ἔσσι τὰς φύσεις, καὶ τῇσι γυναιξί, ξύμφορον· τοῖσι δ' λοιποῖσιν ὀφθαλμῖαι ἔσονται ξηραὶ, καὶ πυρετοὶ ὀξέες, καὶ κόρυζαι (χερόναι) ἐνίοισι δ' καὶ μελαγχολίαί.

Aër. Aq. Loc. XXIX. 1. 2.

ιε'. Τῶν

12. Si verò hyems australis, (a) & pluviosa, & tranquilla sit, 1) ver autem ficcum & aquilonium, mulieres quidem, quibus partus in ver *incidit*, ex omni occasione abortiunt: quæ verò pepererint, infirmos & morbosos pariunt pueros, ita ut vel statim *illi* pereant, vel tenues & morboſi vivant. Cæteris verò mortalibus dyſenterix, & ophthalmix ficcæ fiunt: ſenioribus autem catarrhi brevi perimentes.

1) Nat. Human. XIII. (a) Celf. II. 1. pag. 7. 45. 1, 17.

13. Si verò æſtas ſicca (a) & aquilonia fiat, autumnus autem pluvioſus (b) & australis, capitis dolores ad hyemem fiunt, & tuſſes, & raucedines, & gravedines: quibusdam verò etiam tabes.

(b) Horat. Carm. I. II. Od. XIV. 15.

14. Si verò (a) aquilonius & ſine pluviis *autumnus* fuerit, iis quidem qui naturâ ſunt humidi, & mulieribus, commodus erit: reliquis verò erunt ophthalmix ficcæ, & febres acutæ, & gravedines (diuturnæ:) nonnullis verò etiam melancholiæ.

(a) Celf. II. 1. p. 46. l. 1.

ιέ. Τῶν δὲ κατασασίων τῶ ἐνιαυτῶ, τὸ μὲν ὅλον, οἱ αὐχομοὶ τῶν ἐπομβριῶν εἰσιν (α) ὑγιεινότεροι, καὶ ἥσσον θανατώδεις.

Aër. Aq. Loc. III. 3.

ις'. Νεσήματα ἢ ἐν μὲν τῇσιν (α) ἐπομβρίῃσιν ὥς τὰ πολλὰ γίνεσθαι, πυρετοὶ τε μακροὶ, καὶ κοιλίης ῥύσεις, καὶ σηπεδόνες, 1) καὶ ἐπίληπτοι, καὶ ἀπόκληκτοι, καὶ κυνάγκαι. ἐν δὲ τοῖσιν (β) αὐχομοῖσι, φθινῶδεις, ὀφθαλμῖαι, ἀρθρίτιδες, τραγγερῖαι, καὶ δυσεντερῖαι.

1) Morb. Sac. XVI. 1. 2.

ιζ'. Αἱ δὲ καθ' ἡμέρην κατασάσεις, αἱ μὲν βόρειοι, τὰ τε σώματα (α) ξυνισθῶσι, καὶ εὐτονα, καὶ εὐκίνητα, (β) καὶ εὐχροα, καὶ εὐηκοώτερα ποίεσσι, καὶ τὰς κοιλίας ξηραίνουσι, καὶ τὰ ὅμματα δάκνουσι, καὶ περὶ τὸν θώρηκα ἀλγῆμα, ἢν τι προῦπάεχῃ, μᾶλλον πονέουσιν. αἱ δὲ νότιοι (γ) διαλύουσι τὰ σώματα, καὶ ὑγραίνουσι, καὶ βαρυηκοίας, καὶ καρηθαρίας ποίεσσι, καὶ ἰλίγγους ἐν τοῖσιν ὀφθαλμοῖσι, καὶ 1) τοῖσι σώμασι δυσκινουσίην, καὶ τὰς κοιλίας ὑγραίνουσι.

1) Aph. V. 16.

(α) Cels. II. 1. p. 44. l. 25.

ιθ'. Κατὰ ἢ τὰς ὥρας, τῶ μὲν ἥρος, καὶ ἁκρῶς
τῶ

15. Ex anni verò constitutionibus, in univèrsū quidem, siccitates pluviōsis (a) sunt salubriores, & minus lethales.

a) Celf. II. 1. p. 42. l. 29.

16. Morbi autem, in pluviōsis (a) quidem plerumque fiunt, & febres longæ, & alvi fluxiones, & putredines, 1) & epileptici, & apoplectici, & anginæ. In siccitatibus (b) verò, tabidi, ophthalmiæ, arthritides, urinæ stillicidia, & dysentericiæ.

(a) Celf. II. 1. p. 45. l. 7.

(b) Celf. II. 1. p. 45. l. 5.

17. Quotidianæ autem constitutiones, aquiloniæ quidem, (a) corpora compingunt, & robusta, (b) & facile mobilia, & benè colorata, & melius audientia faciunt, & alvos siccant, & oculos mordent, & dolorem circa thoracem, si quis præexistat, majorem faciunt. Austrinæ verò, (c) corpora dissolvunt, & humectant, & auditus graves, & capitis gravitates faciunt, & vertigines in oculis, 1) & corporibus motum difficilem & alvos humectant.

Celf. I. 9. p. 32. l. 27.

Celf. II. 1. p. 44. l. 27.

18. Secundum tempora autem, vere
E qui-

τῷ θέρει, οἱ παῖδες, (α) καὶ οἱ τεττέων ἐχόμενοι τῇσιν ἡλικίῃσιν, ἄριστά τε θλιάγασσι, καὶ ὑγιαίνουσι μάλιστα. 1) τῷ ᾧ θέρει, καὶ τῷ φθινοπώρῃ μέχρι μὲν τινος, αἱ γέροντες. τὸ ᾧ λοιπὸν τῷ φθινοπώρῃ, καὶ τῷ χειμῶνι, οἱ μέσοι τῇσιν ἡλικίῃσι.

1) Morb. Sac. XII. 1.

ιβ'. Νοσήματα ᾧ πάντα μὲν ἐν (α) πάσῃσι τῇσιν ὥρῃσι γίνονται, 1) μᾶλλον δ' ἐνία κατ' ἐνίας αὐτέων καὶ γίνονται, καὶ παροξύνονται.

Prænot. XXVII. 4.

1) Aph. III. 17.

κ'. Τῷ μὲν γὰρ (α) ἥρῃ, τὰ μανικὰ, καὶ τὰ μελαγχολικὰ, 1) καὶ τὰ ἐπιληπτικὰ. 2) καὶ αἱμαλῇ ῥύσιες, καὶ κυνάγχαι, καὶ κόρυζαι, καὶ βράγχαι, καὶ βῆχες, καὶ λέπραι, καὶ λειχῆνες, καὶ ἀλφοὶ, καὶ (β) ἐξανθήσιες ἐλκώδεις πλεῖσαι, καὶ φύματα, 3) καὶ ἀσθετικά.

1) Morb. Sac. XII. 5. 6. 7.

2) Nat. Human. XIII. 11.

3) Aph. VI. 55.

κβ'. Τῷ δὲ θέρει, ἐνία τε τεττέων, καὶ πυρετοὶ ξυνεχέες, 1) καὶ καῦσοι, καὶ τριταῖοι πλεῖστοι, καὶ τεταρταῖοι, καὶ (α) ἔμετοι, καὶ θλιάσσοι, καὶ ὀφθαλμῖαι, καὶ ὠτων πόνοι, καὶ 50-

quidem, & primâ æstate, pueri, & his ætate proximi, optimè degunt, & maximè sani sunt. 1) Æstate verò, & autumno ad aliquam quidem partem, fenes. Reliquo autem autumno, & hyeme, qui medii sunt ætate.

(a) Celf. II. 1. p. 46. l. 9.

19. Morbi autem omnes quidem (a) in omnibus temporibus fiunt: 1) nonnulli verò in quibusdam ipforum magis & fiunt, & exacerbantur.

(a) Celf. II. præf. p. 42. l. 3.

20. Nam vere (a) quidem, infaniæ, & melancholiæ, & 1) epilepsiæ, 2) & sanguinis fluxiones, & anginæ, & gravedines, & raucedines, & tusses, & lepræ, & impetigines, & vitiligines, & (b) pustulæ ulcerosæ plurimæ, & tubercula, 3) & articulorum dolores.

(a) Celf. II. 1. pag. 43. l. 20.

(b) Celf. v. 28. §. 15. p. 336. l. 7.

21. Æstate verò, & horum nonnulli, & febres continuæ, 1) & ardentes, & tertianæ plurimæ, & quartanæ, & vomitus, & alvi fluxus, & ophthalmiæ,

E 2 &

ἢ σομάτων ἰλκώσεις, καὶ σηπεδόνες αἰδοίων, καὶ ἰδρώα.

Affection. XIII. 1. ad 5.

1) Vict. Acut. XXXIV. 2.

κβ'. Τῆς ᾗ φθινοπώρας, καὶ τῶν θερυνῶν τὰ πολλὰ, 1) καὶ πυρετοὶ τεταρταῖοι, καὶ (α) πλάνητες, 2) καὶ σπληνῆνες, καὶ ὕδρωπες, 3) καὶ φθίσεις, καὶ σφαγγαίαι, ἢ λειεντερίαί, καὶ δυτεντερίαί, καὶ ἰχτιάδες, καὶ κυνάγχαι, καὶ ἄσθματα, καὶ εἰλεοὶ, καὶ ἐπιληψίαί, καὶ τὰ μανικὰ, καὶ τὰ μεγαλυχολικά.

1) Nat. Human. XXIX. 2.

2) Int. Affect. XXXVII. 2.

κγ'. 1) Τῆς ᾗ (α) χειμῶν, πλευρίτιδες, περιπνευμονίαί, λήθαργοι, κόρυζαι, βράγχοι, βῆχες, 2) πόνοι στήθεων, ἢ πλευρῶν, καὶ ὀσφύ, καὶ κεφαλαλγίαί, ἰλιγγοί, 3) ἀποπληξίαί.

1) Affection. VII. 3. 4.

2) Aph. VI. 5.

κδ'. Ἐν δὲ τῇσιν ἡλικίῃσι τοιαύτῃ συμβαίνει τοῖσι μὲν μικροῖσι (α) ἢ νεογνοῖσι παιδίοισιν, ἄφθαι, ἔμετοι, βῆχες, ἀγρυπνίαί, φόβοι, ὀμφαλῶ φλεγμοναὶ, ὧτων ἰγρότητες.

(α) Cels. II. 1. 46. 1. 16.

κε'. Πρὸς ᾗ τὸ (α) ὀδοντοφυεῖν προσάγ-
σιν,

& aurium dolores , & oris exulcerationes , & pudendorum putredines , & sudamina.

(a) Celf. II. 1. p. 43. l. 33.

22. Autumno autem , & multi ex æstivis, 1) & febres quartanæ, (a) & erroneæ, 2) & lienes, & hydropes, 3) & tabes, & urinæ stillicidia , & lenteriæ , & dyfenteriæ , & coxæ dolores , & anginæ , & asthmata , & volvuli , & epilepsiæ , & insanix , & melancholiæ.

3) Aph. III. 10.

(a) Celf. II. 1. p. 44. l. 5.

23. 1) Hyeme (a) verò, pleuritides , peripneumonix , lethargi , gravedines, raucedines, tusses, 2) dolores pectorum, & laterum , & lumborum, & capitis dolores, vertigines , 3) apoplexiæ.

3) Glandul. IX. 4. ad 8.

(a) Celf. II. 1. p. 44. l. 19.

24. In Ætatibus autem talia eveniunt. Parvis quidem (a) & recens natis pueris, aphthæ, vomitus, tusses, vigiliæ, pavores, umbilici inflammationes, aurium humiditates.

Æginet. I. 10.

25. Ad dentitionem verò (a) accedentibus,

σιν, ἔλων ὀδαξισμοὶ, πυρετοὶ, 1) σπασμοὶ, διαῤῥοαὶ, καὶ μέλισσα, ὅταν ἀνάγωσι τὰς κυνόδοκας, καὶ τοῖσι παχὴλάτοισι τῶν παιδίων, 2) καὶ τοῖσι σκληρὰς τὰς κοιτίας ἔχουσι.

1) Aëg. Aq. Loc. IV. 5. 2) Aph. II. 53. Morb. Sac. XI. 1.

κς'. Πρεσβυτέροις ἢ γενομένοις, παρίθμια, (α) σπονδύλας τὰς κατὰ τὸ ἰνὸν εἰσὼ ὤσεις, ἄσθματα, 1) λιθιάσιες, 2) ἐλκινθες σρογύλαι, ἄσκαρίδες, ἀκροχερδόνες, 3) σατυριασμοὶ, (σραγχερίαι) χοιράδες, καὶ τὰλλα φύματα, μέλισσα δὲ τὰ πρὸς εἰρημένα.

1) Nat. Human. XXIV. 5. Coac. III. 398. IV. Morb. XXVIII. 1. 2.

κζ'. Τοῖσι δὲ ἔτι (α) πρεσβυτέροις, καὶ πρὸς τὴν ἡσὴν προσάγχει, τετάρων τε τὰ πολλὰ, καὶ πυρετοὶ χρόνιοι μᾶλλον, καὶ ἐκ ῥινῶν αἵματι καὶ ῥύσιες.

(α) Celf. II. 1. p. 46. l. 31.

κη'. Τὰ δὲ πλεῖστα τοῖσι παιδίοις πάθηα κρίνεται, τὰ μὲν, ἐν (α) τεσσαράκοντα ἡμέρησι· τὰ δὲ, ἐν ἑπτὰ μηνί· τὰ δὲ, ἐν ἑπτὰ ἔτεσι· τὰ δὲ, πρὸς τὴν ἡσὴν προσάγχουσιν. 1) ὅσα δὲ ἂν διαμείνῃ τοῖσι παιδίοις καὶ μὴ ἀπολεθῇ περὶ τὸ (β) ἡσάσκειν, ἢ τῇσι θήλεσι

tibus , gingivarum pruritus , febres ,
 1) convulsiones , alvi profluvia , & ma-
 ximè ubi caninos dentes producant ,
 & iis qui inter pueros sunt crassissimi ,
 2) & qui alvos duras habent.

(a) Cels. II. I. p. 46. l. 20.

Æginet. I. 8.

26. Iis autem qui ætate sunt majores , (a) tonsillæ *inflammatae* , verticuli in occipitio introrsum extrusiones , asthmata , 1) calculorum generationes , 2) lumbrici rotundi , ascarides , verrucæ peniles , 3) satyriasmi , (stranguriæ ,) strumæ , & alia tubercula , maximè verò suprà dicta.

2) IV. Morb. XXVII. 9.

3) VII. Epid. LI. 16.

(a) Cels. II. I. p. 46. l. 26.

27. Ætate verò adhuc (a) provectionibus , & ad pubertatem accedentibus , & multa ex illis , & febres diuturnæ magis , & ex naribus sanguinis fluxiones.

28. Plurimæ quidem affectiones pueris judicantur , aliæ (a) in quadraginta diebus : aliæ in septem mensibus : aliæ in septem annis : aliæ *ipsis* ad pubertatem accedentibus. 1) Quæ verò pueris permanserint , neque solutæ fuerint cir-

θήλεσι περὶ τὰς τῶν καταμηνίων ῥήξιας,
 χρονίζειν εἰωθε.

1) Aph. II. 45.

II. Prædict. XVI. 1. 3.

(a) Celf. II. 1. pag. 46. l. 34.

κθ'. Τοῖσι ᾗ νενήσκουσιν, αἵματι πτύ-
 σεις, 1) (a) φθίσιας, πυρετοὶ ὀξείας, 2) ἐπι-
 ληψίαι, καὶ τὰλλα νεσθήματα, μάλιστα δὲ
 τὰ προειρημένα.

1) Aph. V. 9.

VIII. 7.

Coac. III. 260.

λ'. Τοῖσι ᾗ ὑπὲρ τὴν ἡλικίην (a) ταύτην,
 ἄσθματα, 1) πλευρίτιδες, περιπνευμονίαι,
 λήθαργοι, φρενίτιδες, καῦσοι, 2) διάρροιαι
 χρόνιαι, χολέραι, δυσεντερίαι, λειεντερίαι,
 αἰμορροΐδες.

1) Coac. III. 395.

2) Aër. Aqu. Loc. IV. 7.

λά. Τοῖσι ᾗ (a) πρεσβύτησι, δύσπνοιαι,
 κατάφροι βηχώδες, 1) σφαγγαρίαι, δυσχε-
 ρίαι, 2) ἄσθρων πόνοι, νεφρίτιδες, ἰλιγγίαι,
 ἀποπληξίαι, καχεξίαι, ξυσμοὶ τοῦ σώμα-
 τος ὅλα, ἀγρυπνίαι, κοιλίης, καὶ ὀφθαλ-
 μιῶν, καὶ ῥινῶν ὑγρότητες, ἀμβλυωπίαι, γλαυ-
 κώσεις, βαρυηκοΐαι.

1) Affection. XXIX. 10.

(a) Coac. III. 395.

Τμήμα

ca (b) pubertatem , aut foëminis circa menstruorum eruptiones , perseverare solent.

(b) Celf. II. 1. p. 47. l. 4.

Plin. XXVIII. c. 4. p. 689. l. 9.

29. Juvenibus autem, sanguinis spuitiones, 1) (a) tabes , febres acutæ , 2) epilepsiæ, & alii morbi, maximè verò suprà nominati.

2) Morb. Sac. XIII. 1.

(a) Celf. II. 1. p. 47. l. 9.

30. Ultra hanc ætatem verò (a) *progressis* , asthmata , 1) pleuritides , peripneumoniæ , lethargi , phrenitides , febres ardentes , 2) alvi profluvia diuturna , cholerae , dysenteriae , lenteriae , hæmorrhoides.

VII. Epid. XL. 19.

(a) Celf. II. 1. p. 47. l. 11.

31. Senibus autem, (a) spirandi difficultates, catarrhi tussiculosi, 1) stranguariæ , dysuriæ , 2) articulorum dolores , nephritides , vertigines , apoplexiæ , mali corporis habitus , pruritus totius corporis , vigiliæ , alvi , & oculorum , & narium humiditates , visus hebetudines , glaucedines , auditus gravitates.

(a) Celf. II. 1. p. 47. l. 15.

Sectio

Τρῆμα τέταρτον.

Α'.

Τὰς κυέσας φαρμακεύειν, 1) ἢν ὀργᾶ, τετράμηνα, καὶ ἄχρι ἐπτά μηνῶν ἤσ-
σον δὲ ταύτας. 2) τὰ ἢ νήπια, (a) καὶ πρεσ-
βύτερα, εὐλαβέεσθαι χρή.

Aph. V. 29. 1) Vid. Aph. I. 22.
2) I. Morb. Mul. XLII. 8.

β'. Ἐν τῇσι φαρμακείῃσι τοιαῦτα ἄγειν
ἐκ τῆς σώματος, 1) ὁποῖα καὶ αὐτόματα
ἰόντα χρήσιμα· τὰ δ' ἐναντίως ἰόντα,
παύειν.

1) Aph. I. 2.

γ'. Ἦν μὲν, οἷα δεῖ καθαίρεσθαι, καθαί-
ρωνται, συμφέρεται τε καὶ εὐφόρως φέρεται· τὰ
ἢ ἐναντία, δυσχερῶς.

Vid. Aph. I. 25.

δ'. Φαρμακεύειν, 1) θέρει μὲν, (a) μᾶλ-
λον τὰς ἄνω, 2) χειμῶν ἢ, τὰς κάτω.

1) V. Epid. XXV. 16. 17.

2) Salub. Diet. V. 10.

ε'. Ὑπὸ κύνα, καὶ πρὸ κυνός, 1) ἐργά-
δες αἱ φαρμακεῖαι.

Aër. Aq. Loc. XXX. 2. 5. 8.

Purgant. V. 8.

ς'. Τὸς

Sectio Quarta.

I.

PRægnantes purgandæ, 1) si *materia* turgeat, quadrimestres, & usque ad septimum mensem: hæ verò minus. 2) Juniores autem, (a) & seniores *fæ-tus*, cautè vitare oportet.

(a) Cels. II. 10. p. 78. l. 5.

2. In purgationibus talia è corpore sunt ducenda, 1) qualia etiam spontè prodeuntia utilia sunt: contrario autem modo prodeuntia, sistenda.

3. Si quidem, qualia purgari oportet, purgentur, confert, & facilè ferunt: contraria verò, difficulter.

4. Purgandum, 1) æstate quidem, (a) magis superiores *ventres*: 2) Hyeme verò, inferiores.

(a) Cels. I. 3. p. 29. l. 21.

5. Sub cane, & ante canem, 1) difficiles sunt purgationes.

1) Aph. II. 17.

6. Gra-

ς'. Τὰς ἰχθυῖς, (α) καὶ εὐημέας, ἄνω φαρμακεύειν, ὑποσεκχομένους χειμῶνα.

II. Morb. XIII. 12.

ζ'. Τὰς ἡ δυσημέας, καὶ μέσως εὐσάρκας, κάτω, ὑποσεκχομένους θέρει.

II. Morb. XII. 35.

η'. Τὰς ἡ φθινώδεις, ὑποσεκχομένους τὰς ἄνω (φαρμακείας.)

Loc. in Hom. XXXV. 4.

θ'. Τὰς ἡ μελαγχολικὰς, ἀδρύτερας τὰς κάτω. τῷ αὐτῷ λογισμῷ τὰναντία προσιθεῖς.

Aër. Aq. Loc. XI. 2.

ί'. Φαρμακεύειν ἐν τοῖσι λίην ὀξέσιν, 1) ἢ ὄργῃ, 2) αὐθιμερόν· χρονίζειν γὰρ ἐν τοῖσι τοῖςτοις, κακόν.

1) Vid. Aph. I. 22.

ιά. Οὐόσοισι σρόφοι, (α) καὶ περὶ τὸν ὀμφαλὸν πόνοι, καὶ ὀσφύϊ ἄλγῃμα, μὴ λυόμενον, μήτε ὑπὸ φαρμακείης, μήτ' ἄλλως, 1) ἐς ὕδρωπα ξηρὸν ἰδρύεται.

Coac. II. 279.

1) Coac. III. 286.

ιβ'. Οὐόσοισι κοιλίαι λειεντεριώδεις, χειμῶν φαρμακεύειν ἄνω, κακόν.

ιγ'. Πρὸς

6. Graciles, (a) & facilè vomentes, sursum purgandi, vitantes hyemen.

(a) Celf. I. 3. p. 29. l. 23.

7. Difficulter autem vomentes, & mediocriter carnosì, deorsum, vitantes æstatem.

8. Tabidi verò, vitantes (purgationes) sursum.

Int. Affect. IV. 26.

XIII. 36.

9. Melancholicos autem, uberiùs deorsum *purgabis*. Eâdem ratione, contraria adhibens.

10. Purgandum in valdè acutis, 1) si turgeat *materia*, 2) eâdem die: morari enim in talibus, malum est.

2) V. Epid. XXV. 16. 17.

11. Quibus tormina, (a) & circa umbilicum dolores, & lumborum dolor, qui neque purgante, neque aliter solvitur, 1) in hydropem siccum firmatur.

(a) Celf. II. 7. pag. 59. l. 13.

12. Quibus alvi sunt lientericæ, eos hyeme sursum purgare, malum est.

F

13. Ad

ιγ'. Πρὸς τὰς ἐλλέθορας, τοῖσι μὴ ῥηϊδίως
ἀνω καθαιρεμένοισι, πρὸ τῆς πόσις προὔ-
γχειν τὰ (α) σώματα, πλείονι τροφῇ, καὶ
ἀναπαύσει.

Aph. I. 22.

Verat. uf. I. 1.

II. 9.

II. Morb. XIII. 10. ad 13.

VII. 70.

Int. Affect. XXIII. 31.

II. Diæt. XXXVI. 18.

XXIX. 41.

ad XXXVII.

XLVII. 34.

Loc. in Hom. XL. 3.

ιδ'. Ἐπὴν πῆ τις ἐλλέθορον, πρὸς μὲν τὰς
κινήσιας τῶν σωμάτων, μάλλον ἄγειν. πρὸς
δὲ τὰς ὕπνους, καὶ μὴ κινήσιας, ἥσσουν. δηλοῖ
δὲ καὶ ἡ ναυτιλίη, ὅτι I) κίνησις τὰ σώμα-
τα ταράσσει.

Verat. uf. I. 2.

VI. Epid. V. 45.

ιε'. Ἐπὴν βέλη μάλλον ἄγειν τὸν ἐλλέθο-
ρον, κίνει τὸ σῶμα· ἐπὴν δὲ παῦσαι, I) ὕ-
πνον ποιεῖ, καὶ μὴ κίνει.

Verat. uf. I. 4.

VI. Epid. V. 45.

Superfoet. XX. 1.

ις'. Ἐλλέθορον ἐπικίνδυνον τοῖσι τὰς
(α) σάρκας ὑγίειας ἔχουσι· I) σπασμὸν γὰρ
ἐμποιεῖ.

Aph. II. 36. 37.

Verat. uf. I. 5.

ιζ'. Ἀπυρέτω ἐόντι, ἀποσιτίη, καὶ καρ-
διωγμός, I) καὶ σκοτόδιον, καὶ σόμα (α) ἐκ-
πικρύν-

13. Ad elleboros, qui non facilè sursum purgantur, *iis* ante potionem corpora (a) præhumeſcenda, copioſiore alimento, & quiete.

I. Morb. Mul. XXV. (a) Celf. II. 12. p. 86.

13. 14. 1. 6. II. 13. p. 87.

XXXI. 9. 1. 19.

Superſect. XX. 1.

14. Ubi biberit quis elleborum, ad motiones quidem corporum, magis ducit. Ad ſomnos verò, & quietem, minùs. Declarat autem etiam navigatio, quòd 1) motus turbat corpora.

1) Aph. II. 51.

15. Quando vis magis ducere elleborum, moveto corpus. Quando verò ceſſare, 1) ſomnum facito, & non moveto.

1) Aph. V. 27.

VI. Epid. V. 45.

16. Elleborus periculofus eſt fanas (a) carnes habentibus: 1) convulſionem enim inducit.

1) Aph. V. 1.

(a) Celf. II. 13. p. 87. l. 24.

17. Non febricitanti, appetitus dejectus, & oris ventriculi morſus, 1) &

πικρῶμενον, ἄνω φαρμακείης δεῖσθαι, σημαίνει.

Verat. uf. I. 10.

Affection. XIV. 12.

ιγ. Τὰ ὑπὲρ τῶν φρενῶν ὀδυνήματα, ὅκῳσα καθάρσιϑ δέονται, ἄνω φαρμακείης δεῖσθαι, σημαίνει· ὅκῳσα δὲ κάτω, κάτω.

Verat. uf. I. 10. 11.

ιδ'. Οἷοι ἐν τῇσι φαρμακοποσίῃσι μὴ διψῶσι καθαιρόμενοι, ἔπαύονται, πρὶν ἢ διψήσωσιν.

Verat. uf. I. 6.

κ'. Ἀπυρέτοισιν ἔσθιν ἣν γένηται εὐρόφϑ, καὶ γυνάτων βάρϑ, καὶ ὀσφύϑ ἄλγῃμα, κάτω φαρμακείης δεῖσθαι, σημαίνει.

Verat. uf. I. 11.

κά. 1) Ὑποχωρήματα (α) μέλανα, 2) ὀκοῖον αἷμα μέλαν, 3) ἀπ' αὐτομάτῃς ἰόντα, καὶ ξὺν πυρετῶ, καὶ ἄνευ πυρετῆ, κάκισα. 4) καὶ, ὅκῳς ἂν τὰ χρώματα ὑποχωρημάτων πλείω πονηρότερα ἢ, μαῶλλον κάκιον· ξὺν φαρμάκῳ ᾗ, ἄμεινον· 5) καὶ, ὅκῳς ἂν χρώματα πλείω, ἔπονηρά.

1) Prænot. X. 6.

2) Aph. IV. 23.

Coac. III. 36.

Coac. III. 1.

VII. 22. ad 26. 42. 3) Aph. I. 2.

κβ'. Νεσημάτων ὀκῳσων ἀρχομένων, ἣν
χολή

tenebricosa vertigo, & os(a) amarefcens, fufum purgante opus eſſe, indicat.

1) II. Morb. Mul. XXIV. 2. 3.

(a) Celf. I. 3. p. 29. l. 31.

18. Supra ſeptum tranſverſum dolores, qui purgatione egent, fufum purgante opus eſſe, indicant. Qui verò infra, deorſum.

19. Qui in purgantium potionibus non ſitiunt dum purgantur, non ceſſant priuſquam ſitiverint.

20. Non febricitantibus ſi fiat tor-
men, & genuum gravitates, & lumbo-
rum dolor, deorſum purgante opus eſ-
ſe, indicat.

21. 1).Dejectiones (a) nigræ, 2) qua-
lis ſanguis niger, 3) ſpontè prodeuntes,
& cum febre, & ſine febre, peſſimæ.
4) Et, quantò colores dejectionum plu-
res fuerint peiores, eò deterius: cum
purgante verò, melius. 5) Et, quantò
colores plures, non mali ſunt.

4) Coac. VI. 24.

(a) Celf. II. 8. p.76.

5) Aph. II. 14.

l. 19.

22. Morbis quibusvis incipientibus,
F 3 ſi bilis

χολή (α) μέλαινα ἢ ἄνω, ἢ κάτω ἐπέλθῃ
θανάσιμον.

Coac. I. 100.

κγ'. Οὐόσοισιν ἐκ νησηριάτων (α) ὀξέων,
ἢ ἐκ πολυχρονίων, ἢ ἐκ τρωμάτων, ἢ ἄλ-
λως πῶς λεπθυομένοις, χολή μέλαινα, ἢ
ὀκοῖον αἷμα μέλαν, ἐπέλθῃ, τῇ ὑπεραίῃ
ἀποθνήσκει.

1) Aph. IV. 21.

κδ'. Δυσεντερίῃ, ἣν ἀπὸ χολῆς μελαίνης
ἄρξῃται, θανάσιμον.

Coac. I. 100.

III. 292.

κέ. Αἷμα ἄνω μὲν, ὀκοῖον ἂν ἢ κακόν
κάτω δὲ, ἀγαθόν, μέλαν ὑποχωρέον.

Aph. VII. 37.

κε'. Ἡ ὑπὸ δυσεντερίης ἐχορέων οἶον
1) σάρκες ὑποχωρήσωσι, θανάσιμον.

1) Aph. IV. 76.

κς'. Οὐόσοισιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν αἱμερ-
ραγέει πλῆθ' ὀκοθενῶν, ἐν τῇτιν ἀναλήψε-
σι, τετέοισιν αἱ κοιλίαι καθυγραίνονται.

Coac. I. 227.

III. 53.

κη'. Οὐό-

si bilis atra vel sursum, vel deorsum prodierit, lethale.

(a) Celf. II. 6. p. 55. l. 33.

23. Quibuscunque, ex morbis acutis, aut ex diuturnis, aut ex vulneribus, aut aliter quocunque modo extenuatis, bilis atra, 1) vel qualis sanguis niger, prodierit, postridiè moriuntur.

(a) Celf. II. 6. p. 55. l. 34.

24. Dyfenteria, si ab atra bile inceperit, lethale.

V. Epid. X. 2.

(a) Celf. II. 8. p. 74. l. 1.


25. Sanguis sursum quidem, qualiscunque sit, malum. Deorsum verò, bonum, niger subtùs secedens.

Coac. II. 254.

VI. 14.

26. Si à dyfenteria detento velut 1) carunculæ secesserint, lethale est.

27. Quibus per febres sanguinis copia undecunque eruperit, in refectionibus, his alvi humectantur.

κγ'. Οκόσοισι (α) χολώδεα τὰ διαχωρήματα, κωφάσι  ἐπιγινομένης, παύεται καὶ ὁκόσοισι κωφάσις, χολωδέων ἐπιγινομένων, παύεται.

Aph. IV. 60.

Coac. II. 66. 103.

VI. 77.

κδ'. Οκόσοισιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν (α) ἐκταιοῖσιν ἔῃσι ρίγες γίνεται, δύσκριτα.

Coac. I. 23.

VII. Epid. XL. 20.

λε'. Οκόσοισι παροξυσμοὶ γίνονται, ἣν ἂν ὥρην ἀφ᾽ ἣ ὁ πυρετός, ἐς τὴν αὐρίον τὴν αὐτὴν ὥρην ἣν λάβῃ, δύσκριτα.

Humor. III. 91.

λα'. 1) Τοῖσι κοπώδεσιν (α) ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν, ἐς ἄρθρα, καὶ παρὰ τὰς γνάθους μάλισα, αἱ ἀποσάσεις γίνονται.

Humor. III. 98.

IV. Epid. XVIII. 16. 17.

λβ'. Οκόσοισι διὲ ἀνισαμένοισιν ἐκ τῶν νέσων τι πονέει, ἐνταῦθα αἱ ἀποσάσεις γίνονται.

Humor. III. 100.

λγ'. Ἀτὰρ, ἣν καὶ προπεπονηκός τι ἢ πρὸ τῆ νοσέειν, ἐνταῦθα σπρίζει ἡ νῆσος.

Loc. in Hom. XXXVI. 6.

Humor. III. 101.

IV. Epid. XXVIII. 2. 3.

λδ'. Ἦν

28. Quibus (a) biliosæ sunt egestiones, surditate superveniente, cessant. Et, quibus surditas, biliosis supervenientibus, cessat.

(a) Cels. II. 8. p. 70. l. 20.

29. Quibus per febres sextâ die rigores fiunt, (a) difficulter judicantur.

(a) Cels. II. 4. p. 51. l. 11.

30. Quibus exacerbationes fiunt, quâcunque horâ dimiserit febris, postridie eâdem horâ si corripuerit, difficulter judicantur.

31. 1) Lassatis per febres, (a) ad articulos, & circa maxillas maximè, abscessus fiunt.

1) Aph. II. 5.

IV. 74.

(a) Cels. II. 7. p. 65. l. 8.

32. Quibus ex morbo resurgentibus aliquid dolet, ibi abscessus fiunt.

33. Sed &, si quid doluerit ante morbum; ibi se figit morbus.

VI. Epid. VII. 15. ad 19.

Viét. Acut. XLIV. 2. 3.

34. Si

λδ'. Ἦν ὑπὸ πυρετῷ (α) ἐχομένῳ, οἰδή-
μαλ' & μὴ ἐόντ' ἐν τῇ φάρυγγι, πνιξ ἐξαί-
φνης ἐπιγίγνηται, θανάσιμον.

Aph. IV. 35.

Prænot. XXIII. 3. 4.

λέ'. Ἦν ὑπὸ πυρετῷ ἐχομένῳ ὁ τράχηλ' &
ἐξαίφνης ἐπισραφῇ, καὶ μάλιστα καταπίνειν,
δύνηται, οἰδήμαλ' & μὴ ἐόντ', θανάσιμον.

Aph. IV. 34.

VII. 58.

λς'. Ἰδρῶτες πυρεταίνουσιν ἢ ἀρξάνται,
ἀγαστοὶ τριταῖοι, καὶ πεμπταῖοι, καὶ ἐνδο-
μαῖοι, καὶ ἐνταταῖοι, καὶ ἐνδεκαταῖοι, καὶ τεσ-
σαρεσκαίδεκαταῖοι, καὶ ἑπτακαίδεκαταῖοι,
καὶ μίῃ καὶ εἰκοσῇ, καὶ ἐξδόμενῃ καὶ εἰκοσῇ, καὶ
τριακοσῇ πρώτῃ, καὶ τριακοσῇ τετάρτῃ. ἔτσι
γὰρ οἱ ἰδρῶτες νέκτους κρίνουν. 1) οἱ ὅ μὴ
ἔτσι γινώσκοντες, πόσον σημαίνουν, καὶ μῆκος
νέκτου, καὶ 2) ὑποτροπιασμούς.

Aph. II. 24.

Prænot. V. I. 2. 3.

Judication. I. 2. Coac. IV. 36.

IV. 13. I. Epid. III. Æg. XIV. 7.

λς'. Οἱ ψυχροὶ (α) ἰδρῶτες, ξὺν μὲν ὀξεί
πυρετῷ γινόμενοι, θάνατον ξὺν περὶ πρῶτον ὅ
μῆκος & νέκτου σημαίνουν.

Judication. VI. 9. 10.

VIII. I. 8.

Prænot. V. 4. 5.

λγ. Καὶ

34. Si à febre detento, tumore in faucibus non existente, suffocatio ex improvîso superveniat, lethale.

Coac. I. 90.

II. 201. 202. 221.

III. 96.

35. Si à febre detento collum derrepente inversum fuerit, & vix deglutire possit, tumore non existente, lethale.

Coac. II. 221. ad 224.

III. 96.

(a) Cels. II. 6. p. 55. l. 17.

36. Sudores febricitantibus si inceperint, boni sunt die tertiâ, & quintâ, & septimâ, & nonâ, & undecimâ, & quartâ decimâ, & septimâ decimâ, & vigesimâ primâ, & vigesimâ septimâ, & trigesimâ primâ, & trigesimâ quartâ. Hi enim sudores morbos judicant.

1) Qui verò ita non fiunt, laborem significant, & morbi longitudinem, 2) & recidivas.

1) Prænot. XXIV. 8. 2) Aph. II. 12.

Coac. I. 115.

IV. 61.

37. Sudores frigidi, cum acutâ quidem febre evenientes, mortem, cum mitiore verò, morbi longitudinem significant.

Coac. IV. 40.

(a) Cels. II. 4. p. 51. l. 30. II. 5. p. 53. l. 17. II. 6. p. 56. l. 11.

38. Et

λή. Καὶ ὅκx ἐν τῷ σώματι ἰδρῶς, (a) ἐνταῦθα φράζει τὴν νῆσον.

Aph. II. 5.

λθ'. Καὶ ὅκx ἐν τῷ (a) σώματι θερμὸν, ἢ ψυχρὸν, ἐνταῦθα ἡ νῆσος.

Judication. VIII. 3.

μ'. Καὶ ὅκx ἐν ὅλῳ τῷ σώματι μεταβολαί, καὶ ἢν τὸ σῶμα (a) καταψίχεται, ἢ αὐτὸς θερμαίνεται, ἢ χρῶμα ἕτερον ἐξ ἑτέρου γίγνεται· μῆκος νῆσος σημαίνει.

Aph. VII. 60.

Humor. III. 22. 53.

Judication. VIII. 4.

μά. 1) Ἰδρῶς πολὺς ἐξ ὕπνου ἀνευ φανε-
ρῆς αἰτίας γινόμενος, τὸ σῶμα σημαίνει ὅτι
πλείονι τροφῇ χρεέται. 2) ἢν δὲ τροφὴν μὴ
λαμβάνοντι τῷτο γίγνεται, σημαίνει ὅτι
κενώσι· δέεται.

Aph. VII. 61.

1) Coac. IV. 36.

μβ'. Ἰδρῶς πολὺς, ψυχρὸς ἢ θερμὸς,
αἰεὶ ῥέων, ὁ μὲν ψυχρὸς μείζων, ὁ δὲ θερ-
μὸς ἐλάσσων νῆσον σημαίνει.

Aph. VII. 61.

Judication. VIII. 9.

μεγ'. Οἱ πυρετοὶ, (a) ὁπόσοι μὴ διαλεί-
πον-

38. Et quâ corporis parte inest sudor, ibi morbum *esse* judicat.

(a) Celf. II. 2. p. 48. l. 19.

39. Et quâ corporis parte (a) inest calor, aut frigus, ibi morbus est.

(a) Celf. II. 2. p. 48. l. 15.

40. Et ubi in toto corpore mutationes, & si corpus perfrigeretur, aut rursus calefiat, (a) aut calor alius ex alio fiat, morbi longitudinem significat.

I. Prædict. VI. 4.

Coac. I. 77. 177.

(a) Celf. II. 5. 53. l. 20.

41. 1) Sudor multus à somno citra causam manifestam factus, corpus uberiori alimento uti significat. 2) Si verò cibum non capienti hoc fiat, evacuatione indigere significat.

V. Epid. XXV. 15.

2) Aph. II. 8.

42. Sudor multus, frigidus aut calidus, semper fluens, frigidus quidem majorem, calidus verò minorem morbum significat.

Coac. I. 21.

I. Morb. XXII. 35. ad XXIII.

43. Febres, (a) quæcunque non in-
G
ter-

ποντες διὰ τρίτης ἰχυρότεροι γίνονται, μᾶλλον ἐπικίνδυνοι ὅτῳ δ' ἂν τρώῃ (b) διαλείψῃ, σημαίνει ὅτι ἀκίνδυνοι.

Aph. VII. 62. III. Epid. III. 109.
Coac. I. 166. VII. Epid. XL. 19.
I. Epid. III. 16. Vict. Acut. III. 3.

μδ'. Οὐόσοισι πυρετοὶ μακροὶ, (a) τετέοισι φύματα ἐς τὰ ἄεθρα, ἢ πόνοι ἐγγίνονται.

Aph. VII. 63.
Humor. III. 98.
Prænot. XXIV. 9. 10. 11.

μέ. Οὐόσοισι φύματα ἐς τὰ ἄεθρα, ἢ πόνοι ἐκ πυρετῶν μακρῶν γίνονται, ἔτοι σιτίοισι πλείοσι χρέονται.

Aph. VII. 64.

με'. Ἦν ριγῶ ἐπιπίπῃ πυρετῶ μὴ (a) διαλείποντι, ἤδη ἀσθενεὶ ἔοντι, θανάσιμον.

Coac. I. 15.

μζ'. Αἱ ἀποχρέμψεις αἱ ἐν τοῖσι πυρετοῖσι μὴ διαλείπουσιν αἱ πελιδαί, 1) καὶ αἱ ματώδεις, καὶ δυσώδεις, καὶ χολώδεις, πᾶσαι κακαί. ἀποχωρῆσαι ἢ καλῶς, ἀγαθαί. 2) καὶ κατὰ τὰς διαχωρήσεις, καὶ κατὰ τὰ
ἔξα.

termittentes tertiâ die vehementiores fiunt magis periculosæ : quocunque autem modo intermittant, b) quod sine periculo *sint* significat.

(a) Celf. II. 4. p. 51. l. 33.

(b) Celf. II. 3. p. 49. l. 34. III. 12. p. 141. l. 6.

44. Quibus febres longæ, (a) his tubercula ad articulos, aut dolores fiunt.

II. Prædict. X. 7.

Coac. I. 168. 169.

(a) Celf. II. 7. p. 64. l. 2.

45. Quibus tubercula ad articulos, aut dolores ex febribus longis fiunt, hi pluribus utuntur cibis.

46. Si rigor incidat febri non intermittenti, (a) debili jam existenti *agro*, lethale.

(a) Celf. II. 6. p. 55. l. 19.

47. Excreationes in febribus non intermittentibus lividæ, 1) & cruentæ, & graveolentes, & biliosæ, omnes malæ sunt. At probè fecedentes, bonæ. 2) Et *eadem ratio est* quod ad *alvi* egestionem, & quod ad urinas. 3) Si verò ni-

ἔξα. 3) ἢν δὲ μή τι τῶν συμφερόντων ἐκκρί-
νεται διὰ τῶν τόπων τῶν, κακόν.

Aph. VII. 69.

1) Coac. III. 241.

Coac. II. 161.

2) Prænot. XV. 10.

μή. Ἐν τοῖσι μὴ σλικλείπῃσι πυρετοῖ-
σιν, 1) ἢν τὰ μὲν ἔξω (a) ψυχρὰ ἦ, τὰ
ἐνδον καίηται, καὶ δίψην ἔχῃ, θανάσι-
μον.

Aph. VII. 72.

Coac. I. 165.

Prænot. VIII. 11.

III. 345.

XIV. 12. 13. I. Morb. XXVII. 15.

XV. 6. ad 10. Affection. XI. 5.

μδ'. Ἐν μὴ διαλείποντι πυρετῷ, ἢν χεῖ-
λ (a) ἢ ὀφρὺς, ἢ ὀφθαλμός, ἢ ῥίς δια-
σραφῇ, ἢν μὴ βλέπῃ, ἢν μὴ ἀκὴ, ἢδη
ἀσθενέ (a) ἐόντ (a) τῷ σώματι, ὅ, τι ἂν τῶ-
ν γένηται, ἐργὺς ὁ θάνατος.

Aph. VII. 73.

Prænot. III. 3.

ν'. Ὅκῃ ἂν ἐν πυρετῷ μὴ διαλείποντι
(a) δύσπνοια γένηται, καὶ παραφροσύνη,
θανάσιμον.

Judication. VIII. 17.

να'. Ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν ἀποσήμετα,
(a) μὴ

hil ex conducentibus excernatur per hæc loca, malum.

3) Aph. I. 25.

48. In non intermittentibus febribus, 1) si externa quidem frigida sint, (a) interna verò urantur, & sitim habeant, lethale.

1) Aph. VII. 1. 26. (a) Celf. II. 4. p. 51.
 II. Morb. XVI. 12. l. 25. II. 6. p. 55.
 XXXVII. 1. ad 5. l. 21. II. 14. p. 90.
 l. 22.

49. In febre non intermittente, (a) si labium, aut supercilium, aut oculus, aut nasus pervertatur, si non videat, si non audiat, corpore jam debili existente, quicquid horum fiat, in propinquo mors est.

Coac. I. 104.
 (a) Celf. II. 6. p. 54. l. 24.

50. Ubi in febre non intermittente (a) difficultas spirandi, & delirium fit, lethale.

Prænot. IV. 20.
 XIV. 9.
 XV. 3.

51. In febribus abscessus, (a) qui non
 G 3 fol-

(α) μὴ λυόμενα πρὸς τὰς πρῶτας κρίσεις ,
 μῆκ^ς νῆσ^ς σημαίνει.

(α) Cels. II. 5. p. 53. l. 22.

νβ'. Οκόσοι ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν , ἢ ἐν τῇσιν
 ἀλλησιν ἀρρώσῃσι , κατὰ προαίρεσιν δακρύσ-
 σιν , (α) ἔδεν ἀτοπον. 1) οκόσοι δὲ μὴ κα-
 τὰ προαίρεσιν , ἀτοπώτερον.

Aph. VIII. 2.

Prænot. II. 18. ad 21.

IV. Epid. XXVII. 12.

VI. Epid. I. 42.

νγ'. Οκόσοι δὲ ἐπὶ τῶν ὀδόντων (α) ἐν
 τοῖσι πυρετοῖσι περίγλιχρα γίνεται , ἰχυ-
 ρότεροι γίνονται οἱ πυρετοί.

Coac. II. 153.

IV. Epid. XXVII. 13.

νδ'. Οκόσοιτιν ἐπὶ πολὺ βῆχες (α) ξηραί,
 βραχεία ἐρεθίζεσαι , ἐν πυρετοῖσι καυσώδε-
 σιν , ἔ πάνυτοι διψώδεις εἰσίν.

VI. Epid. II. 43.

νε'. Οἱ ἐπὶ βεβῶσι πυρετοί , πάντες κακοί,
 πλὴν τῶν (α) ἐφημέρων.

II. Epid. III. 60.

νς'. 1) Πυρέσσοντι ἰδρῶς ἐπιγενόμεν^ς ,
 μὴ (α) ἐκλείπῃ^ς τῷ πυρετῷ , κακόν. μη-
 κύνει γὰρ ἡ νῆσος , 2) καὶ ἐγγρασίην πλείω
 σημαίνει.

Judication. VIII. 6. II. Morb. XXXVI. 12.

Coac. IV. 36.

1) I. Prædict. VII. 8.

νζ'. Ὑπό

solvuntur ad primas judicationes, morbi longitudinem significant.

§ 2. Quicumque in febribus, aut in aliis infirmitatibus, ex proposito (i. e. *ob causam*) lachrymantur, nihil inconveniens. (a) 1) Qui verò non ex proposito, magis inconveniens.

1) I. Epid. II. 176.

VI. Epid. VIII. 34.

(a) Cels. II. 4. p. 51. l. 15.

§ 3. Quibus in febre ad dentes viscosa (a) circumnascuntur, *his* febres fiunt vehementiores.

(a) Cels. II. 4. p. 51. l. 15.

§ 4. Quibus diu tussés siccae, paulum irritantes, in febribus ardentibus, non admodum siticulosi sunt.

(a) Cels. III. 7. p. 135. l. 32.

§ 5. In bubonibus febres, omnes malæ, præter (a) ephemeræ.

(a) Cels. II. 3. pag. 49 l. 34.

§ 6. 1) Febricitanti sudor superveniens, febre (a) non remittente, malum. Prolongatur enim morbus, 2) & copiosiore humiditatem indicat.

2) Aph. VII. 61.

(a) Cels. II. 5. p. 53. l. 19.

νζ'. Υπὸ σπασμῶ , ἢ τετάνις (α) ἐνοχλῶ-
μένη , πυρετὸς ἐπιγενόμεν^Θ λύει τὸ νῆ-
σημα.

Aph. II. 26.

V. 5. 70.

Loc. in Hom. XLVIII. 6.

Judication. XII. 10.

νή. Υπὸ καίσις (α) ἐχομένη , ἐπιγενομένης
ρίγι^Θ , λύσις (γίνεται.)

Judication. XI. 9. 16.

Coac. I. 188.

νθ'. 1) Τριταῖ^Θ ἀκριβοῦς κρίνεται ἐν ἑπτὰ
περίοδοις τὸ μακρότατον.

Judication. IV. 10. I. Epid. III. 26.

Coac. I. 212.

II. Epid. III. 82.

ξ'. 1) Ὅσοοισιν ἂν ἐν τοῖσι πυρετοῖσι τὰ
ῶτα (α) κωφωθῇ , αἷμα ἐκ ῥινῶν ρυέν , ἢ
κοιλίῃ ἐκταραχθεῖσα , λύει τὸ νῆσημα.

Aph. IV. 28.

Judicat. XI. 11. 12. 13.

Coac. II. 66. 99. 100.

ξά. Πυρέσσοντι , ἢν μὴ ἐν περισσῇσιν ἡμέ-
ρησιν (α) ἀφῇ ὁ πυρετὸς , ὑποτροπιάζειν
εἰώθειν.

Humor. III. 91.

I. Epid. III. 40.

Judication. IX. 11.

II. Epid. V. 30.

Prænot XXIV. 8.

VI. 18.

Coac. I. 115. 210.

ξβ'. Ὅσο-

57. A convulsione aut tetano (i.e. rigore) (a) detento, febris superveniens solvit morbum.

Coac. I. 231.

III. 80. 84.

San. Tuend. ad Dem. 10.

I. Morb. VI. 13. 14.

(a) Celf. II. 1. p. 45. l. 1. 2. 3. II. 8. p. 70. l. 6.

58. A febre ardente detento, (a) rigore superveniente, solutio (fit.)

(a) Celf. II. 8. p. 70. l. 16.

59. 1) Tertianæ exquisita in septem ad summum circuitibus judicatur.

1) Prænot. XXV. 11.

60. 1) Quibus in febre aures obsuerint, (a) *his* sanguis è naribus effluens, aut alvus exturbata, morbum solvit.

Coac. II. 103.

VI. 77. 78.

1) Coac. II. 7.

(a) Celf. II. 8. p. 70. l. 18.

61. Febricitanti, nisi in diebus imparibus dimiserit febris, reverti solet.

IV. Morb. XIX. 10. 11.

XX. 8. 12. 15. 16.

(a) Celf. III. 4. p. 121. l. 23.

62. Qui-

ξβ'. Οκόσοισιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν ἵκτεροι
(a) ἐπιγίγνονται πρὸ τῶν ἑπτὰ ἡμερῶν, κα-
κόν. (ἢν μὴ ξυνδός.εσ ὑγρῶν κατὰ τὴν κοι-
λίην γένωνται.)

Judicat. III. 5. 18. 20.

Coac. I. 172.

I. Morb. VI. 2.

ξγ'. Οκόσοισιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσι καθ' ἡ-
μέρην ῥίγعا γίνεσθαι, καθ' ἡμέρην οἱ πυρετοὶ
λυονται.

Judicat. XI. 16.

ξδ'. Οκόσοισιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσι τῇ (a)
ἑβδόμῃ, ἢ τῇ ἐννάτῃ, ἢ τῇ ἐνδεκάτῃ, ἢ
τεσσαρεσκαίδεκάτῃ ἵκτεροι ἐπιγίγνονται, ἀγα-
θόν. I) ἢν μὴ τὸ δεξιὸν ὑποχόνδριον σκλη-
ρὸν ᾗ ἢ ἢν δὲ μὴ, ἐκ ἀγαθόν.

Judicat. III. 5. 18. 20. Coac. I. 173.

IV. 11.

I. Epid. II. 120.

ξε'. Ἐν τοῖσι πυρετοῖσι περὶ τὴν κοιλίην
καῦμα ἰσχυρόν, καὶ καρδιαγμοὺς, κακόν.

ξς'. Ἐν τοῖσι πυρετοῖσι τοῖσιν ὀξείσιν,
I) (a) οἱ σπασμοὶ, καὶ οἱ περὶ τὰ σπλάγχνα
πόνοι ἰσχυροὶ, κακόν.

Coac. II. 207.

1) Vid. Aph. II. 26.

ξζ'. Ἐν

62. Quibus in febre morbus regius (a) supervenit ante septimum diem , malum est. (Nisi confluxus humorum per alvum fiant.)

Viët. Acut. LIV. 3. 4.

(a) Celf.II.4. p.52. l.7. III.24. p.175.l.9.
Hippocrat. III.Epidem. Sect. I. Ægr. II.
13. 16.

63. Quibus in febribus quotidie rigores fiunt , quotidie febres solvuntur.

64. Quibus in febre septimâ aut nonâ (a) aut undecimâ , aut quarta decimâ morbus regius supervenit , bonum est : 1) nisi dextrum hypochondrium durum sit : alioqui , non bonum.

I. Morb. VI. 2. (a) Celf.III.24.p.175.
1) Aph. VI. 42. l. 7.

65. In febribus circa ventrem æstus vehemens , & oris ventriculi dolor , malum.

66. In febribus acutis , 1) (a) convulsiones , & circa viscera dolores vehementes , malum.

(a) Celf. II. 4. p. 52. l. 11.

67. In

ξζ'. Ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν οἱ ἐκ τῶν ὕπνων
(a) φόβοι, ἢ σπασμοὶ, κακόν.

Aph. II. 1.

ξη'. Ἐν τοῖσι πυρετοῖσι τὸ πνεῦμα
προσκόπτον, κακόν· (a) σπασμὸν γὰρ ση-
μαίνει.

Vi&. Acut. XXI. 21.

I. Morb. Mul. V. 7.

ξθ'. Οἷοίσιν ἔρα παχέα, θρομβώδεα,
ὀλίγα, ἐκ ἀπυρέτοις, πλῆθος ἐπελθὼν ἐκ
τρετέων λεπτὸν, ἀφελέει. μάλιστα δὲ τὰ
τοιαῦτα ἔρχεται, οἷσιν ἐξ ἀρχῆς, ἢ οὐδὲν
ταχέων, ὑπόσασιν ἴχει.

Coac. V. 80. 81.

ο. Οἷοίσιν ἢ ἐν πυρετοῖσι τὰ ἔρα ἀνα-
τεταραγμένα, οἷον ὑποζυγίων, τρετέοις κε-
φαλαλγίαι ἢ πάρεσιν, ἢ παρέσονίαι.

Coac. V. 46.

οα'. Οἷοίσιν ἐξδομαῖα κρίνεται, τρετέοι-
σιν ἐπινέφελον ἴχει τὸ ἔρον τῇ τετάρτῃ ἐρυ-
θρὸν, 1) καὶ τὰλλα κατὰ λόγον.

Judicat. VI. 2.

IX. 8.

εβ'. Οἷοίσιν ἔρα διαφανέα, (a) λευ-
κά,

67. In febribus, ex somnis (a) pavores, aut convulsiones, malum.

(a) Celf. II. 4. p. 52. l. 12.

68. In febribus spiritus offendens, malum. (a) Convulsionem enim significat.

(a) Celf. II. 7. pag. 64. l. 4.

69. Quibus urinæ crassæ, grumosæ, paucæ, non sine febre, copia ex his succedens tenuis, juvat. Tales autem maximè prodeunt, quibus ab initio, aut brevi, subsidentiam continent.

70. Quibus autem in febre urinæ conturbatæ, qualis jumentorum, his capitis dolores aut adsunt, aut aderunt.

VII. Epid. LIV. 5. 6. 10. 11.

71. Quibus *morbi* septimâ die judicantur, iis nubeculam rubram urina die quartâ continet, 1) & alia secundum rationem.

Coac. I. 213.

V. 5. 82.

1) Aph. I. 12.

72. Quibus urinæ pellucidæ (a) albæ,
H
ma.

καὶ , πονηρά. μάλισα ᾗ ἐν τοῖσιν φρενιτικοῖ-
σιν ἐπιφαίνεται.

I. Præd. I. 5.

II. 6.

ογ'. 1) Οἷοισιν ὑποχόνδρια μετέωρα
(a) διαδοξοερίζοντα, ὅσφύῳ ἀλγύματι
ἐπιγενομένῃ, αἱ κοιλίαι τετέοισι καθυγραί-
νονται· ἢν μὴ φύσαι καταρράγέωσιν, ἢ
ἔρῃ πλῆθῳ ἐπέλθῃ, ἐν πυρετοῖσι ᾗ ταῦτα.

Coac. II. 240. 241. Prænot. X. 14.

257.

1) Aph. V. 64.

οδ'. 1) Οἷοισιν ἐλπίς ἐς ἄεθρα ἀφίστα-
σθαι, ῥύεται τῆς ἀποσάσιῳ ἔρῃ πολὺ, καὶ
(a) παχὺ, καὶ λευκὸν γιγνόμενον, οἷον ἐν τοῖ-
σι κοπῶδεσι πυρετοῖσι τεταρταίοισιν ἀρχε-
ται ἐνίοισι γίγνεσθαι. ἢν ᾗ καὶ ἐκ τῶν ρινῶν
αἰμορράγῃ, καὶ πάνυ ταχὺ λύεται.

Humor. XI. 13. ad 16.

Judicat. X. 4. ad 7.

VI. Epid. IV. 3. ad 6.

οε'. ἢν (a) αἷμα, 1) ἢ (b) πῦον ἔρῃ,
τῶν νεφρῶν, ἢ τῆς κύστιῳ ἑλκῶσιν σημαίνει.

Aph. IV. 78. 81.

Int. Affect. XVI. 4. 5.

1) Nat. Human. XXVI. 4.

ος'. Οἷο-

malæ. Maximè autem in phreniticis
bservantur.

Coac. V. 25. 26.

(a) Celf. II. 4. p. 52. l. 25.

73. 1) Quibus hypochondria elevata
(a) *sunt* murmurantia, dolore lumbo-
rum superveniente, his alvi humectan-
tur: nisi flatus eruperint, aut urinæ co-
pia prodierit. In febribus autem hæc.

Sal. Diæt. V. 10.

(a) Celf. II. 3. p. 50. l. 20.

74 1) Quibus spes est abscessum fo-
re ad articulos, eos abscessu liberat uri-
na multa, & crassa, & (a) alba reddita,
qualis in febribus, cum lassitudine,
quartâ die quibusdam fieri incipit. Si
verò etiam ex naribus sanguis erupe-
rit, brevi admodum solvit.

1) Prænot. XI. 17.

II. Prædict. X. 7.

(a) Celf. II. 7. p. 60. l. 21.

75. Si (a) *quis* sanguinem, 1) aut
(b) pus mingat, renum, aut vesicæ ex-
ulcerationem significat.

Prænot. XIX. 11.

(a) Celf. II. 7. p. 60. l. 28.

(b) Genit. II. 8.

ο5'. Οκόσοισιν ἐν τῷ ἔρῳ παχεῖ ἔοντι ,
 1) σαρκία (a) μικρὰ ἢ ἄσπερ τριχες ξυν-
 εξέρχονται , τστέοισιν ἀπὸ τῶν νεφρῶν ἐκ-
 κρινεται.

Nat. Human. XXVI. 5.

1) Aph. IV. 26.

ε2'. Οκόσοισιν ἐν τῷ ἔρῳ παχεῖ ἔοντι ,
 πιτυρώδεα ξυνεξέρεσται , τστέοισιν ἡ κύσις
 ψωριαῖ.

Nat. Human. XXXI. 6.

οῦ. 1) Οκόσοι ἀπὸ ταυτομάτῃς αἵμα
 (a) ἐρέσσι , τστέοισιν ἀπὸ τῶν νεφρῶν φλε-
 βίς ῥῆξιν σημαίνει.

Aph. IV. 75.

Nat. Human. XXVI. 4.

ο9'. 1) Οκόσοισιν ἐν τῷ ἔρῳ ψαμμώ-
 δεα (a) ὑφίσταται , τστέοισιν ἡ κύσις λι-
 θιαῖ.

IV. Morb. XXIX. 13. ad XXX.

Int. Affect. XV. 10. 11.

π'. Ἦν αἷμα ἡρέη , καὶ θρόμβος , καὶ
 (a) σφαγγερίην ἔχη , καὶ ὀδύνη ἐμπίπτῃ ἐς
 τὸ ὑπογάστριον , καὶ ἐς τὸ περιναϊον , τὰ περὶ
 τὴν κύσιν πονέει.

Aph. VII. 39.

πά. Ἦν

76. Quibus in urinâ crassâ existente, 1) carunculæ (a) parvæ, aut veluti pili unâ exeunt, his de renibus excernuntur.

Cap. Vuln. II. 4.

(a) Celf. II. 7. p. 60. l. 30.

77. Quibus in urinâ crassâ existente, furfuracea simul minguntur, iis vesica scabie laborat.

Prænot. XI. 8. 10.

78. 1) Qui spontè sanguinem mingunt, (a) his à renibus venæ ruptionem significat.

1) Int. Affect. XVI. 4.

(a) Celf. II. 7. p. 60. l. 27. 33. p. 61. l. 7.

79. 1) Quibus in urinâ, arenosa (a) subsident, illis vesica calculo laborat.

1) Nat. Human. XXVI. 1.

(a) Celf. II. 7. p. 61. l. 16.

80. Si *quis* sanguinem mingat, & grumos, & (a) urinæ stillicidium habeat, & dolor incidat ad imum ventrem, & interfemineum, partes circa vesicam laborant.

(a) Celf. II. 7. p. 61. l. 15.

πα'. Ἦν αἷμα, καὶ πῦον ἐρέη, καὶ λεπίδας, καὶ ὄσμῃ (a) βαρεῖν ἢ, τῆς κύσις ἐλκωσιν σημαίνει.

Aph. IV. 75.

πβ'. Οἰκίσουσιν ἐν τῇ ἐρήθρῃ φῦμα (a) φύεται, τρεῖσι, διαπύσαις καὶ ἐκτραγέντος, λύσις.

Aph. VII. 57.

Coac. III. 311. 312.

πγ'. Οὐρησις νύκτωρ πολλὴ γιγνομένη, σμικρὴν τὴν ὑποχώρησιν σημαίνει.

II. Diæt. XL. 10. ad 17.

Τμήμα πέμπτον.

A'.

Σπασμός ἐξ (a) ἐκιδόρας, θανάσιμον.

Aph. VII. 25.

Coac. IV. 24.

β'. Ἐπὶ τρώματι (a) σπασμός ἐπιγενόμενός, θανάσιμον.

Coac. III. 81. 382.

Cap. Vulner. XXV. 5.

& XXVI. 3. 4.

γ'. Αἷματός πολλαῖς ῥυτίδibus, (a) σπασμός, ἢ λυγρὸς ἐπιγενόμενός, κακόν.

Aph. VII. 9.

Coac. III. 57.

δ'. Ἐπὶ

S E C T I O IV. 91

81. Si *quis* sanguinem, & pus mingat, & squamas, & odor gravis sit, (a) vesicæ exulcerationem significat.

(a) Cels. II. 7. p. 60. l. 31.

82. Quibus in urinariâ fistulâ tuberculum (a) nascitur, his, suppurato eo & perrupto, solutio fit.

(a) Cels. II. 8. p. 70. l. 22.

83. Mictio noctu multa contingens, parvam dejectionem significat.

IV. Morb. VII. 4.

Sectio Quinta.

I.

CONvulsio ex (a) elleboro, lethale.

(a) Cels. II. 6. p. 55. l. 25.

2. Vulneri convulsio (a) superveniens, lethale.

(a) Cels. II. 26. §. 26. p. 296. l. 8.

3. Sanguine multo effuso, (a) convulsio, aut singultus superveniens, malum.

(a) Cels. II. 8. p. 76. l. 12.

H 4

4. Pur-

δ'. Ἐπὶ ὑπερκαθάρσει (α) σπασμὸς, ἢ
λυγμὸς ἐπιγεγόμενός, κακόν.

Aph. VII. 41. Loc. in Hom. XLV. 1.
Nat. Human. IX. 7. Coac. IV. 22. 25.

ε'. 1) Ἦν μεθύων ἐξαίφνης ἄφωνός τις γέ-
νηται, (α) σπασθεὶς ἀποθνήσκει, ἢν μὴ πυ-
ρετός ἐπιλάβῃ, ἢ ἐς τὴν ὥρην ἐλθὼν, καθ'
ἣν αἱ κραιπάλαι λύονται, φθελγέται.

II. Morb. IV. 16.
XXII. 2. 3. 4.

ς'. Οἰότοί ὑπὸ (α) τετάνκ αλίσκονται,
ἐν τέσσαρσιν ἡμέρησιν ἀπόλλυνται. ἢν δὲ
ταύτας διαφύγωσιν, ὑγιέες γίνονται.

Judicat. VIII. 19.
III. Morb. XIII. 11.

ζ'. 1) Τὰ ἐπιληπτικά (α) ὁκόσοισι πρὸ
τῆς ἥβης γίνεσθαι, μετέσασιν ἴχει. 2) ὁκό-
σοισι ᾧ πέντε καὶ εἰκοσιν ἔτεων γίνεσθαι, τε-
τέοισι τὰ πολλὰ ξυναποθνήσκει.

VI. Epid. VIII. 96.
1) Aph. II. 45.
2) Aph. II. 39.
II. Præd. XVI. 15. 16.

ή'. Οἰόσοι πλευριτικοὶ γενόμενοι ἐκ
ἀνακαθαίρονται ἐν τεσσαρεσκαίδεκα ἡ-
μέ-

4. Purgationi immodicæ (a) convulsio, aut singultus superveniens, malum.

Verat. uf. I. 8.

(a) Celf. II. 8. p. 76. l. 14.

5. 1) Si quis ebrius ex improvise mutus fiat, (a) convulsus moritur, nisi febris corripuerit, aut ubi ad horam, quâ crapulæ solvuntur, pervenit, locutus fuerit.

(a) Celf. II. 6. p. 55. l. 27.

6. Qui à tetano (i. e. *rigore*) (a) corripiuntur, in quatuor diebus pereunt. Si verò hos effugerint, sani fiunt.

(a) Celf. II. 1. p. 45. l. 3. IV. 3. p. 193. l. 30.

7. 1) Quibus epilepsiæ (a) ante pubertatem contingunt, mutationem habent. Quibus verò accidunt viginti quinque annos *natis*, his plerumque commoriuntur.

II. Prædict. XVI. 2. 3.

Morb. Sac. XIII. 1. 5.

(a) Celf. II. 8. p. 73. l. 13. III. 23. p. 172.

l. 17. II. 2. p. 47. l. 2. II. 8. p. 68. l. 26.

8. Qui pleuritici facti, non repurgantur supernè in quatuordecim die-

μέρησι, τετέοισιν ἐς ἐμπύημα μεδίσαται.

Aph. V. 15.

Loc. in Hom. XXVII. 4.

Coac. III. 131. 132. 171.

VII. Epid. XLVII. 16.

I. Morb. III. 29.

X. 12.

XI. 6. ad 11.

δ'. Φθίσις γίνεσθαι μάλιστα ἡλικίῃσι τῇσιν ἀπὸ ὀκτωκαίδεκα (α) ἐτέων μέχρι πέντε καὶ τριήκοντα.

Aph. III. 29.

VIII. 7.

ι'. Οὐόσοισι κυνάγχην διαφεύγῃσιν, ἐς τὸν πλεύμονα τρέπεται, ἐν ἑπτὰ ἡμέρησιν ἀποθνήσκουσιν. ἢν δὲ ταύτας διαφεύγῃσιν, ἔμπ. οἱ γίνονται.

Prænot. XXIII. 15.

Coac. III. 100. 101. 105. 106.

ια'. Τοῖσιν ὑπὸ τῆς φθισίῳ ἐνοχλαμένοι-
εἰν, ἢν τὸ πτύσμα, ὅπερ ἂν ἀποδέσσωσι,
βαρὺ (α) ὄζῃ ἐπὶ τῆς ἀνδρακας ἐπιχεόμε-
νον, καὶ αἱ τρίχες ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ῥέωσι
θανατῶδες.

Coac. III. 213. 252.

II. Morb. XLVI. 16. ad 20.

LV. 20. ad 23.

ιβ'. Οὐόσοισιν ἂν φθισιῶσιν αἱ τρίχες
(α) ἀπὸ

diebus , his in suppurationem convertitur.

. . . . XXIII. 15. 16.

XXIV. 10.

III. Morb. XVI. 30.

Affectio. VIII. 19. 20.

IX. 13.

Int. Affect. I. 26.

Vict. Acut. VII. 1. 2.

9. Tabes maximè fit ætatibus , ab anno octavo decimo (a) usque ad quintum trigessimum.

Coac. III. 260.

(a) Cels. III. 22. p. 169. l. 24.

10. Quibus anginam effugientibus (a) ad pulmonem vertitur , in septem diebus moriuntur. Si verò hos effugerint , suppurati fiunt.

II. Morb. XXVII. 15. ad 19.

(a) Cels. II. 6. p. 64. l. 6.

11. A tabe vexatis si sputum , quod extussiunt , prunis superfusum graviter oleat , (a) & capilli de capite defluant , lethale.

Affectio. VIII. 19.

(a) Cels. II. 8. p. 72. l. 1. III. 22. p. 168. l. 4.

12. Quibus tabe laborantibus capilli
(a) de

- (a) ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ῥέωσιν, ἔτοι, διαῤῥοίης
(b) ἐπιγενομένη, ἀποθνήσκουσιν.

Aph. V. 14.

VII. 78.

Coac. III. 244. 255.

I. Morb. X. 36.

ιγ'. Οἵοιτο αἷμα ἀφρῶδες ἀνατρίβει,
τετέοισιν ἐκ τῆς πλευρόν (a) ἡ τοιαύτη
ἀναγωγὴ γίγνεται.

Coac. III. 216. 250. 251. 273.

II. Morb. LI. 4.

ιδ'. Ὑπὸ φθίσει ἐχομένῳ διάρροια (a) ἐπι-
γενομένη, θανατῶδες.

Aph. V. 12.

I. Morb. VI. 5.

VI. 17.

X. 36. 39.

VII. 78.

XI. 41.

Coac. III. 244. 256.

XIV. 10.

ιε'. Οἵοιτο ἐκ πλευρίτιδος ἔμπτυοι γί-
γνονται, ἢν ἀνακαταστῶσιν ἐν (a) τεσσα-
ράκοντα ἡμέρησιν, ἀφ' ἧς αὖ ἡ ῥῆξις γέ-
νηται, παύονται· ἢν δὲ μὴ, ἐς φθίσειν με-
θίστανται.

Aph. V. 12.

VI. 16.

Loc. in Hom. XXV. 10.

Coac. III. 141. 171. 209. 215.

ις'. Τὸ θερμὸν βλάπτει ταῦτα τοῖσι πλεο-
νάκις χρεομενοῖσι I) (a) σαρκῶν ἐκθήλυν-
σιν, νεύρων ἀκράτειαν, γνώμης νάρκωσιν,
b) αἰ-

de capite defluunt, hi, alvi fluxu super-
veniente, moriuntur.

II. Morb. XLVI. 12.

(a) Celf. II. 8. p. 71. l. 33.

(b) Celf. II. 8. p. 72. l. 3.

13. Qui sanguinem spumofum ex-
spuunt, (a) his ex pulmone talis re-
jectio fit.

(a) Celf. II. 7. p. 61. l. 21. Al. Trall. VII. 1.

Aretæus de sign. Morb. Acut. l. 2. c. 2.

14. A tabe detento alvi profluvium
(a) superveniens, lethale.

(a) Celf. II. 8. p. 72. l. 2. III. 32. h. 171. l. 30.

Aretæus de Morb. Diuturn. l. 1. 8. in fine.

15. Qui ex pleuritide fuppurati
fiunt, fi intra quadraginta dies, (a) ex
quo ruptio fuerit facta, repurgentur
superne, liberantur: fi verò minus, ad
tabem tranfeunt.

VII. Epid. XLVII. 16. 17.

I. Morb. X. 15. 17. 20.

II. Morb. LV. 23.

III. Morb. XVI. 35.

(a) Celf. II. 7. p. 62. l. 15. II. 8. p. 66. l. 34.

16. Calidum, eo frequenter utenti-
bus, has affert noxas: 1) (a) carnis ef-
foeminationem, nervorum impoten-
tiam,

(b) αίμορραγίας, 2) λειποθυμίας ταῦτα, οἷσι θάνατος.

Humid. uf. III. 2. 3.

1) Offic. Medic. VIII. 14.

Articul. LVII. 3.

2) Aph. I. 23.

ιζ'. Τὸ ἢ (a) ψυχρὸν, σπατμὸς, τετάνυσ, μελασμὸς, καὶ ῥίγηα πυρετώδεα.

Aph. V. 20.

Humid. uf. III. 4.

IV. 5.

ιη'. Τὸ ψυχρὸν (a) πολέμιον ὀσέοισιν, ὀδῶσιν, νέρουσιν, ἐγκεφάλῳ, νωτιαίῳ μυελῶ, τὸ ἢ θερμὸν, ὠφέλιμον.

Humid. uf. IV. 1. 4.

ιδ'. Ὄκῶσα κατέψυκται, ἐκθερμαίνεσθαι δεῖ, 1) πλὴν ὀκῶσα αίμορραγέει, καὶ μέλλει.

Aph. II. 22.

V. 23.

κ'. Ἐλκεσι τὸ μὲν ψυχρὸν δακνῶδες, (a) θερμὸν περισκληρύνει, ὀδύνην ἀνεκπύητον ποιεῖ, μελασμὸς, ῥίγηα πυρετώδεα, σπατμὸς, καὶ τετάνυσ.

Aph. V. 17.

Humid. uf. III. 4.

IV. 5.

XI. 15.

κα'. Ἐστὶ

tiam , mentis torporem , (b) sanguinis eruptiones , 2) animi deliquia : hæc, quibus mors.

(a) Celf. I. 9. p. 40. l. 6. I. 3. p. 28. l. 22.

(b) Celf. II. 1. p. 44. l. 33. Vitruvius de Architect. I. 4.

Aretæus de curat. Morb. Acut. II. 2.

17. Frigidum (a) autem, convulsiones, tetanos i. e. *rigores*, nigrores, & rigores febriles.

Fractur. XXXVII. 6. (a) Celf. II. 1. p. 45. l. 1. Articul. LXXIV. 10.

18. Frigidum (a) inimicum ossibus, dentibus, nervis, cerebro, spinali medullæ : calidum verò, utile.

(a) Celf. I. 9. p. 39. l. 20.

19. Quæ perfrigerata sunt, excalefacere oportet, 1) præterquàm quæ sanguinem profundunt, aut sunt profusura.

Humid. uf. I. 21.

1) Humid. uf. XI. 28.

20. Ulceribus frigidum quidem mordax, (a) cutem obdurat, dolorem non suppurantem facit, nigrores, rigores febriles, convulsiones, & tetanos. i. e. *rigores*.

Fractur. XXXVII. 6.

Articul. LXXIV. 10.

(a) Celf. I. 9. p. 39. l. 24.

κα. Ἔστι ᾧ, ὅκῃ ἐπὶ τετάνυ 1) ἀνευ ἔλ-
κε[Ⓢ] (α) νέω εὐσάρκω, θέρε[Ⓢ] μέσθ,
2) ψυχρῷ πολλῷ κατάχυτις ἐπανάκλητιν
θήρμης ποιέεται. θέρμη ᾧ ταῦτα ῥύεται.

Humid. uf. XI. 16.

1) Aph. V. 25.

κβ. 1) Τὸ θερμὸν ἐκπυητικόν, ἔκ ἐπὶ
παντὶ ἔλκει, μέγιστον σημεῖον ἐς ἀσφα-
λείην. 2) Θέρμα μαλάσσει, ἱχθυίνει, ἀνώ-
δυνον, ῥιγέων, 3) σπασμῶν, τετάνων παρ-
ηγηρικόν. τὴν ᾧ ἐν τῇ κεφαλῇ κασιβαρίην
λύει. πλεῖστον ᾧ διαφέρει ὁσέων κατάγμα-
σι. τστέων ᾧ μάλιστα, τοῖσιν ἐν κεφαλῇ
ἔλκεα ἔχουσι. καὶ ὅκόσα ὑπὸ ψύξ[Ⓢ] θνή-
σκει, ἢ ἐλκεῖται. καὶ ἔρωητιν ἐσθιομένοισιν,
ἔδρη, 5) αἰδοίω, ὑσέρη, κύσει, τστέοισι
τὸ μὲν θερμὸν φίλον καὶ κρεῖνον. τὸ ᾧ ψυ-
χρὸν πολέμιον καὶ κλεῖνον.

Humid. uf. XI. 18. ad 28.

1) Humid. uf. XI. 10.

Ulcer. V. 1.

2) Humid. uf. I. 10.

3) Humid. uf. I. 19.

κγ. 1) Ἐν τστέοισι ᾧ δεῖ τῷ ψυχρῷ
χρέεσθαι, ὁκόθεν αἱμορραγέει, ἢ μέλλει, μὴ
ἐπ' αὐτὰ, ἀλλὰ περὶ αὐτὰ, ὁκόθεν ἐπιρρεῖ
καὶ ὁκόσαι φλεγμοναὶ, ἢ ἐπιφλεγίσματα ἐς

21. Est verò, ubi in tetano i. e. *rigore* 1) sine ulcere, (a) juveni benè carnosò, æstare mediâ, 2) frigidæ multæ affusio, caloris revocationem facit. Calor autem hæc solvit.

2) III. Morb. XIV. 17. ad XV.

(a) Cels. I. 9. p. 39. l. 26.

22. 1) Calidum suppuratorium, non in omni ulcere, maximum signum ad securitatem: 2) cutem emollit, attenuat, dolores sedat, rigores, 3) convulsiones, tetanos i. e. *rigores* mitigat: capitis verò gravitatem solvit: plurimum autem confert ossium fracturis: 4) maximè verò denudatis: ex his quidem maximè, qui in capite ulcera habent: & quæ à frigore moriuntur. aut ulcerantur: & herpetibus exedentibus fedi, 5) pudendo, utero, vesicæ. His calidum quidem amicum & decretorium: frigidum verò inimicum & occidens.

I. Morb. VI. 14.

4) Humid. uf. V. 13.

5) Humid. uf. VI. 2. 3.

23. 1) In his autem frigido uti oportet, unde sanguis erumpit, aut erupturus est: non saper ipsa, sed circa hæc, unde influit. Et quæcunque inflamma-

1 3

tiones,

τὸ ἐρυθρὸν (α) καὶ ὕφαιμοι ῥέπονται νεαρῷ αἵματι, ἐπὶ ταῦτα ἐπεὶ τάγε παλαιὰ μελαίνει καὶ ἐρυσίπελας τὸ μὴ ἐλκόμενον (ὠφέλει) ἐπεὶ τόγε ἐλκόμενον βλάπτει.

1) Vid. Aph. V. 19. (α) Celf. I. 9. p. 39. l. 32.

κδ'. Τὰ ψυχρὰ, οἷον χιῶν, κρύσταλλος, 1) τῷ σῆθει πολέμια, 2) βηχέων κινητικὰ αἰμορροϊκά.

1) Humid. uf. IV. 8. V. 16.

κέ. Τὰ ἢ ἐν (α) ἄρθροισιν οἰδήματα καὶ ἀλγήματα ἄτερ ἑλκεος, καὶ ποδαγρικά, 1) καὶ σπάσματα, τῆτέων τὰ πλεῖστα τὸ ψυχρὸν πολλὸν καταχεόμενον ῥήϊζει τε καὶ ἰχναίνει, καὶ ὀδύνην λύει. νάρκη γὰρ μετρίῃ ὀδύνης λυτική.

Humid. uf. X. 14. 15.

1) Aph. V. 21.

κε'. Ὑδωρ τὸ ταχέως θερμαινόμενον, (α) καὶ ταχέως ψυχόμενον, κρυότατον.

Aër. Aq. Loc. XVII. 1.

II. Epid. II. 29.

κζ'. Οἷοίσις ἢ πρὶν ὀρέξεις (α) νύκτωρ, τοῖσι πάνυ διψῶσιν, ἢ ἐπικοιμηθῶσιν, ἀγαθόν.

VI. Epid. IV. 42.

[κή. Γυναι-

tiones, (a) aut flammei ardores ad rubrum & sanguineum colorem vergentes novo sanguine, super ipsos: nam inveteratos nigrefacit: erysipelas etiam non exulceratum (juvat:) quoniam exulceratum lædit.

24. Frigida, velut nix, glacies, 1) pectori (a) inimica, 2) tusses movent, sanguinis eruptiones, *ac* catarrhos inducunt.

2) VI. Epid. III. 22.

(a) Cels. I. 9. p. 39. l. 21.

25. Tumores autem in (a) articulis & dolores absque ulcere, & podagricos, 1) & convulsiones, horum plurima, frigida multa affusa & levat, & attenuat, & dolorem solvit. Torpor enim modicus doloris solvendi vim habet.

(a) Cels. I. 9. p. 39. l. 31.

26. Aqua, quæ citò calefit, (a) & citò refrigeratur, levissima.

(a) Cels. II. 18. p. 100. l. 11.

27. Quibus autem bibendi appetentiæ noctu, iis valde sicientibus, si obdormierint, bonum.

(a) Cels. I. 8. p. 38. l. 22.

κγ'. Γυναικείων ἀγωγὸν ἢ ἐν ἀρώμασι πυρήν· πολλαχῶς ἢ καὶ ἐς ἄλλα χρησιμὴ αὖν ἦν, εἰ μὴ καρφηθαρίας ἐνεποιεῖ.

Natur. Mul. XIX. 161. ad 187.

κδ'. Τὰς κυέσας Φαρμακεύειν, ἣν ὀργᾶ, τετραμήνια, καὶ ἄχρι ἑπτὰ μηνῶν· ἥσσον ἢ ταύτας. τὰ ἢ νήπια, καὶ πρεσβύτερα, (α) εὐλαβεῖσθαι χρή.

Vid. Aph. IV. 1.

λε'. Γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχέσῃ, ἀπὸ τιτῶν τῶν ὀξείων (α) νεσημάτων ληφθῆναι, θαλάσιμον.

Aph. V. 43. 51.

I. Morb. III. 9.

λα'. Γυνὴ ἐν γαστρὶ ἔχουσα φλεβοτομηθεῖσα (α) ἐκτιτρώσκει· καὶ μᾶλλον, εἰ μεῖζον εἴη τὸ ἔμβρυον.

(α) Cels. II. 10. p. 77. l. 20.

λβ'. Γυναικὶ αἷμα (α) ἐμεΐσῃ, τῶν καταμηνίων βλαγόντων, λύσις γίνεται.

I. Morb. VI. 11.

λγ'. Γυναικὶ τῶν καταμηνίων ἐκλειπόντων, αἷμα (α) ἐκ τῶν ῥινῶν ῥυῆναι, ἀγαθόν.

Virgin. Morb. III. 2.

λδ'. Γυναι-

28. Suffitus aromatum muliebria ducit. Sæpius autem ad alia utilis esset, nisi capitis gravitates induceret.

29. Prægnantes purgandæ, si turgat *materia*, quadrimestres, & usque ad septimum mensem: hæ verò minus. Juniores autem, & seniores *fætus*, (a) cautè vitare oportet.

(a) Cels. II. 6. pag. 55. l. 30.

30. Mulierem in utero gerentem ab acuto (a) aliquo morbo corripì, lethale.

(a) Cels. II. 6. p. 55. l. 30. Hippocr. I. Epid. Sect. II. 141. de Natur. Puer. XII. 19.

31. Mulier in utero gerens sectâ venâ (a) abortit: & magis, si major fuerit fœtus.

32. Mulieri sanguinem (a) evomenti, menstruis erumpentibus, solutio fit.

(a) Cels. II. 8. p. 69. l. 28. IV. 4. §. 5. p. 202. l. 31.

33. Mulieri, menstruis deficientibus, è (a) naribus sanguinem fluere, bonum.

(a) Cels. II. 8. p. 69. l. 30. Hipp. Epid. I. Sect. II. 138. 139.

34. Mu-

λδ'. Γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχέσῃ ἢν ἡ κοιλίη
(α) πολλὰ ῥυτί, κίνδυνος ἐκτρώσαι.

II. Prædict. XXX. 14.

Coac. III. 416.

λε'. Γυναικὶ ὑπὸ ὑσερικῶν ἐνοχλασμένη, ἢ
δυσουέσῃ, πταξμὸς (α) ἐπιγεγόμενος, ἀ-
γαθόν.

Aph. V. 49.

Prænot. XIII. 11.

Coac. III. 175.

λς'. Γυναικὶ τὰ καταμήνια ἄχρσα, καὶ μὴ
κατὰ τὰ αὐτὰ αἰεὶ γιγνόμενα, καθαίρει
δεῖσθαι σημαίνει.

Verat. ul. I. 11. 60.

Natur. Mul. X. 3. 13.

λζ'. Γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχέσῃ, ἢν οἱ
μαστοὶ (α) ἐξαιφνης ἱχνοὶ γίνωνται, ἐκτι-
τρώσκει.

Aph. V. 53.

II. Epid. I. 42.

λη'. Γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχέσῃ, ἢν ὁ ἑτε-
ρος μαστὸς ἱχνὸς γένηται δίδυμα ἐχέσῃ,
θάτερον ἐκτιτρώσκει· καὶ, ἢν μὲν ὁ δεξιὸς
ἱχνὸς γένηται, τὸ ἄρσεν· ἢν δὲ ὁ ἀριστερός,
τὸ θῆλυ.

Aph. V. 48.

λθ'. Ἡν

34. Mulieri in utero gerenti si alvus (a) multum fluxerit, periculum ne abortiat.

I. Morb. Mul. XXXVII. 5.

XLI. 3. 6.

(a) Celf. II. 7. p. 61. l. 33.

35. Mulieri ab uterinâ *passione* vexatæ, aut difficulter patienti, (a) ster-
nutatio superveniens, bonum.

Morb. Mul. XCIII. 1. 6. 7.

(a) Celf. II. 8. p. 69. l. 33.

36. Mulieri menses decolores, ne-
que secundum eadem (*tempus & mo-
dum*) semper prodeuntes, purgatione
opus esse significant.

37. Mulieri in utero gerenti, si
mammæ ex improviseo graciles fiant,
abortit.

I. Morb. Mul. XLIV. 1. 2. 3.

(a) Celf. II. 8. p. 76. l. 6.

38. Mulieri in utero gerenti, si alte-
ra mamma gracilis fiat gemellos gestan-
ti, alterutrum abortit. Et, si quidem
dextra gracilis fiat, marem: si verò si-
nistra, foeminam.

39. Si

λθ'. Η'ν γυνή μὴ κύεσσα, μηδὲ τετο-
κυῖα, γάλα (a) ἔχη, ταύτη τὰ καταμήνια
ἐκλέλοιπε.

II. Prædict. XXXV. 5.

μ'. Γυναιξὶν ὀκόσησιν ἐς τὰς τιτθὰς.
αἷμα (b) συσρέφεται, μανίην σημαίνει.

II. Epid. VI. 62.

μα'. Γυναῖκα ἣν θείλῃς εἶδέναι εἰ κύει,
ἐπὶν καθεύδειν μέλλῃ, (ἀδείπνω ἐσση) με-
λίκρατον διδόναι πιεῖν. κἢν μὲν τροφὸν ἔχη
περὶ τὴν γαστέρα, κύει ἣν δὲ μὴ, ἔ κύει.

Aph. V. 61.

Steril. VI. 6. 7. 8. 11.

μβ'. Γυνὴ ἔγκυος, εἰ μὲν ἄρρεν κύει,
εὐχρῆς ἐσὶν ἣν δὲ θῆλυ, δύσχρῆς.

Steril. VII. 1.

μγ'. Η'ν γυναικὶ κυέσῃ ἐρυσίπελας ἐν
τῇ ὑσέρῃ γένηται, θανατῶδες.

Aph. V. 30.

I. Morb. III. 9.

μδ'. Οκόσαι παρὰ φύσιν λεπταὶ ἐῖσαι
ἐν γαστρὶ ἔχουσιν, ἐκτιτρώσκει, πρὶν ἢ
παχυθῆναι.

Natur. Mul. XIX. 1. 3.

II. Morb. Mul. LXII. 20.

μέ. 1) Οκό-

39. Si mulier quæ nec prægnans est, nec peperit, lac habeat, ei menstrua defecerunt.

(a) Celf. II. 8. p. 76. l. 1. 8.

40. Mulieribus quibus in mammas sanguis convertitur, infaniam significat.

(a) Celf. II. 7. p. 63. l. 34.

41. Mulierem si velis cognoscere, an prægnans sit, ubi dormitura est, (incoenatae) aquam mulsam bibendam dato. Et si quidem tormen habeat circa ventrem, prægnans est: si verò minus, prægnans non est.

42. Mulier prægnans, si quidem marem gestat, benè colorata est: si verò foeminam, malè colorata.

43. Si mulieri prægnanti erysipelas in utero fiat, lethale.

Natur. Mul. XII. 17. 27.

II. Morb. Mul. LVIII. 12. 29.

44. Quæ præter naturam tesues existentes in utero gerunt, abortiant, priusquam crassescant.

Steril. XXII. 1. 3.

K

45. 1) Quæ

μέ. 1) Οκόσαι ἡ μετρίως τὸ σῶμα ἔχου-
σαι ἐκτιτρώσκουσι δίμηνα καὶ τρίμηνα ἄτεξ
προφάσι ~~Θ~~ φανερῆς, ταύτησιν αἱ κοτυλη-
δόνες μύξης μεσαί εἰσι, καὶ ἔδύνανται κρα-
τεῖν ὑπὸ τῆς βάρους τὸ ἔμβρυον, ἀλλ' ἀπορ-
ρήγνυνται.

Natur. Mul. XXVII. 1. ad 5.

I. Morb. Mul. LXXXIV. 1. 2. 3.

με'. 1) Οκόσαι παρὰ φύσιν παχεῖαι
(a) ἐδοῦαι μὴ ξυλλαμβάνουσιν τῇ ἐν γαστρὶ,
ταύτησι τὸ ἐπιπλοον τὸ σῶμα τῶν ὑστερῶν
ἀποπιέζει, καὶ, πρὶν ἢ λεπίυνθῆναι, ἔ-
κύνουσιν.

Aër. Aq. Loc. IX. 12.

II. Prædict. XXXIII. 2.

Natur. Mul. XIX. 4. 5. 7.

Aristotel. de Gener. Animal. I. 18.

μεζ'. 1) Ἦν ὑσέρη ἐν τῇ ἰσχύϊ ἐγκειμένη
διαπυήση, ἀνάγκη ἐμμοτον γενεῶσθαι.

Natur. Mul. VI. 5.

I. Morb. Mul. XCI. 32.

μή. Ἐμβρυα, τὰ μὲν ἄρσεναι ἐν τοῖσι
δεξιοῖσι, τὰ δὲ θήλεα ἐν τοῖσιν ἀριστεροῖσι
μετέχον.

Aph. V. 38.

II. Prædict. XXXIV. 10. 11.

μεθ'. Ἐς ὑτέρων ἐκπλώσιας πταρμικὸν
ἐπιτιθεῖς,

45. 1) Quæ verò mediocriter corpus habentes abortiunt bimestres & trimestres sine causâ manifestâ , his uteri acetabula mucò plena sunt, & non possunt continere foetum præ gravitate, sed abrumpuntur.

1) I. Morb. Mul. XII. 4.

46. 1) Quæ præter naturam crassæ existentes non concipiunt in utero, his omentum os uteri comprimit, &, priusquam attenuentur, prægnantes non fiunt.

Steril. X. 7.

XV. 11. ad 14.

Superfoet. XVIII. 1.

1) Superfoet. IX. 4.

47. 1) Si uterus coxæ incumbens suppuratus fuerit, necesse est medicamenta in linteo carpto applicari.

II. Morb. Mul. XXIX. 5.

1) Natur. Mul. VIII. 1.

48. Foetus, mares quidem in dextris, foeminæ verò in sinistris magis.

II. Epid. VI. 32.

Superfoet. XVIII. 10. 11. 12.

49. Ut secundæ excidant, sternuta-

ἐπιτιθεῖς, ἐπιλαμβάνειν τὰς μυκτῆρας καὶ τὸ σόμα.

Aph. V. 35.

Coac. III. 175.

Prænot. XIII. 11.

II. Epid. V. 42.

γ'. Γυναικὶ τὰ καταμηνία ἢν βάλῃ ἐπι-
σχεῖν, σικύην ὡς μεγίστην πρὸς τὰς (α) τιτ-
θὺς πρόσβαλλε.

II. Epid. VI. 33.

II. Morb. Mul. I. 4. 11. 17.

γά. Ὀκόσαι ἐν γαστρὶ ἔχουσι τετῶν τὸ
σίμα τῶν ὑπερῶν ζυμμέμυκεν.

Aph. V. 54.

Octimeft. IV. 5. 6. 7.

ιβ'. Ἦν γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχέσθῃ γάλα
(α) πολὺ ἐκ τῶν μαζῶν ῥυῆ, ἀσθενὲς τὸ ἔμ-
βρυον σημαίνει. ἢν ᾗ σπεροὶ οἱ μαστοὶ ἔωσιν,
ὑγεινότερον τὸ ἔμβρυον σημαίνει.

II. Epid. VI. 35. 36.

ιγ'. Ὀκόσαι διαφθεῖρειν μέλλουσι τὰ ἔμ-
βρυα, ταύτησιν οἱ τιτθοὶ ἰσχοὶ γίνονται.
ἢν ᾗ πάλιν σκληροὶ γίνωνται, ὀδύνη ἔσαι,
ἢ ἐν τοῖσι τιτθοῖσιν, ἢ ἐν τοῖσιν ἰχίοισιν,
ἢ ἐν τοῖσιν ὀφθαλμοῖσιν, ἢ ἐν τοῖσι γένασιν,
καὶ δ' διαφθεύουσιν.

Aph. V. 37.

II. Epid. II. 42.

ιδ'. 1) Ὀ-

tatorio indito, nares & os apprehendere oportet.

I. Morb. Mul. LXXVI. 6. 7.

XCIII. 1. 6. 7.

II. Morb. Mul. XLIII. 6. 7.

50. Mulieri menstrua si velis cohibere, cucurbitam quam maximam ad mammas appone.

(a) Celf. II. 11. pag. 83. l. 24. IV. 20. pag. 234. l. 1.

51. Quæ in utero gerunt, harum os uteri clausum est.

Superfœt. II. 1. 2. 3.

XIX. 1.

52. Mulieri in utero gerenti si multum lactis ex mammis fluxerit, infirmum foetum significat. Si verò solidæ fuerint mammæ, saniores foetum significat.

(a) Celf. II. 7. p. 62. l. 1.

53. Quæ perdituræ sunt foetus, his mammæ graciles fiunt. Si verò rursus duræ fiant, dolor erit, aut in mammis, aut in coxis, aut in oculis, aut in genibus, & non perdunt.

I. Morb. Mul. XLIV. 1. 2. 3.

K 3

54. 1) Qui-

νδ'. 1) Οκόσησι τὸ σόμα τῶν ὑσερῶν σκληρόν ἐστι, ταύτησιν ἀνάγκη τὸ σόμα τῶν ὑσερῶν 2) ξυμμεύειν.

Aph. V. 51.

Natur. Mul. XXXI. 10.

II. Morb. Mul. XXIII. 11.

XLV. 11. 12.

XLVI. 1. 2.

XLVII. 1.

XLIX. 1. 2.

L. 1. 2.

νε'. 1) Οκόσαι ἐν γαστρὶ ἔχουσαι ὑπὸ πυρετῶν λαμβάνονται, καὶ ἰχυρῶς ἰχναίνονται, ἀνευ προφάσεως φανερῆς, τίτλεισι χαλεπῶς καὶ ἐπικινδύνως, ἢ ἐκτιτρώσκεισαι κινδυνεύουσιν.

Aph. V. 30. 43. Coac. III. 408.

νς'. Ἐπὶ ῥόῳ γυναικείῳ σπασμὸς καὶ λειποθυμία ἢ ἐπιγένηται, κακόν.

Aph. V. 3.

Coac. III. 424.

νζ'. 1) Καταμηνίων γινομένων πλειόνων, νῆσοι ξυμβαίνουσι 2) καὶ μὴ (α) γινομένων, ἀπὸ τῆς ὑσέρης γίγνονται νῆσοι.

1) Natur. Mul. XIII. 5.

XXXIX. 1. 2. 5. 6.

XL. 2. 5. 6.

I. Morb. Mul. XIV. 1. 12.

II. Morb. Mul. III.

V.

VI. &c.

2) Natur. Puer. VI. 14.

XIII. 1.

νή. 1) Ἐπὶ

54. 1) Quibus os uteri durum est, his necesse est os uteri 2) clausum esse.

1) Natur. Mul. XIX. 9.

2) I. Morb. Mul. XXIV. 2.

LXVIII. 7.

II. Morb. Mul. XVIII. 24.

L. 13.

55. 1) Quaecumque in utero gerentes à febris corripuntur, & vehementer attenuantur absque manifestâ occasione, difficulter & periculose pariunt, aut abortientes periclitantur.

1) Aph. II. 28.

56. Si fluxui muliebri, convulsio & animi deliquium superveniat, malum.

II. Morb. Mul. XIII. 7. 9.

57. 1) Menstruis copiosioribus prodeuntibus, morbi contingunt: & non prodeuntibus, ab utero sunt morbi.

Virg. Morb. II. 5. ad 14.

Natur. Mul. XVIII. 1. ad 5.

I. Morb. Mul. III. 1.

X. 1. ad 5.

Superfoet. XXIV. 1.

(a) Cels. II. 7. p. 59. l. 29.

Hippocr. de-Genitur. VII. 8.

Coac. Prænot. III. 412. 413.

K 4

58. 1) Re-

νή. 1) Ἐπὶ ἀρχῷ φλεγμαίνοντι, καὶ ἐπὶ
υἱέρῃ φλεγμαίνουσῃ, καὶ ἐπὶ νεφροῖσιν ἐμπύοι-
σο, τραγχερίη ἐπιγίνεται. 2) ἐπὶ τῷ ἥπατι
φλεγμαίνοντι, λύγξ ἐπιγίνεται.

1) Fistul. III. 1.

IV. 1.

νθ'. Γυνὴ ἣν μετ' λαμβάνῃ ἐν γαστρὶ, βέ-
λη τῇ εἰδέναι εἰ λήψεται, περικαλύψας ἱμα-
τίοισι. Συμῖα κάτω. καὶ μὲν πορεύεσθαι σοι
δοκῇ ἢ ὁδμῇ διὰ τοῦ σώματος εἰς τὰς ρῖνας
καὶ εἰς τὸ σῶμα, γίνωσκε, ὅτι αὐτὴ εἰς αὐτὴν
ἐαυτὴν ἀγονός ἐστιν.

Aph. V. 41.

Natur. Mul. VII. 9.

I. Morb. Mul. CVII. 1. &c.

II. Morb. Mul. XL. 20. 21.

ξ'. Ἦν γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἡχέσῃ αἱ κα-
θάρσεις πορεύονται, ἀδύνατον τὸ ἔμβρυον
ὑγιαίνειν.

Natur. Puer. V. 3.

ξα'. Ἦν γυναικὶ καθάρσεις μετ' πορεύων-
ται, μήτε φρίκης, μήτε πυρετὸς ἐπιγενομέ-
νος, ἄσαι τῇ αὐτῇ προσπίπτωσι, λογίζεσθαι τὴν
ἐν γαστρὶ ἔχειν.

Aph. V. 41. I. Morb. Mul. XCIX. 2.

ξβ'. Οἰκίσαι ψυχρὰς καὶ πυκνὰς τὰς μή-
τρας

58. 1) Recto intestino inflammato, & utero inflammato, & renibus suppuratis, urinæ stillicidium supervenit.
2) Hepati autem inflammato, singultus supervenit.

2) Aph. VII. 13. Int. Affect. XLI. 6.

59. Mulier si in ventre non concipiat, velis autem scire an conceptura sit, vestibis circumtectam subter suffito. Et si quidem procedere tibi videatur odor per corpus ad nares & ad os, scito, hanc non propter se ipsam infœcundam esse.

Steril. VI. 3.

Superfœt. IX. 3.

X. 9. 11.

60. Si mulieri in utero gerenti purgationes prodeant, fœtum sanum esse impossibile.

I. Morb. Mul. XL. 2. 5. 9. 11.

XLIV. 4. 5. 6.

XCIX. 2.

61. Si mulieri purgationes non prodeant, neque horrore, neque febre superveniente; cibi autem fastidia ipsi accidant, hanc in utero gerere putato.

Steril. VI. 9. 10.

62. Quæ frigidos ac densos uteros ha-

τρως ἔχουσιν, ὃ κυΐσκουσιν, 1) καὶ ὀκόσαι κα-
 δύγους ἔχουσιν τὰς μήτρας, ὃ κυΐσκουσιν.
 ἀποσβέννυται γὰρ αὐταῖς ὁ γόνος. καὶ ὀκό-
 σαι ξηρὰς μᾶλλον καὶ περικαεῖς· εἰδεῖν γὰρ τῆς
 τροφῆς φθείρεται τὸ σπέρμα. ὀκόσαι δὲ ἐξ
 ἀμφοτέρων τὴν κρεῖσιν ἔχουσιν σύμμετρον,
 2) αἱ τοιαῦται ἐπίτεκνοι γίνονται.

1) I. Morb. Mul. XXVI. 27.

XXXIII. 5.

XXXIV. 1.

ξγ'. Παραπλησίως ὃ καὶ ἐπὶ τῶν ἀρρένων.
 1) ἡ γὰρ δι' ἀραιότητα τῆς σώματος τὸ
 πνεῦμα ἔξω φέρεται, πρὸς τὸ μὴ παρα-
 πέμπειν τὸ σπέρμα. 2) ἡ διὰ τὴν πυκνό-
 τητά τοῦ υἱοῦ ὃ διαχωρεῖ ἔξω. ἡ διὰ τὴν
 ψυχρότητα ὃ ἐκ πυρρίσκειται, ὥστε ἀθροίζεσθαι
 πρὸς τὸν τόπον τῆτον· ἡ διὰ τὴν θερμασίην
 τὸ αὐτὸ τῆτο γίνεται.

1) Aliment. IV. 1. 2. 5.

2) Aliment. VI. 3. 4. 6. 7.

ξδ'. 1) Γάλα (a) διδόναι κεφαλαλγέσσι,
 κακόν. κακόν ὃ καὶ πυρεταίνουσι, 2) καὶ οἷσιν
 ὑποχόνδρια μετέωρα διαβορβορίζοντα, καὶ
 τοῖσι διψώδεσι. κακόν δὲ καὶ οἷτι χολώδεις
 αἱ ὑποχωρήσιες, καὶ ἐν τοῖσι ὀξέσι πυρετοῖ-
 σιν ἔχουσιν· καὶ οἷσιν αἷματ' πολλὰ διαχω-
 ρήσις γέγονεν. 3) (b) ἀρμόζει δὲ τοῖσι
 φθι-

habent, non concipiunt. 1) Et quæ præhumidos habent uteros, non concipiunt: extinguitur enim ipsis genitura. Et quæ siccos magis & adurentes: alimenti enim inopiâ semen corrumpitur. Quæ verò ex utrisque temperamentum habent moderatum, 2) hæ ipsæ proliferæ fiunt.

2) II. Prædict. XXXIII. 2. ad 6.

63. Similiter autem etiam in masculis. Aut enim propter corporis raritatem spiritus extrâ fertur, ut semen non demittat. 2) Aut propter densitatem humidum non pervadit foras. Aut propter frigiditatem non incalcescit, ut ad hunc locum congregetur. Aut propter caliditatem hoc idem contingit.

64. 1) (a) Lac dare capite dolentibus, malum. Malum verò etiam febricitantibus, 2) & quibus hypochondria elevata *sunt* murmurantia, & siticulosi. Malum autem & quibus dejectiones biliosæ, & qui in acutis sunt febribus: & quibus copiosi sanguinis facta est egestio. 3) (b) Convenit verò tabidis

φθινάδεσι 4) μὴ λίην πολλῶ πυρέσσῃσι διδόναι (γάλα,) ἢ ἐν πυρετοῖσι μακροῖσι καὶ βληχεροῖσι, μηδενὸς τῶν προειρημένων σημείῳ παρόντος· παρὰ λόγον δὲ ἐκτετηκέσιν.

III. Epid. III. Æg. XIII. 7.

1) I. Morb. Mul. LXXXVIII. 22.

2) Aph. IV. 73.

3) Int. Affect. IV. 25.

XI. 26.

ξέ. Οἷοίσισιν οἰδήματα ἐφ' ἑλκεσι (a) φαίνονται, ἔ μάλα σπῶνται, ἐδὲ μαίνονται τετέων ἢ ἀφανισθέντων ἐξαίφνης, τοῖσι μὲν ὀπίθεν, σπασμοὶ, τέτανοι· τοῖσι δὲ ἔμπροσθεν, μαΐαι, ἢ ὀδύναι πλευρῷ ὀξεῖαι, ἢ ἐμπύησις, ἢ δυσεντερία, ἢ ἐρυθρὰ ἢ τὰ οἰδήματα.

II. Epid. III. 129. ad 132.

ξς'. Ἦν, τραυμάτων ἰχυρῶν ἑόντων καὶ πονηρῶν, οἰδήματα (b) μὴ φαίνηται, μέγα κακόν.

II. Epid. III. 128.

XXIII. 1.

ξζ'. Τὰ χαῦνα, κρησά· τὰ δὲ ἔνωμα, κακά.

II. Epid. III. 128.

ξη'. Τῷ τὰ ὀπίθεν (a) τῆς κεφαλῆς ὀδυνημένῳ, ἢ ἐν μετώπῳ ὀρθὴ φλέψ τμηθεῖσα ὠφελέει.

Loc. in Hom. XLIX. 10.

II. Prædict. XXXVI. 5. 6.

ξθ'.

dis 4) non admodum valdè febricitantibus (lac) dare, & in febribus longis & languidis, nullo ex supradictis signis præfente : & præter rationem quidem extenuatis.

4) II. Morb. Mul. VIII. 21.

(a) Celf. III. 22. p. 170. l. 7.

(b) Celf. III. 22. p. 170. l. 11.

Aretæus de Curat. Acut. 1. 3.

65. Quibus tumores in ulceribus (a) apparent, non valdè convelluntur, neque infaniant. His autem derepentè disparentibus, quibus in posticâ quidem parte fuerint convulsiones, tetani : i. e. rigores quibus verò in anticâ, infantiæ, aut lateris dolores acuti, aut suppuratio, aut dysenteria, si rubicundi fuerint tumores.

(a) Celf. II. 7. p. 62. l. 5.

66. Si, magnis & pravis existentibus vulneribus, tumores non (b) appareant, ingens malum.

(b) Celf. V. 26. p. 295. l. 31.

67. Laxi tumores, boni : crudi verò, mali.

68. Posticâ capitis parte dolenti, recta in fronte vena secta juvat.

VI. Epid. II. 48. Soran. Ephes. Ifagog. Affection. II. 10. 11. c. XXI.

L

69. Ri-

ξθ'. Ῥίγεα ἄρχεται γυναιξὶ μὲν ἐξ ὀσφύος μᾶλλον, καὶ διὰ νῶτα ἐς κεφαλὴν αἰδεῖται ἢ, μᾶλλον ὀπίθεν, ἢ ἔμπροσθεν τοῦ σώματος, οἷον ἀπὸ τε πηχέων καὶ μηρῶν. 1) ἀτὰρ καὶ τὸ δέρμα ἄραιόν. δηλοῖ ἢ τὸτο ἢ θρίξ.

II. Epid. III. 111.

VI. Epid. III. 30. ad 35.

ο'. Οἱ ὑπὸ τεταρταίων ἀλίσκόμενοι, 1) ὑπὸ σπασμῶς ἢ πάνυ τι ἀλίσκονται. 2) ἢν δὲ ἀλίσκωνται πρότερον, εἴτα ἐπιγίνεται τεταρταῖος, παύεται.

Aph. II. 26.

VI. Epid. VI. 16.

I. Epid. III. 17. 18.

VIII. 96. 97.

οά. Ὅκόσοισι δέρματα περιτείνεται καρφαλέα ἢ σκληρά, ἄνευ ἰδρώτων τελευτῶσιν. ὁκόσοισι ἢ χαλαρὰ καὶ αῖραια, σὺν ἰδρῶτι τελευτῶσιν.

VI. Epid. VI. 29.

οβ'. Οἱ ἰκτερώδεις, ἢ πάνυ τι πνευματώδεις εἰσιν.

69. Rigores incipiunt , mulieribus quidem ex lumbis magis , & per dorsum ad caput. Viris autem , posticâ magis parte , quàm anticâ corporis , velut ex cubitis ac femoribus. 1) Sed & cutis *viris* rara *est*. Hoc quidem pilus indicat.

1) Natur. Puer. XVII. 2. 3. 14.
XVIII. 1.

70. A quartanis correpti , 1) à convulsione non admodum corripuntur. 2) Si verò priùs corripiantur , & postea quartana supervenerit , liberantur.

1) San. Tuend. ad Dem. 12.
2) Vid. Aph. IV. 57.

71. Quibus cutis obtenditur arida ac dura , sine fudore moriuntur. Quibus verò laxa ac rara , cum fudore moriuntur.

72. IctERICI non admodum flatulenti sunt.

Τμήμα ἕκτον.

Α'.

Ε' ἐν τῇσι χρονίῃσι λειεντερίῃσιν ὄξυρεγμία ἐπιγιγνομένη, μὴ γενομένη πρότερον, σημεῖον ἀγαθόν.

II. Epid. II. 49. 50. 51. I. Morb. VI. 10.

β'. Οἷσι ῥῖνες ὑγρότεραι φύσει, καὶ ἡ γυνὴ ὑγροτέρη, ὑγιαίνουσι νοσηρότερον· οἷσι δὲ ταναντία, ὑγιεινότερον.

VI. Epid. VI. 37.

γ'. Ἐν τῇσι μακροῇσι δυσεντερίῃσιν αἱ ἀποσιτίαι, κακόν· καὶ σὺν (α) πυρετῶ, κάκιον.

VI. Epid. VIII. 1. Coac. VI. 100.

δ'. Τὰ περιμαάδῃρα ἔλκεα, (α) κακοήθεα.

VI. Epid. VIII. 2.

ε'. Τῶν ὀδυνέων καὶ ἐν πλευρῇσι, καὶ ἐν στήθεσι, καὶ ἐν τοῖσιν ἄλλοις (μέρεσιν) ἢ μέγα διαφέρωσι, καταμαθητέον.

II. Prædict. XVII. 4.

XIX. 6. 7.

XX. 4.

ς'. Τὰ νεφριτικά, καὶ ὅκιστα κατὰ τὴν κύσιν ἀλγύματα, ἐργαδῶς ὑγιάζεται τοῖσι πρεσβύτησι.

VI. Epid. VIII. 4.

ζ'. Τὰ

Sectio Sexta.

I.

IN diuturnis intestinorum lævitatibus ructus acidus superveniens, qui prius non fuit, signum bonum.

2. Quibus nares naturâ humidiores, & genitura humidior, imperfectius sani sunt: quibus verò contraria, perfectius.

3. In longis dysenteriis appetitus prostratus, malum: & cum febre pejus.

(a) Celf. II. 8. pag. 69. l. 5.

4. Ulcera circum glabra, (a) maligna.
Celf. V. 26. §. 31. p. 300. l. 10. VII. 3. p. 411. 16.

5. Dolores & in lateribus, & in pectoribus, & in aliis (partibus,) si multum differant, considerandum.

VI. Epid. VII. 83.

Viêt. Acut. LII. 1. 2. 3.

6. Renum & vesicæ dolores difficulter sanantur *in* senibus

L 3

7. Do-

ζ'. Τὰ ἀλγύματα τὰ κατὰ τὴν κοιλίην, γινόμενα, τὰ μὲν μετέωρα, κεφότερα· τὰ δὲ μὴ μετέωρα, ἰχυρότερα.

ή. 1) Τοῖσιν ὑδρωπικοῖσι τὰ γινόμενα ἔλκεα (α) ἐν τῷ σώματι, ἔρηϊδίως ὑγιάζεται.

1) Aph. VI. 14.

θ'. Τὰ πλατέα ἐξανθήματα ἔ πάνυ τι κνησμώνεα.

VI. Epid. II. 52.

ι. Κεφαλὴν (α) πονέοντι, καὶ περιωδυνέοντι, πύον, ἢ ὕδωρ, ἢ αἷμα ῥυέν κατὰ τὰς ῥίνας, ἢ κατὰ τὸ σῶμα, ἢ κατὰ τὰ ὦτα, λύει τὸ νέσθημα.

Judicat. XII. 3.

Sal. Diet. XIV. 4.

Coac. II. 25. 26. 27. 59. VII. Epid. XXX. 6. 16.

ια. Τοῖσι μελαγχολικοῖσι, καὶ τοῖσι νεφριτικοῖσιν, αἰμορροΐδες ἐπιγινόμεναι, ἀγαθόν.

Aph. VI. 21.

Humor. XI. 1.

ιβ'. Αἰμορροΐδας ἰηθέντι χρονίας, ἢν μὴ μία φυλαχθῇ, κίνδυνος (α) ὑδρωπα ἐπιγενέσθαι, ἢ φθίσιν.

Humor. XI. 3.

IV. Epid. XXXI. 1. 2.

127. Ὑπὸ

7. Dolores qui in ventre fiunt, elevati quidem, leviores: non elevati verò, vehementiores.

8. 1) Hydropicis ulcera in corpore orta, (a) non facilè sanantur.

(a) Celf. III. 21. pag. 161. l. 4.

9. Efflorescentiæ latæ, non admodum pruriginosæ.

10. Caput (a) laboranti, & circumcirca dolenti, pus, aut aqua, aut sanguis effluens per nares, aut per os, aut per aures, solvit morbum.

II. Morb. IV. 18.

III. Morb. II. 6. 7. 8.

XII. 1. ad 7. (a) Celf. II. 8. p. 70.

XVI. 10.

l. 9.

11. Melancholicis, & nephriticis, hæmorrhoides supervenientes, bonum.

Judicat. X. 9.

12. Hæmorrhoidas curanti diuturnas, nisi una servata fuerit, periculum (a) est ne hydrops superveniat, aut tabes.

V. Epid. X. 18. ad 21. (a) Celf. II. 7. pag.

VI. Epid. III. 65.

62. l. 12.

L 4

13. A

ιγ'. Ὑπὸ λυγμῶ ἐχομένῳ πῖαρμοὶ (a) ἐπι-
γενόμενοι, λύσει τὸν λυγμὸν.

Prænot. XIII. 11. Coac. III. 175.

ιδ'. Ὑπὸ ὕδρωπος ἐχομένῳ, τῷ κατὰ
ταῖς φλέβαις ἐς τὴν κοιλίην ὕδατος ῥυέντος,
λύσει.

Aph. VII. 29.

Flat. XIII. 8. 9.

Judicat. XI. 20.

ιε'. Τὸ διὰ ῥοίης (b) ἐχομένῳ μακρῆς,
ἀπὸ ταυτομάτης ἐμείψης ἐπιγενομένης, λύσει
διὰ ῥοιαν.

II. Diæt. XXVI. 15. 16.

Loc. in Hom. XLV. 8.

Coac. III. 7.

ις'. Ὑπὸ πλευρίτιδος, ἢ ὑπὸ περιπλευ-
μονίης ἐχομένῳ (c) διὰ ῥοία ἐπιγενομένη,
κακόν.

Aph. V. 12. 14.

Loc. in Hom. XXIX. 15. 16. 17.

I. Morb. VI. 5.

X. 41.

ιζ'. Ὀφθαλμοὶ (d) ὑπὸ διὰ ῥοίης ληφ-
θῆναι, ἀγαθόν.

Judicat XII. 9. Coac. II. 130. 133.

ιη'. Κίσειν διακοπέντι, ἢ ἐγκέφαλον,
(a) ἢ

13. A singultu detento sternutationes (a) supervenientes, solvunt singultum.

(a) Cels. II. 8. p. 69. l. 27.

14. Ab hydrope detento, si aqua secundum venas in alvum fluxerit, solutio fit.

Coac. III. 285. 289.

I. Morb. VI. 7.

II. Morb. LXIX. II. 12.

15. A diuturno alvi (b) profluvio detento, spontè superveniens vomitus, alvi profluvium solvit.

I. Morb. VI. 10.

VII. 7.

(b) Cels. II. 8. p. 69. l. 27.

16. A pleuritide, aut à peripneumoniâ detento alvi (c) profluvium superveniens, malum.

III. Morb. XVII. 59.

(c) Cels. II. 8. pag. 71. l. 9.

17. Ophthalmiâ (d) laborantem alvi profluvio corripitur, bonum.

(d) Cels. II. 8. p. 69. l. 20.

18. Cui perfecta est vesica, aut cerebrum,

(α) ἡ καρδίην, ἡ φρένας, ἡ τῶν ἐντέρων τι τῶν λεπτῶν, ἡ κοιλίην, ἡ ἥπαρ, θανατῶδες.

Aph. VI. 24.

II. Prædict. XIX. 2. ad 6. II. 12.

XXII. 1.

Coac. III. 387. 388. 389.

ιβ'. Ἐπὶ τὴν διακοπὴν ὀστέον, ἡ χόνδρος, ι) ἡ νεῦρον, (b) ἡ γνάθος τὸ λεπτὸν, ἡ ἀκροποδίη, ἔτε αὐξέται, ἔτε ξυμφύεται.

Aph. VII. 28.

Coac. III. 379. ad 382.

ι) II. Prædict. XXIV. 1.

I. Morb. III. 32. 33.

VII. 21.

κ'. Ἦν ἐς τὴν κοιλίην αἷμα (c) ἐκχυθῇ παρὰ φύσιν, ἀνάγκη ἐκπυηθῆναι.

Aph. VII. 38.

I. Morb. III. 37.

Plat. XVII. 3.

X. 42. ad 48.

XII. 4.

XV. 4.

κα'. Τοῖσι μαινομένοισι, κισσῶν, (d) ἡ αἰμορροΐδων ἐπιγενομένων, τῆς μανίης λύσις.

Aph. VII. 5.

Humor. XI. 1.

κβ'. Ὅσα ῥήγματα ἐκ τῆ νώτης (e) ἐς τὰς ἀσκῶνας καταβαίνει, φλεβοτομή λύει.

II. Morb. LIX. 22.

κγ'. Ἦν φόβος κ) (a) δυσθυμίη πολὺν χρένον

rebrum, (a) aut cor, aut septum transversum, aut aliquod ex intestinis tenuibus, aut ventriculus, aut hepar, lethale.

I. Morb. III. 4.

VII. 21.

(a) Celf. V. 26. §. 2. p. 283. l. 18.

19. Ubi dissectum fuerit os, aut cartilago, (1) aut nervus, (b) aut genæ pars tenuis, aut præputium, neque augeatur, neque coalescit.

(b) Celf. II. 10. p. 81. l. 24. V. 26. §. 22.
pag. 291. l. 28.

Aristotel. Hist. Anim. l. 13.

20. Si in ventrem sanguis effusus (c) fuerit præter naturam, necesse est suppurari.

(c) Celf. II. 7. pag. 62. l. 29.

21. Infanientibus, si varices, (d) aut hæmorrhoides supervenerint, infantiæ solutio fit.

(d) Celf. II. 8. pag. 69. l. 21.

22. Quæ ruptiones ex dorso (e) ad cubitos descendunt, venæsectio solvit.

(e) Celf. II. 10. pag. 81. l. 8.

23. Si metus & (a) tristitia multo tem-

χρόνον διατελέη , μελαγχολικόν τὸ τοιῆ-
τον.

Aph. VII. 40.

κδ'. Εντέραν ἢ διακοπῇ τῶν λεπλῶν τι ,
ε' συμφύεται.

Aph. VI. 18. 19.

II. Prædict. XIX. 4.

κε'. Ερυσίπελας ἔξωθεν μὲν εἴτω τρέ-
πεσθαι , ε'κ ἀγαθόν * ἔσωθεν δὲ ἔξω ,
ἀγαθόν.

Aph. VI. 37.

Prænot. VII. 3.

XXIII. 9.

κς'. Οκόσοισιν ἂν ἐν τοῖσι καύσοισι τρέ-
μοι (b) γενωνται , παρακοπὴ λύει.

Judicat. XI. 10. Coac. I. 185.

κζ'. Οκόσοι ἔμπυοι , I) ἢ ὑδρωπικοὶ
(c) καίονται , ἢ τέμνονται , ἐκρυέντ' τῷ
πύς ἢ τῷ ὕδατι ἀδρός , πάντως ἀπόλ-
λυνται.

Aph. II. 51.

VII. 44.

Coac. III. 91. 92.

II. Morb. XLV. 24. ad 28.

III. Morb. XXVII. 1. 8. 14.

κη'. Εὐνῆχοι (d) ε' ποδαγριῶσιν , I) ε'δὲ
φαλακροὶ γίνονται.

(1) Nat. Puer. XIIIX. 4. 5. 6.

XIX. 1.

κθ'. Γυνή

pore perseverent, melancholicum hoc ipsum.

(a) Cels. II. 7. pag. 62. l. 17.

24. Si ex intestinis tenuibus aliquod dissectum fuerit, non coalescit.

Coac. III. 379. 387.

I. Morb. VII. 24.

25. Erysipelas foris quidem intrò verti, non bonum: intùs verò foràs, bonum.

Coac. III. 103.

I. Morb. VI. 8. 9.

26. Quibus in febre ardente tremores (b) fiunt, delirium solvit.

(b) Cels. II. 8. pag. 69. l. 34.

27. Qui suppurati, 1) aut hydropici (c) uruntur, aut secantur, hi pure aut aquâ acervatim effluente, omninò moriuntur.

Int. Affect. IV. 30.

X. 20. ad 23.

XXV. 33. ad 36.

XXVII. 5.

1) VI. Epid. VII. 62.

(c) Cels. II. 8. pag. 73. l. 2.

28. Eunuchi (d) non laborant podagrâ, 1) neque calvi fiunt.

(d) Cels. IV. 24. p. 137. l. 20.

M

29. Mu-

κθ'. Γυνή ε' (α) ποδαγριᾷ, ἢν μὴ τὰ κα-
ταμήνια (b) αὐτέῃ ἐκλίπη.

V. Epid. XXXIII. 4.

VI. Epid. VIII. 98. ad 101.

VII. Epid. XLIX. 12.

λ'. Παῖς (c) ε' ποδαγριᾷ, πρὸ τῆς ἀφρο-
δισιασμῶ.

Coac. III. 395.

λα'. Οἰσύναις ὀφθαλμῶν ἀκρητοποσίῃ, ἢ
λατρὸν, ἢ πυρίῃ, ἢ φλεβοτομίῃ, ἢ φαρμα-
κείῃ λυέι.

Aph. VII. 46.

II. Epid. VI. 26.

λβ'. 1) Τραχελοὶ ὑπὸ διαρροῆς μάλιστα
αἰλίσκονται μακρῆς.

1) Præcept. XII. 1. ad 5. Coac. III. 147.

λγ'. Οἱ ὀξυρεγμειώδεις ε' πάνυ τι πλευ-
ριτικοὶ γίνονται.

λδ'. Οἰσύναις φαλακροὶ, τετέοισι κισσοὶ
μεγάλοι ε' γίνονται. οἰσύναισι δ' ἂν φαλα-
κροῖσιν ἔξοι κισσοὶ ἐπιγέγωνται, πάλιν ἔξοι
γίνονται δασέες.

II. Epid. V. 40.

λέ. Τοῖσιν ὑδρωπικοῖσι βήξ (c) ἐπιγενο-
μένη, κακόν.

Aph. VII. 47.

II. Prædict. XI. 1. 16.

λς'. Δυσχ-

29. Mulier non (a) laborat podagrâ, nisi menses (b) ipsi defecerint.

I. Morb. Mul. XIII. 6. 11.

(a) Senec. Ep. XCV.

(b) Cels. IV. 24. pag. 237. l. 22.

30. Puer (c) non laborat podagrâ, ante Veneris usum.

(c) Cels. IV. 24. pag. 237. l. 20.

31. Oculorum dolores meri potus, aut balneum, (d) aut fomentum, aut venæsectio, aut purgatio solvit.

(d) Cels. VI. 6. pag. 348. l. 10.

32. 1) Balbi ab alvi profluvio maxime corripuntur longo.

Verat. uf. 1. 12.

33. Acidum ructantes non admodum pleuritici fiunt.

34. Qui calvi sunt, his varices magni non fiunt. Quibus verò dum sunt calvi superveniunt varices, hi rursus capillati fiunt.

35. Hydropicis tussis (e) superveniens, malum.

II. Epid. V. 28.

(e) Cels. II. 8. pag. 72. l. 25.

λς'. Δυσχρίην φλεβοτομή λύει· τάρμνεν
δὲ τὰς εἴσω.

Vid. Aph. VII. 48.

λζ'. Ὑπὸ κυνάγχης ἐχομένῳ (α) οἶδημα
γενέσθαι ἐν τῷ τραχήλῳ ἀγαθόν· ἔξω γὰρ
τρέπεται τὸ νέσθημα.

Vid. Aph. VII. 49.

λή. Ι) Ὅκόσοισι κρυπτοὶ καρκῖνοι γίνον-
ται, μὴ θεραπεύειν βέλιον. θεραπευόμενοι
γὰρ ἀπόλλυνται ταχέως. μὴ θεραπευόμε-
νοι δὲ πλείω χρόνον διατελῶσι.

Ι) II. Prædict. XVIII. 5. 9.
XXI. 5.

λθ'. Σπασμὸς γίνεται ἢ ὑπὸ πληρώσι⊙,
ἢ κενώσι⊙. ἔτω δὲ καὶ λυγμός.

μ'. Ὅκόσοισι περὶ τὸ ὑποχόνδριον πόνοι
γίνονται ἄτερ (b) φλεγμονῆς. τετέοισι πυ-
ρετὸς ἐπιγενόμεν⊙ λύει τὸν πόνον.

Aph. VII. 52.

Coac. III. 272.

μά. Ὅκόσοισι διὰ πυόν τι εὖν ἐν τῷ σώ-
ματι μὴ διασημαίνει, τετέοισι διὰ παχύτη-
τα τῷ πυόν, ἢ τῷ τόπῳ, οὐκ ἀποσημαίνει.

Coac. III. 238. 239.

II. Morb. XLV. 14.

μεβ'. Εἰν

36. Urinæ difficultatem venæsectio solvit: secundæ verò internæ.

37. Ab anginâ detento tumorem (a) fieri in collo, bonum: foràs enim morbus vertitur.

(a) Cels.IV.4.p.196.l.18.IV.4.p.197.l.14.

38. 1) Quibus occulti cancri fiunt, eos non curare melius est. Curati enim citò pereunt. Non curati verò longius tempus perdurant.

II. Morb. XXIII. 25.

39. Convulsio fit aut à repletionem, aut evacuationem. Sic quidem etiam singultus.

40. Quibus ad hypochondrium dolores fiunt absque (b) inflammationem, his febris superveniens solvit dolorem.

(b) Cels.II.8.p.70.l.3.III.10.p.139.l.17.

41. Quibus suppuratum quid in corpore existens, nullum sui signum prodit, his propter crassitudinem puris, aut loci, signum non exhibet.

III. Morb. XXVII. 1.

μβ'. Ἐν τοῖσιν ἰκτερικοῖσι τὸ ἥπαρ (a) σκληρὸν γενέσθαι, πονηρόν.

Aph. IV. 64.

Coac. II. 223. 225. ad 229.

μγ'. Ὅσοι σπληνώδεις ὑπὸ (b) δυσεντερίης ἀλίσκονται, 1) τετέοισιν, ἐπιγενομένης μακρῆς τῆς δυσεντερίης, 2) ὕδρωψ ἐπιγίνεται, ἢ λειεντερίη, καὶ ἀπόλλυνται.

Aph. VI. 48.

VII. 76.

Coac. III. 295. 296.

1) I. Morb. III. 27.

2) Coac. III. 275.

μδ'. Ὅσοισιν ἐκ (c) τραγχυρίης εἰλεὸς ἐπιγίνεται, ἐν ἑπτὰ ἡμέρησιν ἀπόλλυνται, ἢν μὴ πυρετὸς ἐπιγενομένης ἄλλως τὸ ἔρον ῥυῇ.

Judicat. XII. 2.

Coac. III. 314.

V. 75. 87.

με'. Ἐλκεα ὅσα ἐν αὐσίᾳ γίνονται, ἢ μακρότερον χρόνον ἵχθουσιν, ἀνάγκη ὀσέον ἀφίστασθαι, 1) καὶ τὰς ἐλὰς κοίλας γίνεσθαι.

Fractur. XXXVI. 2. 1) Ulcer. V. 4.

μς'. 1) Ὅσοι ὕδοι ἐξ ἁθματὸς, ἢ βηχὸς γίνονται πρὸ τῆς ἥβης, ἀπόλλυνται.

1) Articuli. XXXVII. 1. 4. 5. 6.

XXXVIII. 4. 5.

μζ'. Ὅσοισι φλεβοτομή, ἢ φαρμακείη

42. In ictericis hepar (a) durum fieri, malum.

(a) Celf. II. 8. pag. 74. l. 22.

43. Qui lienosi à dysfenteria (b) corripuntur, his longâ superveniente dysfenteria, hydrops supervenit, aut intestinorum lævitas, & pereunt.

Affectio. XXI. 23.

XXIII. 3.

XXVIII. 1.

(b) Celf. II. 8. p. 74. l. 24.

44. Quibus ex (c) urinæ stillicidio volvulus supervenit, in septem diebus pereunt, nisi febre superveniente urina abundè fluxerit.

(c) Celf. II. 8. p. 70. l. 7. II. 8. p. 74. l. 28.

45. Ulcera quæcunque annua fiunt, aut longius tempus occupant, necesse est os abscedere, 1) & cicatrices cavas fieri.

46. 1) Qui gibbi ex asthma, aut tussi fiunt ante pube.tatem, pereunt.

Vectiar. XXI. 6.

47. Quibus venæsectio, aut purgatio

κεῖν ξυμφέρει, τρεῖς προσῆκον τῷ ἥρ^Θ
φλεβοτομεῖν, ἢ φαρμακεύειν.

Aph. VII. 53.

μή. Τοῖσι σπληνώδεσι (α) δυσεντερίῃ ἐπι-
γενομένη, ἀγαθόν.

Aph. VI. 43.

Coac. III. 295.

μθ'. Οἷοσα ποδαγρικὰ νεσθήματα γί-
γνονται, ταῦτα ἀποφλεγμηνάντα (b) ἐν τεσ-
σάρακοντα ἡμέρησιν ἀποκαθίστανται.

Judicat. VI. 3.

ν'. Οἷοσοισιν ἂν ὁ ἐγκέφαλ^Θ (c) δια-
κοπῇ, τρεῖσιν ἀνάγκη πυρετὸν, καὶ χολῆς
έμετον ἐπιγίγνεσθαι.

II. Prædict. XXII. 12. 16.

XXIII. 5. ad 11.

Coac. III. 271. 383. 384.

νά. Οἷοσοισιν ὑγιαίνουσιν ὁδύναι γίγνον-
ται ἐξαίφνης ἐν τῇ κεφαλῇ, καὶ παραχρῆ-
μα ἄφωνοι γίνονται, καὶ ρέγχεσιν, ἀπόλ-
λυνται ἐν ἑπτὰ ἡμέρησιν, 1) ἢν μὴ πυρετὸς
ἐπιλάβῃ.

Judicat. XII. 4.

Coac. II. 6.

III. 320. ad 323.

II. Morb. VI. 1. 2. 3. 4. 7.

XXI. 2. ad 12.

νβ'. Σκοπεῖν ἢ χερὶ καὶ τὰς ὑποφάσυνας τῶν
ὀφθαλ-

tio conducit, his vere convenit venam
fecare, aut purgationem facere.

48. Lienosis dysenteria (a) superveniens, bonum.

I. Morb. VI. 7.

(a) Cels. II. 8. pag. 70. l. 1.

49. Qui podagrici morbi fiunt, hi
sedatâ inflammatione in (b) quadra-
ginta diebus decedunt.

(b) Cels. IV. 24. p. 240. l. 1.

40. Quibus percissum fuerit cere-
brum, his necesse est febrem, & bilis
vomitum supervenire.

III. Morb. I. 35.

(c) Cels. V. 26. p. 289. l. 34.

51. Quibus fanis dolores derepentè
fiunt in capite. & statim muti fiunt,
ac stertunt, in septem diebus pereunt,
1) nisi febris apprehenderit.

III. Morb. VIII. 2.

1) I. Prædict. X. 13.

XII. 8.

(d) Cels. II. 8. pag. 72. l. 14.

52. Considerare verò etiam oportet

ὁφθαλμῶν ἐν τοῖσιν ὕπνοισιν. ἣν γάρ τι ὑποφαίνεται, ξυμβαλλομένων τῶν βλεφάρων, (a) τῷ λευκῷ, μὴ ἐκ διαρροίης εἶναι, ἢ ἐκ Φαρμακοποσίης, φλαῦρον τὸ σημεῖον, καὶ θανατῶδες σφόδρα.

Prænot. III. 1.

Prædict. XI. 2.

νγ'. Αἱ παραφροσύναι, αἱ μὲν μετὰ (b) γέλωτι γινόμεναι, ἀσφαλέσονται· αἱ δὲ μετὰ σπασμῶς, ἐπισφαλέσονται.

Coac. I. 141.

νδ'. Ἐν τοῖσιν ὀξέσι πάθεσι τοῖσι μετὰ πυρετῷ, αἱ κλαυθμώδεις ἀναπνοαὶ, κακαί.

νε'. Τὰ ποδαγρικὰ (c) τῷ ἥρῳ, καὶ τῷ φθινοπώρῳ κινέεται ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ.

Aph. III. 20.

νς'. 1) Τοῖσι μελαγχολικοῖσι νεσήμεσιν εἰς τὰδε ἐπικίνδυνον 2) αἱ ἀποσκήψεις, 3) ἡ ἀποπληξίην τῷ σώματι, ἢ σπασμὸν, ἢ μανίην, ἢ τύφλωσιν σημαίνουσι.

1) Aph. VII. 40.

2) Vict. Acut. XLV. 3.

νζ'. Ἀπόπληκτοι δὲ μάλιστα γίνονται, ἐλικίῃ τῇ ἀπὸ τεσσαράκοντα ἐτέων ἄχρις ἐξήκοντα.

Aph. III. 31.

νθ'. Ην

tet oculorum subtus apparentia in formis. Si enim albi quid, palpebris commissis, subtus appareat, cui *id* non ex alvi profluvio est, aut ex potione purgante, pravum signum, & valdè lethale.

Coac. II. 124.

(a) Celf. II. 6. p. 54. l. 20. II. 8. p. 72. l. 18.

§ 3. Deliria, (b) cum risu quidem accidentia, securiora: cum studio verò, periculosiora.

(b) Celf. III. 18. p. 154. l. 32.

§ 4. In acutis affectionibus quæ cum febre *sunt*, luctuosæ respirationes, malæ.

§ 5. Podagrici *morbi* (c) vere, & autumnò moventur ut plurimum.

(c) Celf. II. 1. 6. 43. l. 28. III. 24. p. 238. l. 3.

§ 6. 1) Morbis melancholicis ad hæc periculosi sunt *humorum* 2) decubitus, 3) aut corporis fiderationem, aut convulsionem, aut insaniam, aut cæcitatem significant.

II. Prædict. XIII. 3. 3) Coac. III. 316. 317.

§ 7. Apoplectici autem fiunt maxime, ætate ab anno quadregesimo usque ad sexagesimum.

§ 8. Si

νή. Ἦν ἐπίπλοον ἐκπέτη, ἀνάγκη ἀπο-
σταπῆναι.

Coac. III. 378.

I. Morb. III. 36.

νθ'. Οὐόσοισιν ὑπὸ ἰχιάδ[⊙] ἐνοχλεμέ-
νοισι χρονίης ἐξίσταται τὸ ἰχίον, καὶ πάλιν
ἐμπίπτει, τετέοισι μύξαι ἐπιγίνονται.

ξ'. 1) Οὐόσοισιν ὑπὸ ἰχιάδ[⊙] ἐνοχλεμέ-
νοισι χρονίης τὸ ἰχίον (a) ἐξίσταται, τετέοισι
τήκεται τὸ σκέλ[⊙], 2) καὶ χωλεῖνται, 3) ἢ
μὴ καυθῶσιν.

1) Glandul. X. 8.

2) I. Morb. III. 16.

Int. Affect. LVIII. 2.

Τμήμα ἑξοδομον.

Α'.

Ε'ν 1) τοῖσιν ὀξέσι νοσήματι ψύξις (a) ἀ-
κρωτηρίων, κακόν.

Aph. VII. 26.

Coac. I. 165.

Prænot. XV. 9.

VI. Epid. VIII. 93.

β'. Ἐπὶ ὀσέῳ νοσέοντι σάρεξ πελιδνή, κα-
κόν.

γ'. Ἐπὶ ἐμέτῳ (b) λυγξ καὶ ὀφθαλμοὶ
ἐρυθροὶ, κακόν.

Coac. IV. 20.

δ'. Ἐπὶ

58. Si omentum exciderit, necesse est putrefieri.

59. Quibus à diuturno coxendicis morbo vexatis coxa excidit, & rursus incidit, his mucus innascitur.

60. 1) Quibus à diuturno coxendicis morbo vexatis coxa (a) excidit, his crustabescit, 2) & claudicant, 3) nisi ulsi fuerint.

3) Aër. Aq. Loc. XLVII. 5.
Affection. XXX. 12.

(a) Celf. IV. 23 pag. 236. l. 19.

Seçtio Septima.

I.

IN 1) Morbis acutis (a) extremarum partium frigus, malum.

1) Aph. IV. 8.

(a) Celf. II. 4. p. 51. l. 25. II. 6. p. 55. l. 21.

2. Ex osse ægrotante caro livida, malum.

3. A vomitu (b) singultus, & oculi rubri, malum.

(b) Celf. II. 4. p. 51. l. 27.

N

4. A

δ'. Ἐπὶ ἰδρῶτι (a) φρίκη, ἔχρησόν.

I. Prædict. VII. 14. 15.

ε'. Ἐπὶ μανίῃ δυσεντερίῃ, ἢ ὑδρωψ, ἢ ἔκσασις, ἀγαθόν.

Aph. VI. 21.

ς'. Ἐπὶ νέσῳ πολυχρονίῃ, ἀποσιτίῃ (b)

1) καὶ ἄκρητοι (c) ὑποχωρήσεις, κακόν.

1) Aph. VII. 23.

(b) Celf. II. 4. p. 51. l. 29.

ζ'. Ἐκ πολυποσίης ῥίγῃ καὶ παραφροσύνη, κακό.

Aph. V. 5.

η'. Ἐπὶ φύματι εἴσω ῥήξι, ἐκλυσις, ἔμελι, καὶ λειποψυχίῃ γίνεσθαι.

Coac. II. 236. I. Morb. XII. 7.

θ'. Ἐπὶ αἵματι ῥύσει (d) παραφροσίνῃ, ἢ καὶ σπασμὸς, κακόν.

Aph. V. 3.

Coac. III. 57.

ι'. Ἐπὶ εἰλεῖ ἔμελι, (e) ἢ λυγξ, ἢ σπασμὸς, ἢ παραφροσύνη, κακόν.

Coac. III. 303.

ια'. Ἐπὶ πλευρίτιδι (f) περιπνευμονίῃ, κακόν.

Coac. III. 172.

Affection. IX. 12.

ιβ'. Ἐπὶ

4. A sudore (a) horror , non bonum.
(a) Celf. II. 4. pag. 51. l. 26.

5. Ab infaniâ dyfenteria , aut hydrops , aut mentis emotio , bonum.

6. In morbo diuturno appetitus prostratus , (b) 1) & meracæ (c) dejectiones , malum.

(c) Celf. II. 4. pag. 53. l. 3.

7. A multo potu rigor , & delirium , malum.

8. A tumoris intus ruptione , exfolutio , vomitus , & animi deliquium fit.

9. A sanguinis fluxu (d) delirium , aut etiam convulsio , malum.

(d) Celf. II. 8. pag. 76. l. 12.

10. Ab ileo vomitus , aut (e) singultus , aut convulsio , aut delirium , malum.

(e) Celf. II. 8. pag. 74. l. 20.

11. A pleuritide (f) peripneumonia , malum.

(f) Celf. II. 7. pag. 64. l. 13.

ιβ'. Ἐπὶ περιπνευμονίῃ φρενίτις, κακόν.

ιγ'. Ἐπὶ καύμασιν ἰχυροῖσι (a) σπασμὸς, ἢ τέτανος, κακόν.

Aph. II. 26.

ιδ'. Ἐπὶ πληγῇ (b) εἰς τὴν κεφαλὴν ἐκπληξίς, ἢ παραφροσύνη, κακόν.

Coac. II. 8.

III. 371.

VII. Epid. XXX. 8.

ιε'. Ἐπὶ αἵματι πτύσει πύς πτύσις, κακόν.

Aph. VII. 16. 78.

Nat. Human. XXIII. 1.

ις'. 1) Ἐπὶ πύς πτύσει φθίσις καὶ ῥύσις.
2) ἐπὴν εἰς τὸ πτύελον (c) ἴχνηται, ἀποθνήσκουσιν.

Aph. VII. 15. 78.

1) Glandul. X. 2. 3. 4.

2) Coac. III. 257.

ιζ'. Ἐπὶ φλεγμονῇ τῇ ἡπατι (d) λυγξ, κακόν.

Aph. V. 58.

ιη'. Ἐπὶ ἀγρυπνίῃ σπασμὸς, (e) ἢ παραφροσύνη, κακόν.

(e) Cels. II. 7. p. 64. l. 17.

ιθ'. Ἐπὶ

12. A peripneumoniâ phrenitis, malum.

13. Ab ardoribus vehementibus (a) convulsio, aut tetanus, (*rigor*) malum.

(a) Celf. II. 7. pag. 64. l. 14.

14. A plagâ (b) in caput, stupor, aut delirium, malum.

Cap. Vuln. XV. 1.

(b) Celf. II. 7. pag. 64. l. 16.

15. A sanguinis sputo, puris sputum, malum.

II. Prædict. XIV. 1. 3.

16. 1) A puris sputo, tabes, & fluxus. 2) Postquam verò sputum (c) retinetur, moriuntur.

I. Morb. X. 17. 20.

XI. 40.

Viêt. Acut. VIII. 6. 7. 8.

(c) Celf. II. 8. pag. 72. l. 5.

17. Ab hepatis inflammatione (d) singultus, malum.

(d) Celf. II. 7. pag. 62. l. 3.

18. A vigiliâ convulsio, (e) aut delirium, malum.

ιθ'. Ἐπὶ ὅσας ψιλᾶσαι ἐρυσίπελας,
(κακόν.)

Cap. Vuln. XXVII. 4.

κ'. Ἐπὶ ἐρυσιπέλατι σηπεδῶν, ἢ ἐκπύη-
σις, (κακόν.)

κα'. Ἐπὶ ἰχυρῶ σφυγμῶ ἐν τοῖσιν ἔλκε-
σιν (a) αἰμορραγίῃ, (κακόν.)

(a) Cell. II. 7. pag. 64. l. 18.

κβ'. Ἐπὶ ὀδύνη πολυχρονίῃ τῶν περὶ τὴν
κοιλίην, ἐκπύησις, (κακόν.)

Aph. VII. 26.

κγ'. Ἐπὶ ἀκρήτῳ ὑποχωρήσει (b) δυσεν-
τερίῃ, (κακόν.)

Aph. VII. 6.

κδ'. Ἐπὶ ὅσας οἰακοπῇ παραφροσύνη, ἢ
κενεὸν λάβη.

κε'. Ἐκ φαρμακοποσίης σπασμὸς, ~~θα-~~
νατῶδες.

Vid. Aph. V. 1.

κς'. Ἐπὶ 1) ὀδύνη ἰχυρῇ τῶν περὶ τὴν κοι-
λίην, ἀκρωτηρίων (c) ψύξις, κακόν.

Aph. IV. 48.

VII. 1.

κζ'. Γυναι-

19. Ab offis denudatione erysipelas,
(malum.)

20. Ab erysipelate putredo, aut sup-
puratio, (malum.)

21. A forti pulsu in ulceribus, fan-
guinis (a) eruptio, (malum.)

22. A dolore diuturno partium cir-
ca ventrem, suppuratio, (malum.)

23. A meracâ dejectione (b) dyfen-
teria, (malum.)

(b) Celf. II. 7. pag. 64. l. 10.

24. Ab offe percisso delirium, si in
vacuum penetraverit.

25. A purgantis potione convulsio,
lethale.

26. A 1) dolore vehementi partium,
circa ventrem, extremarum (c) frigus,
malum.

1) Aph. VII. 22. (c) Celf. II. 8. p. 68. l. 14.

κζ'. Γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχέσῃ τεινεσμούς
ἐπιγενόμενῳ, ἐκτρώσai ποιέει.

I. Morb. Mul. XLII. 4.

κη'. Ο', τι ἂν ὀστέον, ἢ χόνδρῳ, ἢ νεῦρον
ἀποκοπῇ ἐν τῷ σώματι, ἕτε αὖξεται, ἕτε
ξυμφύεται.

Vid. Aph. VI. 19.

κθ'. Ἡ ὑπὸ λευκῇ φλέγματι ἐχομέ-
νω διάρροια (a) ἐπιγίηται ἰσχυρῇ, λύει τὴν
νῆσον.

Flat. XVIII. 8. 9. Coac. III. 285. 326.

Judicat. XI. 21. I. Morb. VI. 7.

λ'. Οἷοίσις ἀφρώδια τὰ διαχωρήματα
ἐν τῇσι διάρροίῃσι, 1) τετέοισιν ἀπὸ τῆς κεφα-
λῆς φλέγμα καταρρέει.

Morb. Sac. VII. 28. 1) Coac. V. 13. 14.

λά'. Οἷοίσις πυρέσσει 1) ἐν τοῖσιν ἕ-
ροισι κριμνώδεις αἱ ὑποσάσεις γίνονται,
μακρὴν τὴν ἀρρώσιν σημαίνουσιν.

1) Prænot. XI. 7. Coac. II. 199.

V. 12. 64. 65.

λβ'. Οἷοίσις ἢ χολώδεις αἱ (b) ὑποσά-
σεις, ἄνωθεν διὰ λεπτὰ, ὀξείην ἀρρώσιν
σημαίνει.

Coac. V. 6. 8.

I. Morb. XXVII. 28.

λγ'. Οἷο-

27. Mulieri in utero gerenti , tenesmus superveniens , abortire facit.

28. Quodcunque os , aut cartilago, aut nervus in corpore dissectus fuerit , neque augetur , neque coalescit.

29. Si à leucophlegmatiâ detento vehemens diarrhœa (a) superveniat , morbum solvit.

II. Morb. LXIX. 11. 12. (a) Celf. II. 8. p. 68.
Int. Affect. XXIII. 12. l. 14.

30. Quibus spumosæ egestionis in alvi profluviis , 1) his de capite pituita defluit.

31. Quibus febricitantibus, 1) in urinis subsidentiae fiunt crassiori farinae similes , longam infirmitatem significant.

32. Quibus autem biliosæ (b) subsidentiae , ab initio verò tenues , acutum morbum significat.

Viêt. Acut. LIV. 5.
(b) Celf. II. 5. pag. 53. l. 26.

33. Qui-

λγ'. Οκόσοισι δὲ 1) διεσηκότα τὰ ἔρα γίνεσθαι, τυτέοισι ταραχὴ ἰχυρὴ ἐν τῷ σώματι ἐστίν.

1) Coac. V. 15. 16. 76.

IV. Epid. VI. 14. 17.

λδ'. Οκόσοισι δὲ ἐπὶ τοῖσιν ἔροσιν ἐφίσανθαι (α) πομφόλυγες, νεφριτικὰ σημαίνουσι, καὶ μακρὴν τὴν ἀρρώσιν ἐσεσθαι.

(α) Celf. II. 5. p. 53. l. 29. II. 7. p. 60. l. 31.

λέ. Οκόσοισι δὲ λιπαρὴ ἢ ἐπίσασις καὶ αἰθρία, τυτέοισι νεφριτικὰ, καὶ ὀξεία σημαίνει.

Prænot XII. 1. 2. Coac. V. 43.

λς'. Οκόσοισι ᾧ, νεφριτικοῖσιν ἐῤσι, τὰ προειρημένα συμβαίνει σημεῖα, πόνοι τε περὶ τὰς μύας τὰς ῥαχιαίας γίνονται, ἢν μὲν περὶ τὰς ἐξω τόπους γένωνται, ἀπόστημα προσδεχῶν ἐσόμενον ἐξω ἢν δὲ μᾶλλον οἱ πόνοι πρὸς τὰς εἴσω τόπους γίνωνται, καὶ τὸ ἀπόστημα προσδεχῶν ἐσόμενον μᾶλλον εἴσω.

λζ'. Οκόσοι αἷμα (α) ἐμέουσιν, ἢν μὲν ἄνευ πυρετοῦ, σωτήριον εἰ ᾧ ξὺν (β) πυρετῷ, κακόν. Θεραπεύειν δὲ τοῖσι ψυκτικοῖσι, καὶ τοῖσι πυρετικοῖσι.

Aph. IV. 25.

Coac. III. 238. ad 243.

λή. Κα-

33. Quibus autem urinæ 1) distantes fiunt, iis vehemens est in corpore turbatio.

34. Quibus verò in urinis (a) bullæ superstant, renum affectiones significant, & longam fore invaletudinem.

35. Quibus autem pingue est & confertum quod supernatat, his *affectiones*, nephriticas, & acutas significat.

IV. Epid. VI. 12. 13.

36. Quibus verò nephriticis existentibus, prædicta signa accidunt, & dolores circa musculos spinales fiunt, si quidem ad loca exteriora fiunt, abscessum expecta futurum extrorsum. Si verò dolores fiant magis ad interna loca, etiam abscessum magis introrsum fore expecta.

37. Qui sanguinem (a) vomunt, si quidem sine febre, salutare: si verò cum (b) febre, malum. Curandum autem refrigerantibus, & adstringentibus.

(a) Cels. IV. 4. pag. 203. l. 13. & 22.

(b) Cels. II. 6. pag. 56. l. 15.

38. De-

λγ'. Κατάρροι ἐς τὴν ἄνω κοιλίην ἐκπυῖνται ἐν ἡμέρησιν εἴκοσιν.

Aph. VI. 20. Loc. in Hom. XVIII. 7.

λδ'. Ἦν ἐρέη αἷμα καὶ θρόμβος, καὶ τραχυερίην ἔχη, καὶ ὀδύνη ἐμπίπῃ ἐς τὸ περίναιον καὶ τὸ ὑπογάστριον, καὶ τὸν κτένα, τὰ περὶ τὴν κύστιν νοσέειν σημαίνει.

Vid. Aph. IV. 80.

μ'. Ἦν ἡ γλῶσσα ἐξκίφνης ἀκρατὴς γένηται, ἢ ἀπόπληκτόν τι τῷ σώματι, 1) μελαγχολικὸν τὸ τοιοῦτο γίνεται.

1) Aph. VI. 23. 57.

II. Prædict. XVI. 12.

μα'. Ἦν ὑπερκαθαυρομένων τῶν πρεσβυτέρων, λυγρὸ ἐπιγένηται, ἐκ ἀγαθού.

Vid. Aph. V. 4.

μβ'. Ἦν πυρετὸς μὴ ἀπὸ χολῆς ἔχη, ὕδατ' πολλὰ καὶ θερμὰ (a) καταχεομένον ἀπὸ τῆς κεφαλῆς, λύσεις τῷ πυρετῷ γίνεται.

(a) Cels. III. 14. p. 143. l. 26.

μγ'. Γυνὴ ἀμφιδέξι' εἶ γίνεται.

μδ'. Οἰκόσοι ἔμπυοι καίονται, ἢ τέμνονται, ἢ μὲν τὸ πύον καθαρόν ῥυῖ καὶ λευκὸν, περιγίγνονταί. 1) ἢν δὲ ὕφαιμον, καὶ

38. Destillationes in ventrem supernum, in viginti diebus suppurantur.

I. Morb. XI. 2. 3.

39. Si *quis* sanguinem & grumos mingat, & stranguriam habeat, & dolor incidat ad perinæum, & anum ventrem, & pectinem, *partes circa vesicam* laborare significat.

40. Si lingua ex improvise impotens fiat, aut aliqua corporis pars fiderata, 1) melancholicum hoc ipsum fit.

Coac. III. 87. 88. 315. 317.

41. Si senioribus nimium purgatis, singultus superveniat, non bonum.

42. Si febris, *quæ non est à bile*, detineat, (a) aquâ multâ, & calidâ in caput affusâ, febris solutio fit.

43. Mulier ambidextra non fit.

44. Qui suppurati uruntur, aut secantur, si quidem pus um effluat pus & album, evadunt. 1) Si verò subcruentum,
O tum,

καὶ βορβορώδεις , καὶ δυσῶδεις , 1) ἀπόλλυνται.

Aph. VI. 27.
VII. 45.

Prænot. VII. 6.
XIX. 4.

μέ. Ὅσοι τὸ ἥπαρ (a) διάπυον καίονται (ἢ τέμνονται) ἦν μὲν τὸ πύον καθαρόν ῥυῆ καὶ λευκόν , περιγίγνονται ἑν χιτῶνι γὰρ τὸ πύον τετέοισιν ἐστίν ἡ) ἦν δὲ οἶον ἀμύγγη (b) ῥυῆ , ἀπόλλυνται.

Aph. VII. 44.
Prænot. VII. 6.
1) Coac. III. 218. 274.

μς'. Οἰδύνας ὀφθαλμῶν , ἀκρητον ποτίσας , καὶ λάσας πολλῶ θερμῶ , φλεβοτόμει.

Vid. Aph. VI. 31.

μς'. Ὑδροπιῶντα ἦν (c) βῆξ ἔχη , ἀνέλπισός ἐστι.

Aph. VI. 35.
I. Prædict. XI. 1. 6.

μή. Στραγγερίην , καὶ δυσερίην θάουξας , καὶ φλεβοτομίῃ λύει. τάμνειν δὲ τὰς εἰσω (φλέβας.)

Aph. VI. 36.
II. Epid. VI. 39.

μθ'. Ὑπὸ κυνάγχης ἐχομένα οἴδημα καὶ ἐρύθη-

tum, & cænofum, ac graveolens, 1) pereunt.

II. Morb. XLV. 34. 35.

1) Coac. III. 217. 218. 269.

45. Qui *ad* hepar (a) suppuratum uruntur (aut fecantur,) si quidem purum effluat pus & album, superstites evadunt: ipsis enim pus est in tunicâ. 1) Si verò effluat velut (b) amurca, pereunt.

(a) Celf. II. 8. pag. 67. l. 3.

(b) Celf. II. 8. p. 71. l. 13.

46. In doloribus oculorum, postquam merum bibendum dederis, & multâ calidâ laveris, venam secato.

47. Hydropicum si (c) tussis habeat, desperatus est.

II. Epid. V. 28.

(c) Celf. II. 8. pag. 72. l. 25.

48. Urinæ stillicidium, & urinæ difficultatem vini potus, & venæ sectio solvit. Secundæ verò internæ (venæ.)

49. Ab anginâ detento tumor & rubor

ἐρύθημα ἐν τῷ σήθει ἐπιγενόμενον , ἀγαθόν.
ἔξω γὰρ τρέπεται τὸ νέσσημα.

Vid. Aph. VI. 37.

Prænot. VII. 3.

XXIII. 14.

ν'. Οὐόσοισιν ἂν 1) σφακελιθῇ ὁ ἐγκέ-
φαλ⊕ , ἐν τρισὶν ἡμέρησιν ἀπόλλυνται· ἢ
διὰ ταύτας διαφύγωσιν , ὑγιέες γίνονται.

Coac. II. 53.

II. Morb. V. 2. 21.

XX. 2. 8. 9. 10.

να'. 1) Πταρμός γίνεται ἐκ τῆς κεφαλῆς ,
διαθερμαινομένῃ τῇ ἐγκεφάλῳ , ἢ διυγραι-
νομένῃ τῇ ἐν τῇ κεφαλῇ κενῷ. ὑπερχεῖται,
γὰρ ὁ αἷρ ὁ ἐνέων ἔξω. 2) Ψοφεῖ διὰ , ὅτι
διὰ σενῷ ἢ διέξοδ⊕ αὐτῷ ἐσίν.

1) Prænot. XIII. 11.

2) Princip. & Car. XIX. 1. ad 4.

νβ'. Οὐόσοισιν ἥπαρ περιωδυνᾶται , τε-
τέοισι πυρετὸς ἐπιγενόμεν⊕ λύει τὴν ὀδύ-
νην.

Aph. VI. 40.

Coac. III. 272.

νγ'. Οὐόσοισι ζυμφέρει αἷμα ἀφαιρεῖ-
σθαι ἀπὸ τῶν φλεβῶν , τετέως χρὴ ἤρ⊕
φλεβοτομεῖσθαι.

Aph. VI. 47.

νδ'. Οὐό-

bor in pectore superveniens , bonum :
foràs enim vertitur morbus.

Coac. II. 221.

III. 97. 102.

II. Morb. XXVI. 26.

XXVII. 14.

50. Quibus cerebrum 1) sphacelo fuerit affectum , in tribus diebus per-eunt : si verò hoc effugerint , sani fiunt.

1) VII. Epid. XXX. 7.

51. 1) Sternutatio fit ex capite, per-calefacto cerebro, aut perhumectato, *quod est* in capite, vacuo. Aër enim qui intus est supra modum (i. e. *vi*) foràs effunditur. 2) Strepit autem , quia per angustum ipsi est transitus.

52. Quibus hepar circumcirca do-let , his febris superveniens dolorem solvit.

53. Quibus sanguinem de venis au-ferre conducit , his vere venam secare oportet.

νδ'. Οκόσοισι μεταξὺ τῶν φρενῶν καὶ τῆς γαστρὸς φλέγμα ἀποκλείεται, καὶ ὀδύνην παρέχει, ἧκ' ἔχον διέξοδον εἰς ὑδετέρην τῶν κοιλιῶν, τετέοισι κατὰ τὰς φλέβας εἰς τὴν κύσιν τραπέν[ι] τῷ φλέγματι, λύσις γίνεται τῆς νόσου.

νε'. Οκόσοισιν ἂν τὸ ἥπαρ ὑδαί[ι] πληθύνῃ εἰς τὸ ἐπίπλοον ῥαγῇ, τετέοισιν ἡ κοιλίη ὑδαί[ι] ἐμπιπλάται, καὶ ἀποθνήσκουσιν.

Prænot. VIII. 6.

Coac. III. 276. 278.

νς'. Ἀλύκην, χάσμεν, φρίκην, I) οἶν[ι] ἴσος ἴσῳ πινόμεν[ι], λύει (τὴν νόσον.)

II. Epid. VI. 45.

1) II. Morb. XXXVIII. 6.

νζ'. Οκόσοισιν ἐν τῇ ἐρήθρῃ φῦμα (α) γίνεται, τετέοισι διαπυήσαν[ι] καὶ ἐκτραγέν[ι], λύεται ὁ πόν[ος].

Vid. Aph. IV. 82.

νή'. Οκόσοισι οἷ' ἂν ὁ ἐγκέφαλος σειοῖ[το] ὑπὸ τιν[ι] προφάσι[ι], ἀνάγκη ἀφάνεος γενέσθαι παρὰ χρεῖμα.

Coac. III. 370.

I. Morb. III. 34.

(Ἦν ὑπὸ πυρετῷ ἐχομένῳ ὁ τρέαχηλος ἐπιστραφῇ, καὶ καταπίνειν μὴ δύνηται, οἰδήματος

54. Quibus inter septum transversum, & ventrem pituita excluditur, & dolorem exhibet, in neutrum ventrem habens transitum, his per venas in vesicam pituitâ versâ, morbi solutio fit.

55. Quibus hepar aquâ repletum ad omentum eruperit, his venter aquâ impletur, & moriuntur.

Affectiō. XXIII. 3. ad 10.

Int. Affect. XXVI. 2.

56. Anxietatem, oscitationem, horrorem, 1) vinum par pari aquâ potum, solvit (morbum.)

Int. Affect. V. 14.

II. Morb. Mul. LXXXVIII. 2.

57. Quibus in urinariâ fistulâ tuberculum (a) fit, his suppurato eo & perrupto, solvitur dolor.

(a) Cels. II. 8. pag. 70. l. 22.

58. Quibus cerebrum concussū fuerit ab aliquâ causâ, necesse est eos statim mutos fieri.

(Si à febre detento collum invertatur, & deglutire non possit, tumore

ματ^Θ καὶ ἐόντ^Θ ἐν τῷ τραχήλῳ , θανά-
σιμον·)

Vid. Aph. IV. 35.

νθ'. Τοῖσι σώμασι τοῖσιν ὑγρὰς τὰς σάρ-
κας ἔχουσι, δεῖ λιμὸν ἐμποιέειν · 1) λιμὸς
γὰρ ξηραίνει τὰ σώματα.

Aph. II. 21.

IV. 13. 41.

VII. 50.

1) II. Diæt. XXXVIII. 1. 2.

III. Diæt. XVI. 12. 14.

ξ'. Ὅκως ἂν ἐν ὅλῳ τῷ σώματι μεταβο-
λαί, καὶ τὸ σῶμα καταψύχεται, καὶ πάλιν
θερμαίνεται, ἢ χροῖμα ἕτερον ἐξ ἑτέρου με-
ταβάλλῃ, μῆκ^Θ νέου σημαίνει.

Vid. Aph. IV. 40.

I. Prædict. II. 4.

IV. 2.

VII. 12.

X. 2.

ξκ'. 1) Γδρὸς πολλὸς, θερμὸς ἢ ψυχρὸς,
ρέων αἰεὶ, σημαίνει 2) ἔχει πληττοντὴν ὑγρῶ.
3) ἀπάγειν ἐν χειρὶ, τῷ μὲν ἰχυρῶ, ἀνωθεν·
τῷ δὲ αἰσθεῖ, κάτωθεν.

1) Aph. IV. 41. 42.

2) Aph. IV. 56.

ξβ'. Οἱ πυρετοὶ οἱ μὴ διαλείποντες, καὶ
ἰχυρότεροι διὰ τρίτης γένωνται, ἐπικίνδυ-
νοι ὅτῳ δὲ ἂν τρόπῳ διαλείπωσι, σημαί-
νει, ὅτι ἀκίνδυνοι.

Vid. Aph. IV. 43.

ξγ'.

non existente in collo , lethale.)

59. Corporibus humiditas carnes habentibus , famem inducere oportet :

1) fames enim siccat corpora.

II. Prædict. VIII. 8. 13.

Insomn. XV. 14. 15.

Affectio. XXVIII. 2.

XLI. 7. 8. 11. 12.

60. Ubi in toto corpore mutationes , & corpus perfrigeretur , & rursus calefiat , aut calor alius ex alio permute-
tur , longitudinem morbi significat.

Coac. V. 6. 78.

VI. 85.

Viêt. Acut. XLVI. 4. 5.

61. 1) Sudor multus, calidus aut frigidus, semper fluens, 2) humidi redundantiam habere significat. 3) Educere igitur oportet , robusto quidem , supernè : debili verò , infernè.

3) Aph. I. 21.

62. Febres non intermittentes , si per tertiam vehementiores fiant , periculosa. Quocunque autem modo intermittant , significat , periculi esse expertes.

63. Qui.

ξγ'. Οκόσοισι πυρετοὶ μακροὶ, τετέοισιν
 ἢ φύματα, ἢ ἐς τὰ ἄεθρα πόνοι ἐγγίγνονται.
 Vid. Aph. IV. 44.

ξδ'. Οκόσοισι φύματα μακρὰ, ἢ ἐς τὰ
 ἄεθρα πόνοι ἐκ πυρετῶν γίγνονται, ἔτοι σι-
 τιοῖσι πλείοσι χερόνται.
 Vid. Aph. IV. 45.

ξε'. Ἦν τις τῷ πυρέσσοντι τροφὴν διδῷ,
 τῷ μὲν ὑγιαίνειν, ἰχὺς· τῷ δὲ κάμνοντι,
 νῆσθαι.

Aph. II. 10.
 VII. 67.

ξς'. Τὰ διὰ τῆς κύστις διαχωρόντα ὁρᾶν
 δεῖ, εἰ οἷα τοῖς ὑγιαίνουσιν ὑποχωρέειν. τὰ
 ἥκιστα ἐν ὁμοίᾳ τετέοισι, ταῦτα νοσῶδες-
 ρα. τὰ δὲ ὁμοίᾳ τοῖσιν ὑγιαίνουσιν, ἥκιστα
 νοσερά.

VI. Epid. VIII. 29. 30.

ξζ'. Καὶ οἷσι τὰ 1) ὑποχωρήματα, ἢν
 εἰσῆς εἶναι καὶ μὴ κινήσης, 2) ὑφισταίαι οἷον
 ξίσματα· καὶ ἢν ὀλίγα ἢ, ὀλίγη ἢ νῆσθαι γί-
 γνέται· ἢν δὲ πολλά, πολλή. τετέοισι ξυμφέ-
 ρει ὑποκαθῆραι τὴν κοιλίην. 3) ἢν δὲ μὴ κα-
 θαρὴν ποιήσας διδῶς τὰ ροφήματα, ὁκόσω
 ἂν πλείω διδῶς, μᾶλλον βλάβεις.

- 1) Judicat. VIII. 10. 11.
- 2) Prænot. X. 8.
 Coac. VI. 85.

ξη'. Οκό-

63. Quibus febres longæ sunt, his aut tubercula, aut ad articulos dolores fiunt.

64. Quibus tubercula diutina, aut ad articulos dolores ex febribus fiunt, hi cibis utuntur copiosioribus.

65. Si quis febricitanti cibum det, convalescenti quidem, robur: ægro-
tanti verò, morbus *fit*.

Vet. Medic. XII. 11.

66. Per vesicam prodeuntia inspicere oportet, an *sint* qualia sanis prodeunt. Quæ igitur minimè his similia, ea morbosiora. Sanis verò similia, minimè morbosa.

67. Et quibus 1) egestionem, si stare permiseris, & non moveris, 2) subsident veluti ramenta: & si pauca fuerint, parvus fit morbus: si verò multa, magnus. His confert alvum infernè purgari. 3) Si autem non purgatâ alvo sorbitiones dederis, quantò plures dederis, *eo* magis lædes.

IV. Epid. VI. 10. 3) Aph. II. 10.

VII. 65.

68. Quæ

ξί. Οκόσα ἂν κάτω ὤμα διαχωρέη, ἀπὸ
 χολῆς μελαίνης ἔσιν· ἢν πλείω, πλείων· ἢν
 ἐλάττω, ἐλάστων ἢ νῆσος.

Aph. I. 22.

Judicat. VIII. 12.

ξθ'. Αἱ ἀποχρέμψιες, αἱ ἐν τοῖσι πυρε-
 τοῖσι τοῖσι μὴ διαλείψουσιν, αἱ πελιδναί,
 καὶ αἱματώδεις, καὶ χολώδεις, καὶ δυσώδεις,
 πᾶσαι κακαί. ἀποχωρέεσθαι δὲ καλῶς,
 ἀγυθαί· καὶ κατὰ κοιλίην, καὶ κύσιν, καὶ
 ὅκῃ ἂν τι ἀποχωρέον· εἴ μὴ κεκαταρμένον,
 κακόν.

Vid. Aph. IV. 47.

ο'. Τὰ σώματα χρεῖ, ὅκῃ τις βέλεται
 (a) καθαίρεσθαι, εὖροα ποίεσιν, καὶ μὲν ἄνω
 βέλεται εὖροα ποίεσιν, εἴησαι τὴν κοιλίην·
 ἢν δὲ κάτω, ὑγρῆναι.

Vid. Aph. II. 9.

IV. 13.

1) II. Diæt. XXXVI. 18. ad 23.

οα'. Ὑπνῶ, ἀγρυπνίη, ἀμφοτέρω μᾶλλον
 τῷ μετρίῳ γιγνώμενα, νῆσῳ.

Vid. Aph. II. 3.

οβ'. Ἐν τοῖσι μὴ διαλείψουσιν πυρετοῖσιν,
 ἢν τὰ μὲν ἔξω (b) ψυχρὰ ἢ, τὰ δὲ ἔσω
 καίηται, καὶ δίψαν ἔχη, θανάσιμον.

Vid. Aph. IV. 48.

ογ'. Εἰ

68. Quæ cruda deorsum secedunt, ab atrâ sunt bile: si plura, major: si pauciora, minor *est* morbus.

69. Exscreationes, in febribus non intermittentibus, lividæ, & cruentæ, & biliosæ, & graveolentes, omnes malæ *sunt*. At ritè secedentes, bonæ. Sic etiam per alvum, & vesicam, & ubicunque quid secedens restiterit non purgatum, malum.

70. Corpora oportet, ubi quis (a) purgare vult, facilè fluentia reddere. 1) Et si quidem velit efficere facilè fluentia sursum, alvum sistere: si verò deorsum, humectare.

(a) Cels. III. 18. pag. 154. l. 33.

71. Somnus, vigilia, utraque modum excedentia, morbus.

72. In non intermittentibus febribus, si externa quidem (b) sint frigida, interna verò urantur, & sitim habeant, lethale.

(b) Cels. II. 6. p. 55. l. 21.

οζ'. Ἐν μὴ διαλείποντι πυρετῷ, ἢν χεῖ-
 λ[Ⓢ], ἢ ῥίς, 1) ἢ ὀφθαλμοῖς, ἢ ὀφρὺς δια-
 σραφῇ, ἢν μὴ βλέπῃ, ἢν μὴ ἀκέῃ ἤδη
 αἰσθενῆς εἶναι, ὅ, τι αὖν τετέων γένηται, θα-
 νάσιμον.

Vid. Aph. IV. 49.

I. Prædict. X. 7.

οδ'. Ἐπὶ λευκῷ φλέγματι ὕδρωψ ἐπι-
 γίγνεται.

I. Morb. III. 28.

Affection. XX. 13.

XXIII. 3.

οε'. Ἐπὶ διαρροίῃ (α) δυσεντερίῃ.

(α) Cels. II. 7. pag. 64. l. 10.

ος'. Ἐπὶ δυσεντερίῃ (α) λειεντερίῃ (ἐπι-
 γίνεσθαι).

Aph. VI. 43.

Coac. II. 296.

οζ'. Ἐπὶ σφακελισμῷ ἀπόσασις ὀσέα.

οή. Ἐπὶ αἱμαλ[Ⓢ] ἐμέτῳ φθόῃ, καὶ τῷ

(α) πύρ καὶ θάλασσις ἄνω.

Aph. VII. 15. 16.

II. Prædict. XIV. 1. 3.

(Ἐπὶ φθόῃ ῥεῦμα ἐκ τῆς κεφαλῆς. ἐπὶ τῷ
 ῥεύματι διάρροια. ἐπὶ διάρροίῃ χέσις τῆς ἀνώ
 κατάρσι[Ⓢ]. ἐπὶ τῇ χέσει θάναλ[Ⓢ].)

Vid. Aph. V. 12. 14. II. Prædict. XII. 3.

(Ἐπὶ

73. In febre non intermittente, si labium, aut nasus, 1) aut oculus, aut supercilium distorqueatur, si non videat, si non audiat jam debilis existens: quicquid horum fiat, lethale.

1) Coac. II. 117. 128.

74. Leucophlegmatiae hydrops supervenit.

Int. Affectio. XXIV. 1.

75. Ab alvi profluvio, (a) dysenteria.

76. A dysenteria, (a) intestinorum laevitas (supervenit.)

I. Morb. III. 26.

(a) Cels. IV. 16. pag. 226. l. 14.

77. A sphacelo abscessus ossis.

78. A sanguinis vomitu tabes, & puris (a) purgatio sursum.

I. Morb. X. 69.

XIX. 4. ad XX.

(a) Cels. IV. 4. pag. 203. l. 5.

(A tabe, fluxus ex capite. A fluxu, alvi profluvium. Ab alvi profluvio, inhibitio purgationis sursum. Ab inhibitione, mors.)

Coac. III. 259.

(Ἐπὶ αἵματι πτύσει, πύς πτύσις, καὶ ῥύσις. ἐπὴν δὲ σάλον ἴχεται, ἀποθνήσκουσιν.)

Vid. Aph. VII. 15. 16.

οθ'. Ὅκοῖα καὶ ἐν τοῖσι κατὰ τὴν κύσιν, καὶ ἐν τοῖσι κατὰ τὴν κοιλίην ὑποχωρήμασι, 1) καὶ ἐν τοῖσι κατὰ τὰς σάρκας, καὶ ἢν πρὸ ἄλλῃ τῆς φύσις ἐκβαίῃ τὸ σῶμα ἢν ὀλίγον, ὀλίγη ἢ νῆσθαι γίνεσθαι ἢν ᾗ πολὺ, πολλή. ἢν πάνυ πολὺ, θανάσιμον τοιοῦτον.

Prænot. II. 1. &c.

XV. 10. 11.

Multi L. B. Sectionem Octavam omittunt.

Plurimi sex ejus priores adjiciunt Aphorismos. Alii Sectionem totam addunt, ut hîc factum vides. Nam quæ spuria tibi videntur, in lectione præteriri facile possunt.

Α' Φ Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι'

Παρεμβλημένοι.

Τμήμα ὀγδοον.

Α'.

Ὅκοσοι 1) ὑπὲρ τὰ τεσσαράκοντα ἔτεα φρενιτικοὶ γίνονται, ἢ πάνυ τοι ὑγιαίνουν. 2) ἥσσον γὰρ κινδυνεύουσιν, οἷσιν ἂν οἰκείῃ τῆς φύσις, καὶ τῆς ἡλικίης, ἢ νῆσθαι ἢ.

1) Aph. II. 39. 40.

VI. 6.

β'. Ὅκο-

(A sanguinis sputo, puris sputum, & fluxio. Postquam autem sputum inhibetur, moriuntur.)

79. Qualia etiam in his quæ per vesicam, & in his quæ per alvum *fiunt* egestionibus, 1) & in his quæ per carnes, & sicubi aliâ naturæ *viâ* corpus exeat: si parum, parvus morbus fit: si multum, magnus: si admodum multum, hoc ipsum lethale.

1) Aph. VIII. 18. Infomn. IV. 16.
Aliment. VI. 1. ad 8. VI. Epid. VI. 2.

A P H O R I S M I

interjecti.

Sectio Octava.

I.

Qui 1) supra quadraginta annos phrenitici fiunt, non admodum sanantur. 2) Minus enim periclitantur, quorum naturæ, & ætati, morbus similis fuerit.

2) Vid. Aph. II. 34.

P 3

2. Qui-

β'. Οκόσοισιν ἐν τῇσιν ἀρρώσίσιν οἱ ὀφθαλμοὶ κατὰ προαίρεσιν (α) δακρύουσιν, ἀγαθόν. ὁκόσοισι δὲ ἄνευ προαιρέσεως, κακόν.

Vid. Aph. IV. 52.

γ'. Οκόσοισιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσι τεταρταίοισιν ἔσιν αἷμα ἐκ τῶν ῥινῶν ῥυῖ, πονηρόν.

Judicat. X. 7.

I. Prædict. I. 2.

δ'. Ἰδρῶτες ἐν τῇσι κρισίμοισιν ἡμέρησι γιγνώμενοι σφοδροὶ καὶ ταχείες, ἐπικίνδυνοί· 1) καὶ οἱ ὠθέμενοι ἐκ τῆς μετώπης, ὥσπερ σαλαγμοὶ καὶ κρηνοὶ, καὶ ψυχροὶ σφύδρα, καὶ πολλοί. ἀνάγκη γὰρ τὸν τοιῆστον ἰδρῶτα πορεύεσθαι μετὰ βίης, καὶ πόνου ὑπερβολῆς, καὶ ἐκθλίψεως πολυχρονίας.

1) Judicat. VI. 9.

Prænot. V. 4. 8.

I. Prædict. V. 7.

ε'. Ἐπὶ χρονίῳ νεσθήματι κοιλίης καταφορά, κακόν.

ς'. Οκόσα φάρμακα ἐκ ἰῆται, σίδηρος ἰῆται. ὅσα σίδηρος ἐκ ἰῆται, πῦρ ἰῆται. ὅσα δὲ πῦρ ἐκ ἰῆται, ταῦτα καὶ νομίζειν ἀνίατα.

Arte. XIII. 12. ad 18.

ζ'. Φθί-

2. Quibus , in infirmitatibus oculi ex proposito (i. e. *ob causam*) (a) lachrymantur ; bonum. Quibus verò sine causâ , malum.

(a) Celf. IV. pag. 51. l. 14.

3. Quibus in febribus quartanis existentibus sanguis ex naribus fluxerit, malum.

Coac. II. 37. 38. VI. Epid. II. 40.
III. 433.

4. Sudores in diebus criticis oborientes , vehementes & veloces , periculosi : 1) & qui expelluntur ex fronte , velut guttæ , & aquæ salientes , & frigidi valdè , ac multi. Neceſſe enim *est* talem sudorem prodire cum violentiâ , & laboris excessu , & expressione diuturnâ.

Coac. III. 91.

IV. 38. 39.

Viçt. Acut. LIII. 8. 9.

5. Ex morbo diuturno alvi defluxus , malum.

6. Quæ medicamenta non fanant , *ea* ferrum fanat. Quæ ferrum non fanat , *ea* ignis fanat. Quæ verò ignis non fanat , *ea* insanabilia existimare oportet.

ζ'. Φθίσιες μάλιστα γίνονται ἀπὸ ὀκτω-
καίδεκα ἐτῶν, μέχρι τριήκοντα καὶ πέντε.

Vid. Aph. V. 9.

ή. 1) Τὰ δὲ κατὰ φύσιν γιγνόμενα κατὰ
Φθίσιν, πάντα μὲν ἰχυρὰ, τὰ δὲ καὶ θανα-
τάδεα. 2) δεύτερον δὲ, ἣν μὲν ἐν τῇ ἄρῃ νο-
σέη, αὐτὴ ἡ ἄρῃ ξημεκαχεῖ τῇ νέσῳ, οἷον
καύσῳ θερμῷ, ὑδρωπικῷ χειμῶν· ὑπερνικῶ
γὰρ τὸ φυτικόν· (α) φοβερώτερον δὲ σωληνί.

1) I. Morb. XX. 1. 2. 3.

2) Aph. III. 3.

II. 34.

VIII. 1.

θ'. Γλῶσσα μέλαινα καὶ αἱματώδης, εἴ-
τι τῶν τοιούτων σημείων ἄπεσι, μὴ σφόδρα
κακόν· δηλοῖ γὰρ νέστον σρικροτέρην.

Coac. II. 140. 148.

ι'. Ταῦτα μὲν ἐν ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν ὀξέσι
σημειῖσθαι χρὴ, ὅποτε μέλλει ἀποθνήσκειν,
καὶ ὅποτε σωθῆσθαι.

Prænot. II.

III.

IV.

ια'. Ὄρχις δεξιὸς ψυχρὸς καὶ σπασμώ-
δης, θανατάδεα

Prænot. VIII. 20.

Coac. III. 352.

ιβ'. Ὄνυχες μέλανες, (α) καὶ οἱ δάκτυ-
λοι

7. Tabes maximè fiunt ab anno octavo decimo usque ad quintum & tricesimum.

8. 1) Quæ secundum naturam ad tabem disposita *sunt*, omnia quidem vehementia: quædam verò etiam lethalia. 2) Secundum autem, si quidem in eo tempore ægrotet, *cum* tempus ipsum unà cum morbo impugnat, velut cum febre ardente æstas, cum hydrope hyems. Natura enim longè superior est: lieni verò (a) plus affert timoris.

Dieb. Judicator. I. 11. ad 15.

VI. Epid. VIII. 45.

Affectio. VII. 3. 4.

(a) Cels. II. 8. pag. 70. l. 27.

9. Lingua nigra atque cruenta, si quid horum signorum abest, non valdè malum: morbum enim minorem declarat.

10. Hæc igitur in febribus acutis notare oportet, quando *quis* moriturus sit, & quando evasurus.

11. Testis dexter frigidus & convulsus, lethale.

12. Ungues nigri, (a) & digiti manuum

λοι τῶν χειρῶν καὶ ποδῶν ψυχροὶ, ξυνεσταλμένοι ἢ καθειμένοι, ἐγγὺς τὸν θάνατον εἰσὶ λῆσσι.

Prænot. VIII. 15.

XV. 9.

ιγ'. Τὰ χεῖλη πελιδνὰ, ἢ καὶ ἀπολελυμένα, καὶ ἐξεσραμμένα, καὶ ψυχρὰ, θανατάδεα.

Coac. I. 97.

III. 4.

ιδ'. Τὰ ὦτα ψυχρὰ, διαφανέα, ξυνεσταλμένα, θανατάδεα εἴσι.

Prænot. II. 9.

Coac. II. 67. 108.

ιε'. Καὶ σκοτοδινιῶν, Ι) καὶ ἀποσρεφόμενῳ, καὶ ὕπνῳ καὶ καύματι πολλῷ κατεχόμενῳ, ἀνέλπιστον.

Prænot II. 18. 19.

Ι) Coac. II. 117.

ισ'. Καὶ λισσάων ἀτρέμα, καὶ ἀγνοέων, καὶ μηδὲ ἀκέων, μηδὲ ξυνιείς, θανατάδης.

Coac. III. 327.

ιζ'. Μέλλουσιν ἀποθνήσκειν ταῦτα σαφέστερα γίνεται, καὶ αἱ κελίαι ἐπαίρονται, καὶ φουσῶνται.

ιη'. Ὅρῳ ἢ τῷ θανάτῳ, εἰὰν τὸ τῆς ψυχῆς δεξιὴν ἐπαιέλθῃ ὑπὲρ τῷ ὀμφαλῷ εἰς τὸν

num & pedum frigidi, contracti vel remissi, mortem in propinquo *esse* ostendunt.

Coac. III. 349.

(a) Celf. II. 6. p.55. l. 4. II.7.p.66. l.13.

13. Labia livida, aut etiam resoluta & inversa, & frigida, lethalia.

14. Aures frigidaë, pellucidaë, contractaë, lethales sunt.

15. Et tenebricosa vertigine laborans, & *lucem* averfans, & somno ac ardore multo detentus, desperatus.

16. Et qui in rabiem actus fuit intrepidè, & non agnoscit, & neque audit, neque intelligit, *jam* moribundus *est*.

17. Morituris *signa* hæc magis fiunt manifesta, & ventres attolluntur, atque inflantur.

18. Terminus verò mortis *est*, si animæ calor supra umbilicum ad locum
cum

τὸν ἄνω τῶν φρενῶν τόπον, 1) καὶ συγκαυθῇ τὸ ὑγρὸν ἅπαν, ἐπειδὴν ὁ πλεύμων καὶ ἡ καρδιά τὴν ἱκμάδα ἀποβάλλωσι, τῷ θερμῷ ἀθροῦν ἐν τοῖσι θανατώδεσι τόποις, ἀποπνέει ἀθρόον τὸ πνεῦμα τῷ θερμῷ, ὅθεν πέρ ξυνέστη τὸ ὅλον εἰς τὸ ὅλον. 2) πάλιν τὸ μὲν διὰ τῶν σαρκῶν, τὸ δὲ διὰ τῶν ἐν κεφαλῇ ἀναπνοῶν, ὅθεν τὸ ζῆν καλεῖται, ἀπολείπεται ἡ ψυχὴ τὸ τῷ σώματος σκῆν, καὶ τὸ ψυχρὸν, καὶ τὸ θνητὸν εἶδωλον, αἷμα καὶ χολή, καὶ αἷματι, καὶ φλέγματι, καὶ σαρκί, παρέδωκεν.

1) I. Morb. XXX. 12. ad 16.

2) Vid. Aph. VII. 79.

Τ Ε Λ Ο Σ.

ADDENDA.

Sect. I.

Aphor. I. (a) a Ben Syræ apud Philippum Caroli. Animadversion. in Agell. L. I. c. 2. Animadv. 2.

Aphor. 3. (a) Anthologri I. c. 83. 1.

Aphor. 6. (a) I. Sarisberienfis de Nug. Cur. IV. 8.

Aphor. 6. (a) Aretæus de curat. Acutor. I. 4. pag. 155.

cum septo transverso superiorem ascenderit, 1) & omne humidum fuerit combustum. Postquam pulmo & cor humorem amiserint, calore in mortiferis locis coacervato, caloris spiritus confertim exhalat, unde totum cum toto constitit. 2) Rursus partim quidem per carnes, partim verò per spiracula in capite, unde vivere dicimus, relinquens anima corporis tabernaculum, & frigidum, & mortale simulacrum, unà cum bile, & sanguine, & pituità, & carne, deditione tradit.

Aliment. VI. 1. ad 8.

F I N I S.

A D D E N D A.

Seçt. II.

Aphor. 4. (a) I. Sarisberienfis de Nug. IV. 9.
Nilus Episcopus & Martyr. in Parænes. pag. 44.

Aphor. 42. (a) Aretæus de Diuturn. Affectionibus. 1. 7. & de Curat. Acutor. I. 4.

Q LUC.

LUC. VERHOOFD
P R Æ F A T I O
A D
I N D I C E M.

Sisto tibi L. B. Indicem, qui (ut verum fatear) in meum factus est usus. Sed cum is jam aliis etiam conceditur, quid querentem monere velim, verbo dicam.

Ordo ejus est cum litterarum idem. Prout querendum cæperit à littera, in eâdem illud videri debet. Quicquid eundem affectum concernit, in summum colligi Caput, ut uno intuitu omnia videantur. Methodo ad Praxin directâ disposui.

Primò Affectum pono. Deinde Anni Tempus, in quo accidit. Mox Ætatem cui est familiaris. Inde ad signa progredior. Hinc Causas adscribo, simul cum aliis affectibus, unde originem trahit. Deinceps descendo ad Prognosin, bonam, vel malam. Tum Dietam præscribo. Postea Curam subjungo, sub quâ Purgationem quandoque simul præcipio. Tandem Crisin sive Solutionem quomodo ea fiat, annexo. Denique quibus superveniens morbis, eosdem Solvat,

P R Æ F A T I O.

vat, refero. . Ultimò Species Varias (in quibus tractandis eadem iterum servatur methodus) addo. Et si quæ supra hæc occurrant, adjicio.

Verum de omni affectu hæc singula conjungere, volumen breve vetat.

Jam si quid in Indice omisissum putes, in alio id quære Capite, & fortassè non frustra feceris. Si tamen idem pluribus notetur in locis, quæso, ne id offendat. Tui enim gratiâ id repetitum est: atque decies redundare, quam semel deficere malo sciens. Ordinis rationem quia brevis esse cogor, non reddo. Fruere, fave, vale.

Καὶ πὸν γινῶσθαι.

Ὁ ξὺς γάρ.

Aph. I. 1.

I N D E X.

ABDOMEN.

Craffi & tenuis prog. II.

35.

ABORTUS.

Tempus. III. II.

Futuri signa à mammis. V. 37.

38. 53.

Causa V. S. V. 31.

Diarrhæa. V. 34.

Tenesmus. VII.

27.

Uteri mucus. V.

45.

Macies p. n. V. 44.

Extenuatio in febre. V. 55.

ABSCCESSUS.

Futuri sign. in feb.

IV. 31.

In morb. diuturno. IV. 32.

Solutio. IV. 74.

Longi sign. IV. 51.

In articulis unde post feb. IV. 31.

Prævertitur. IV.

74.

In nephriticis sign.

VII. 36.

Abcess. ossis in ulcere diuturno.

VI. 45.

A sphacelo. VII.

77.

ÆTAS.

Temperamentum. I.

14. 15.

Progn. II. 34. 45.

III. 24. VIII.

I.

Diæta. I. 13. 14.

15. 16.

Cautio in diæta. I.

17. III. 3.

In aliis. I. 2.

Nuper natus.

Morbi. III. 24.

Dentiens.

Morbi. III. 25.

Morbor. crisis. III.

28.

Puer.

Ver & æstas conveniunt. III. 18.

Fames. I. 13. 14.

Morbi. III. 27.

Non laborat podagrâ. VI. 30.

Morbor. progn. II.

39. III.

28.

Diæta. I. 16.

Puber.

Ver & æstas conducunt. III. 18.

Morbi. III. 27.

Mor-

INDEX. A.

Morbos. progn. III.
28.

Adolescens.

Fames. I. 13.

Alvi prog. II. 20.
53.

Morbi. III. 29.

Morbos. progn. II.
45. V. 7.

Vir.

Autumno & hyeme
valet. III. 18.

Fames. I. 13.

Morbi. III. 30.
VI. 57.

Senex.

Temperamentum. I.
14.

Æstate valet. III.
18.

Fames. I. 13.
14.

Alvus. II. 20.
53.

Morbi. I. 14. III.
31.

Progn. II. 39. 40.
49. III.
12. VI. 6.
VIII. 1.

ALPHI. *Tempus.*
III. 20.

ALVI EXCRE-
MENTA,
egestiones.

Χωρέον. I. 23.

Ἀποχωρέον. VII.
69.

Διαχώρημα. IV. 28.
VII. 30.

Διαχώρησις. II. 18.
IV. 47. V. 64.

Υποχωρέον. IV. 25.
26.

Υποχώρημα. I. 12.
IV. 21. VII.
76. 79.

Υποχώρησις. IV.
83. V. 64. VII.
6. 23.

Ἐκκρισις. II. 15.

Ἐπελθόν. IV. 22.

Υπελθόν. IV. 23.

Progn. I. 12. VII.
79.

In feb. continuâ.
IV. 47. VII.
69.

Diet in fanis. II.
15.

In biliosis. II.
15. V. 64.

Bilioforum solutio.
IV. 28.

Ab atrâ bile lethali. IV. 22.
23. 24.

Nigror. progn. IV.
21.

A purgante. IV. 21.

Q 3 San-

I N D E X. A.

- Sanguis niger, bonus.* IV. 25.
Lethalis. IV. 23.
Spumosa unde. VII. 30.
Sincera. *Progn.* VII. 23.
In morbo. diuturn. VII. 6.
Celeria unde. II. 18.
Pauca ubi. IV. 83.
Carunculæ, malæ. IV. 26.
Ramentorum prog. VII. 67.
ALVI FLUXUS.
Διάρροια. III. 21. 25. 30. V. 12. 14. VI. 15. 16. 17. 32. VII. 29. 30. 75. 78.
Ῥέσις II. 14. III. 16.
Ῥεῖν. V. 34.
Ταραχή I. 2. IV. 60.
Καταφορά. VIII. 5.
Υγρότης. III. 31.
Tempus. III. 16. 21.
Ætas. III. 25. 31.
A fluxione capitis. VII. 78.
- Progn.* II. 14. VII. 75.
Malus. V. 34. VI. 16. VIII. 5.
Lethalis. V. 12. 14.
Solutio. VI. 15.
Morbum solvit. IV. 60. VI. 17. VII. 29.
Spontanei progn. I. 2.
Spumofus à capite VII. 30.
Longo obnoxii. II. 30. VI. 32.
Ætas. III. 30.
ALVI MUTATIO
naturalis. II. 20. 53.
ALVUS HUMIDA, SICCA.
Tempus. III. 5. 17.
Progn. II. 20. 53.
Humidæ ætas. III. 31.
Ubi fiat. IV. 27. 73.
ANGINA.
Tempus. III. 16. 20. 22.
Progn. bona. VI. 37. VII. 49.
Mala. V. 10.

ANI-

I N D E X. A. B.

- ANIMUS.** Videatur Mens.
ANXIETAS.
Vino solvitur. VII. 56.
APHTHÆ. *Ætas.* III. 24.
APPETITUS. Vid. Fames.
APOPLEXIA.
Tempus. III. 16. 23.
Ætas. III. 31. VI. 57.
In melancholicis unde. VI. 56.
Progn. VI. 51.
Curæ. II. 42.
Particularis. VII. 40.
AQUA.
Levis sign. v. 26.
Calidæ effectus. VII. 42. 31.
Frigidæ effectus. v. 21.
AROMATA. *Suffitus vis & noxæ.* v. 28.
ARS MEDICA, *longa.* I. I.
Requisita. I. I.
ARTICULORUM
Dolor. Tubercula. Vid. Dolor. Tubercula.
ARTUS &c.
Progn. mortis. VIII. 10. ad 18.
ASTHMA.
Tempus. III. 22.
Ætas. III. 26. 30.
Progn. VI. 46.
AUDITUS.
Progn. in feb. IV. 49. VII. 73.
Hebetis tempus. III. 5. 17.
Ætas. III. 31.
Acuti tempus. III. 17.
AURES.
Progn. VIII. 14.
Humidarum ætas. III. 24. 31.
Doloris tempus. III. 21.
AUSTER. vid. Ventus.
AUTUMNUS. vid. Tempestas.
BALBUS. *Progn.* VI. 32.
BALNEUM.
Dolores oculorum solvit. VI. 31. VII. 46.
Q 4 **BI-**

I N D E X. B. C.

BILIS.

Atræ sign. VII. 68.

Lethalis ubi. IV.

22. 23. 24.

FOREAS. vid. Ventus.

BUBO. *Progn.* IV.

54.

CACHEXIA.

Ætas. III. 31.

Diæta. II. IO. VII.

67.

Purgationis progn.

II. 36.

CALCULUS. vid.

Vesica.

CALIDUM INNATUM.

Majoris tempus. I.

15.

Ætas. I. 14.

CALOR.

Utilis. ubi V. 18. 22.

Magni progn. VII.

13.

Frequentioris morbi. V. 16.

Mutati progn. IV.

40. VII. 60.

Particularis quid notet. IV. 39.

Ventris quando major. I. 15.

Progn. IV. 48.

VII. 69.

CALVUS. vid. Capilli.

CANCER. *Occulti progn.* VI. 38.

CAPILLI, PILUS.

Quid indicent. V.

69.

E renibus. IV. 76.

Defluxus in tabe

lethalis. V. II.

12.

Calvi progn. VI.

34.

Eunuchus non fit.

VI. 28.

CAPUT.

Doloris tempus.

III. 13. 23.

Sign. IV. 70.

Progn. VI. 51.

Diæta. V. 64.

Cura. V. S. V. 61.

Solutio. VI. IO.

Gravitatis tempus.

III. 5. 17.

Causa. V. 28.

Cura, calor. V. 22.

Vulneris progn.

VII. 14.

Ulcus, calor juvat.

V. 22.

CARTILAGO. *Dis-*

secta non coa-

lescit. VI. 19.

28.

CA-

I N D E X. C.

CATARRHUS.

Ætas. III. 12.

21.

Sign. in diarrhæâ.

VII. 30.

Causa, frigus. V. 24.

A tabe. VII. 78.

Lethalis ubi. III.

12.

In pectus ruentis,

progn. VII. 38.

CAUTIO GENE-

RALIS. I. 2.

3. 17.

CEREBRUM.

Frigus nocet. V. 18.

Concussi sympto-

matu. VII. 58.

Vulneris sympto-

matu. VI. 50.

Progn. VII. 14.

Lethale est. VI. 18.

Sphaceli progn.

VII. 50.

CHOLERA. *Ætas.*

III. 30.

CIBUS, Nutritio.

Cautio. I. 17. II.

7. 51.

Progn. II. 31. 32.

Concoctionis progn.

a tempore. I. 18.

II. 18.

Differentia. II. 18.

Tutus quando. II.

15. VII. 65.

Nocet. I. II. 19.

II. 10. VII.

65, 67.

Pauco ubi opus. I.

10. 14. 18.

Multo ubi opus. I.

14. 15. 18.

Copiosi sign. II. 8.

17. IV. 41. 45.

VII. 64.

Effectus. II. 17.

Consuetus præfer-

tur. II. 38.

Humidus quibus u-

tilis. I. 16.

Citò nutriens. II. 18.

Et lentè ubi neces-

se. II. 7.

Mutatio ubi juvet.

II. 45.

Pravi progn. in pur-

gante. II. 36.

Vid. plura in Diæta.

COLLIQUEFA-

CTIO.

Progn. in feb. II.

28.

In gravidâ. V.

55.

Diæta. V. 64.

COLLUM. *Inversi*

progn. IV. 35.

VIII. 58.

COLOR. *Variantis*

progn.

I N D E X. C. D.

- progn.* IV. 40.
VII. 60.
- CONCEPTUS.**
Sign. V. 41. 51. 61.
Impedimentum. V.
46. 62.
Maris locus. V. 38.
48.
Sign. à colore. V.
42.
- CONCOCTA.**
Movenda, non cru-
da. I. 22.
Cruda, à bile atrâ.
VII. 68.
- CONSUEITUDO.**
Vis. II. 45.
Ejus habenda ratio.
I. 16. 17. 11.
38. 49. 50.
- CONTRARIUM.**
Remedium est. II.
17. 22. 48. 50.
V. 19.
Paulatim adhiben-
dum. II. 51.
- CONVULSIO.** Vid.
Spasmus.
- COR.** *Vulnus. le-*
thale. VI. 18.
- CORPUS.**
Preparatio, vid.
in Purgatione.
Statura. II. 54.
- CRANIUM.** *Laesi*
- Symptomata.* VII.
24.
- CRISIS.**
Futuræ sign. à no-
ctæ. II. 13.
Ab urinâ. IV. 71.
Critici dies. II.
24. IV. 36. 61.
Progn. I. 12.
Non turbanda. I.
19. 20.
Imperfecta. II. 12.
IV. 51. 61. 62.
VIII. 4.
- CUCURBITULÆ.**
Ubi necesse. V.
50.
- CUTIS.**
Progn. V. 61.
Raræ nota. V. 69.
- DEGLUTITIO.**
Progn. IV. 34.
35. VII. 58.
- DELIQUIUM A-**
NIMI.
Causa, calor fre-
quens. V. 16.
A tuberculo rupto.
VII. 8.
Progn. II. 41.
In fluore mulie-
bri malum. V.
56.
Ubi opus. I. 23.
- DELIRIUM.**

INDEX. D.

Φρενίτις.

Ætas. III. 30.

Sign. ab urina IV.
72.

Progn. in sene. VIII.

I.

Mala, ex p̄recepneu-
monia. VII. 12.

Παραφρεσίνην.

In cranio fracto.
VII. 24.

Progn. bona, à
somnia. II. 2.

A visu. VI. 53.

Mala, in febr. IV.
50.

Cum studio. VI.
53.

Post potum. VII. 7.

In hæmorrhagiâ.
VII. 9.

In ileo. VII. 10.

In vigiliis. VII.
18.

In plagâ capitis.
VII. 14.

Παρακοπή.

Ubi bona. VI. 26.

Μαρία.

Tempus. III. 20.
22.

Ab ulcere. V. 65.

In melancholicis.
VI. 56.

A mammis. V. 40.

Progn. VII. 5.

Solutio. VI. 21.

Rabies. VIII. 16.

DENTES.

Dentitionis ætas

Et morbi. III.

25.

Frigus nocet. V. 18.

Lentoris in feb.

progn. IV. 53.

DESTILLATIO.

vid. Catarrhus.

DIÆTA.

Cautio. I. 9. 10. 16.

III. 3.

Pleniori ubi opus.

I. 4. 5. 7. 10.

Tenui ubi opus. I.

7. 8. 10. 11.

Mutatio quos ju-

vet. II. 45.

Erratum. I. 5.

Vid. plura in Ci-
bo.

DIAPHRAGMA.

vid. septum

transversum.

DIARRHOEA.

vid.

Alvi fluxus.

DOLOR.

Progn. si non sentiu-

tur. II. 6.

Si sint bini. II. 46.

Calor lenit. V. 22.

Torpor solvit. V. 25.

In

I N D E X. D. E.

- In ulcere.* v. 65.
Ab anginâ. v. 10.
Cautio. vi. 5.
Lumborum.
Tempus. iii. 23.
Progn. iv. 11.
Purgatio. iv. 20.
Ventris.
Progn. iv. 11. vi.
 7. vii. 22. 26.
Purgatio. iv. 20.
Viscerum. *Progn.*
 iv. 66.
Articulorum.
Tempus. iii. 16.
 20.
Ætas. iii. 31.
Post febres longas.
 iv. 44. vii. 63.
Causa, cibus copio-
 siss. iv. 45.
 vii. 64.
Frigida solvit. v.
 25.
DYSENTERIA.
Tempus. iii. 11.
 12. 16. 22.
Ætas. iii. 30.
In ulcere. v. 65.
Adiarrhæâ. vii.
 75.
Progn. vi. 3. 43.
 vii. 76.
Bona in lienosis.
 vi. 48.
- In insaniâ.* vii. 5.
Mala, à sincerâ de-
 jectione. vii. 23.
Lethalis ab atrâ bi-
 le. iv. 24.
Cum carunculis.
 iv. 6.
DYSPNOEA. vid.
 Respiratio.
DYSURIA.
Tempus. iii. 5.
Ætas. iii. 21.
Cura. v. s. vi. 36.
 vii. 48. *Vi-*
 num. vii.
 48.
EBRIUS. *Progn.* v.
 5.
ELLEBORUS.
Præparatio ad El-
 leborum. iv.
 13.
Quomodo juvetur,
 et sistatur.
 iv. 14. 15.
Sanis periculosus.
 iv. 15.
Progn. à spasmo.
 v. 1.
Vid. plura in pur-
 gante.
EMPYEMA.
Causa, à sanguine
 effuso. vi. 20.
A pleuritide. v. 8.
 Quot

I N D E X . E . F .

Quot diebus fiat.
 VII. 38.
Progn. v. 15.
In curâ. VII. 44.
Cautio in curâ. VI.
 27.
EPILEPSIA.
Tempus. III. 16.
 20. 22.
Ætas. III. 29.
Progn. v. 7.
Cura. II. 45.
ERYSIPELAS.
Ab offe nudato. VII.
 19.
Progn. VI. 25. VII.
 20.
Lethalis in gravi-
dæ utero. v. 43.
Cura non exulce-
rati. v. 23.
EVACUATIO.
Ubi opus. II. 8. IV.
 41.
Cautio. I. 23. II.
 29.
Quâ viâ. I. 21. VII.
 61.
Progn. I. 2. 23. 25.
Extrema periculo-
sa. I. 3. II.
 51.
Cura. II. 22.
EUNUCHUS.
Progn. VI. 28.

EXCRETIO. vid.
 Alvi excre-
 menta.
EXSOLUTIO.
Εκλύω. II. 36. 41.
 VII. 8.
Διαλύω. III. 17.
Καταλύω. II.
Tempus. 43. 17.
 III.
Causa. II. 36. VII.
 8.
Progn. II. 41. 43.
EXPERIMEN-
TUM.
Periculosum. I. I.
EXTENUATUS.
Progn. II. 28. 35.
 IV. 23.
Vid. plura in Pin-
gui.
EXTREMARUM
frigus. vid.
Frigus.
FAMES.
Variat cum ætate.
 I. 13.
Progn. II. 4.
Labor nocet. II.
 16.
Siccatur corpus. VII.
 59.
Expletur difficilius
quam fitis. II.
 II.
R *Solvi-*

I N D E X. F.

- Solvitur vino.* II.
 21.
Appetitus dejectus.
Progn. II. 32.
Malus. VI. 3.
 VII. 6.
Curat. purgatio.
 IV. 17.
Fastidium cibi. In
muliere progn.
 V. 61.
FAUCES.
Laborantium progn.
 II. 15.
Asperarum tempus.
 III. 5.
FEBRIS.
Ætas. III. 25.
Progn. II. 28.
 III. 6.
A tempore. III.
 6.
A paroxysmo. IV.
 30.
A somno. IV. 67.
A lachrymis. IV.
 52. VIII. 2.
A surditate. IV.
 60.
A dentibus. IV.
 53.
A collo. IV. 35.
 VII. 58.
A respiratione. IV.
 68.
A suspiriis. VI. 54.
A suffocatione. IV.
 34.
A vomitu sanguinis. VII. 73.
Ab hypochondriis.
 IV. 73.
Ab urinâ. IV. 69.
 70. VII. 31.
Ab alvi excrementis. IV. 21.
A dysenteria. VI.
 3.
A calore. IV. 65.
A rigore. IV. 29.
A spasmo. II.
 26.
A bubone. V. 55.
A lassitudine. IV.
 31.
Ab abscessu. IV.
 51.
Ab extenuatione.
Ab hæmorrhagiâ.
 IV. 27.
A diebus criticis.
 IV. 36. 61.
Ab ictero. IV. 62.
 64.
Sudoris in febris
tempus. III.
 6.
Diæta. I. 16. V. 65.
Cibus cui noceat.
 VII. 65.
 No-

I N D E X. F.

Nocet. in paroxysmo. I. 19.

Cura febris, quæ non est à bile. VII. 42.

Morbum solvit. II. 26. IV. 57. V. 5. VI. 40. 44. 51. VII. 52.

Acuta.

Tempus. III. 7. II. 14.

Ætas. I. 14. III. 29.

Progn. IV. 66. VIII. 10.

A sudore. IV. 37. *Dieta.* V. 67.

Ardens.

Tempus. III. 21.

Ætas. III. 30.

Progn. IV. 54.

A tempore. VIII. 1.

A tremore. VI. 26.

Cura. Rigor solvit. IV. 58.

Delirium, quando. VI. 26.

Continua.

Tempus. III. 21.

Progn. à sudore. IV. 56.

A rigore. IV. 46.

A Sputo.

Urinâ &

Excrementis. IV. 47. VII. 69.

A spasmo. IV. 49. VII. 73.

A Delirio &

Respiratione. IV. 50.

Leipuria.

Progn. IV. 48. VII. 73.

Ephamera.

Progn. IV. 55.

Quotidiana.

Sign. IV. 63.

Quæ sit difficilis. IV. 30.

Tertiana.

Tempus. III. 21.

Crisis. IV. 59.

Tertiana continua, periculosa, intermittens, non. IV. 43. VII. 62.

Quartana.

Tempus. III. 21. 22.

Sign. ab urinâ. IV. 74.

Progn. V. 70.

A tempore. II. 25.

Ab hæmorrhagiâ. VIII. 3.

R 2 Sym-

I N D E X. F.

- Symptomata.** II. 47. VI. 60.
Vaga.
Tempus. III. 22.
Longa.
Tempus. III. 16.
Ætas. III. 27.
Unde. VI. 45. VII. 64.
Longæ futuræ sign.
A sudore. IV. 36.
Ab urinis. VII. 31.
Ab abscessu. IV. 51.
Progn. IV. 44. VII. 63.
Diæta. v. 64.
Lenta. *Diæta.* v. 64.
Cum lassitudine.
quibusdam jam
Lymphatica dicta.
Sign. ab urinâ. IV. 31.
Recidiva.
Causa. II. 12.
Unde. IV. 36. 61.
FERRUM. *In curâ*
progn. VIII. 6.
FLUOR MULIEBRIS. *Progn.*
v. 56.
FOEMINA. *vid.*
Mulier.
- FOTUS, SUFFITUS.**
Πυρία.
Menses movet. v. 28.
Oculorum dolores solvit. VI. 31.
Ejus noxæ. v. 28.
Ουρίαπα.
Experimentum circa prægnationem. v. 59.
FRIGUS.
Ætas. III. 14.
Ubi juvet. v. 21. 23. 25.
Noceat. v. 18. 20. 22. 23. 24.
Morbi à frig. v. 17. 20. 24.
Particulare, quid notet. IV. 39.
Progn. mala. VIII. 11. 12. 14.
Extremarum, prog.
VII. 1. 26.
In febre progn. IV. 48. VII. 69.
Mutati. progn. IV. 40. VII. 60.
Mortis imago.
VIII. 18.
Cura. calor. II. 22. v. 19.
FUROR. *Vid. in*
De-

I N D E X. G. H.

- Delirio, Ra-
bies.
- GEMELLI.**
*Alterutrius abor-
tus.* v. 38.
- GENA.** *Tenuis par-
ticula dissecta
non coalescit.*
vi. 19.
- GENITALIUM**
putredines.
Tempus. iii. 21.
- GENUUM** gravitas.
Purgatio curat.
iv. 20.
- GIBBUS.** *Progn.* vi.
46.
- GINGIVÆ** Pruri-
tus. Vid. Pru-
ritus.
- GRACILIS.** vid. in
Pinguī.
- GRAVEDO.**
Tempus. iii. 13.
20. 23.
Progn. in sene. ii.
40.
Diuturnæ tempus.
iii. 14.
- GRAVIDA.**
Sign. v. 41. 51. 61.
Fætus locus. v. 38.
48.
Progn. à mammis.
v. 37. 38. 52.
53.
- A menstruis.* v. 60.
A colore. v. 42.
A. V. S. v. 31.
A diarrhæâ. v. 34.
A tenesmo. vii.
27.
*Ab erysipelate. in
utero.* v. 43.
A febre. v. 55.
A morbo acuto. v.
30.
*Ab extenuatione
p. n.* v. 44.
Purgatio. iv. i. v.
29.
- HABITUS.**
Progn. ii. 34.
Athlethicus. i. 15.
Periculofus. i.
3.
- HÆMOPTOE.** vid.
Sanguinis spu-
tum.
- HÆMORRHA-
GIA.** vid. San-
guinis fluxus.
- HÆMORRHOI-
DES.**
Ætas. iii. 30.
Bonæ. iv. 25. vi.
ii.
Curæ cautio. vi.
21.
Solvunt delirium.
vi. 21.
- R 3** **HE-**

I N D E X. H.

HEPAR.

Dolorem febris solvit. VII. 52.

Inflammati symptomatica, sive sign.
V. 58.

Progn. VII. 17.

Suppurati curæ progn. VII.
45.

Hydropis, progn.
VII. 55.

Vulnus, lethale. VI.
18.

HERPES exedens.
Juvatur calore. V.
22.

HORROR.

Tempus. III. 5.

A sudore malus.
VII. 4.

Vinum solvit. VII.
56.

HUMIDA NATURA, sive Corpus.

Ætas. III. 31.

Sign. sudor. IV. 56.
VII. 61.

Progn. VI. 2.

Cura, fames. VII.
59.

Evacuatio. VII. 61.

Juvat siccitas. III.
14.

Morbi. III. 11.

HUMORES ALII.

Progn. VII. 69. 70.

HYDROA. *Tempus.*
III. 21.

HYDROPS.

Tempus. III. 22.

Causa, ab hæmorrhoidibus curatis. VI. 12.

A liene. VI. 43.

Ab hepatis hydrope. VII. 55.

A leucophlegmatid.
VII. 74.

Progn. à causis. VI.
43. VII. 55.

A tempore. VIII.
8.

Tussis desperata est.
VI. 35. VII. 47.

Bona in delirio.
VII. 5.

Curæ cautio. VI.
27.

Solutio. VI. 14.

Ulcus difficile. VI. 8.

Sicca, unde. IV. 11.

HYEMS. vid. *Tempestas.*

HYPERCATHARSIS. vid. *Purgatio.*

HYPPOCHONDRIA.

Mur-

I N D E X. H. I.

- | | |
|--|---|
| <p>Murmuris <i>progn.</i>
 IV. 73.
 <i>Diæta.</i> V. 64.
 Doloris <i>progn.</i> VI.
 40.
 Duritie <i>in Ictero</i>
 <i>progn.</i> IV. 64.
 HYP OG A-
 STR IUM.
 Dolor, <i>quid notet.</i>
 IV. 80. VII. 39.
 HYSTERICA. <i>Ster-</i>
 <i>nutatio juvat.</i>
 V. 35.
 ICTERUS.
 <i>Non est flatulentus.</i>
 V. 72.
 <i>Progn. ab hepate.</i>
 VI. 42. IV. 64.
 <i>Progn. quando No-</i>
 <i>xius.</i> IV. 62.
 <i>Utilis.</i> IV. 64.
 JEJUNIUM. <i>vid.</i>
 <i>Fames.</i>
 IGNIS. <i>Curæ progn.</i>
 VIII. 6.
 ILEUS.
 <i>Tempus.</i> III. 22.
 <i>Progn. à strangu-</i>
 <i>riâ.</i> VI. 44.
 <i>A variis.</i> VII.
 10.
 IMBECILLITAS.
 <i>Sign.</i> II. 28.
 IMPETIGINES.</p> | <p> <i>Tempus.</i> III. 20.
 INFLAMMATIO.
 <i>Recens, frigore cu-</i>
 <i>ratur.</i> V. 23.
 INSANABILIA.
 VIII. 6.
 INSTABILIA <i>Quæ.</i>
 II. 27. 52.
 INTESTINUM.
 <i>Tenuis vulnus le-</i>
 <i>thale.</i> VI. 18.
 <i>Non coalescit.</i> VI.
 24.
 <i>Recti inflammati</i>
 <i>symptoma.</i> V.
 59.
 ISCHIADICUS
 DOLOR.
 <i>Tempus.</i> III. 22.
 <i>Progn.</i> VI. 59. 60.
 JUDICIUM. <i>Diffi-</i>
 <i>cile.</i> I. 1.
 JUVANTIA, NO-
 CENTIA. II. 27.
 LABIA.
 <i>Progn.</i> VIII. 13.
 <i>In febre continua.</i>
 VI. 49. VII. 73.
 LAC.
 <i>In menstruis defi-</i>
 <i>cientibus.</i> V. 39.
 <i>In gravida, progn.</i>
 V. 52.
 <i>Quibus conveniat.</i>
 V. 64.
 <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> R 4 LA- </div> </p> |
|--|---|

I N D E X. L. M.

LACRYMÆ.

Ætas. III. 31.

Progn. in morbis.

IV. 52. VIII. 2.

LASSITUDO.

Sign. ex urinâ. IV.

74.

Progn. in febre.

IV. 31.

Cura, quies. II.

48.

Spontanæ progn.

II. 5.

LATUS, Dolor. vid.

Dolor.

LEPRA.

Tempus. III. 20.

LETHALE VUL-

NUS. vid. Vulnus.

LETHARGUS.

Tempus. III. 23.

Ætas. III. 30.

LEUCOPHLEG-

MATIA.

Progn. VII. 74.

Solvitur diarrhœâ.

VII. 29.

LICHENES. *Tem-*

pus. III. 20.

LIENOSUS.

Tempus. III. 22.

Progn. VI. 43.

VIII. 8.

Dysenteria utilis.

VI. 48.

LIENTERIA.

Tempus. III. 22.

Ætas. III. 30.

Causa. In Lienosis.

VI. 43.

A dysenteriâ. VII.

76.

Progn. à ructu. VI.

I.

Cautio in purgatio-

ne. IV. 12.

LINGUA.

Progn. VII. 40.

VIII. 9.

LOCUS. vid. Re-

gio.

LUMBUS. Dolor.

vid. Dolor.

MAMMÆ.

Progn. à lacte. v.

39.

A sanguine. v.

40.

In gravida, ab

extenuatione.

v. 37. 53.

A Lacte. v. 52.

MANIA. vid. in De-

lirio.

MELANCHOLIA.

Tempus. III. 14.

20. 22.

Sign. VII. 40.

Causa. Timor &

mæstitia. VI. 23.

Progn.

I N D E X. M.

- Progn.* VI. II. 56.
Purgatio. IV. 9.
MENS.
Progn. II. 23.
 VIII. 16.
Laborantis sign. II.
 6.
MENSTRUUA.
Erumpentia, mor-
bos pueritiæ sol-
vunt. III. 28.
Vomitum sanguinis
curant. V. 32.
Sistuntur in gra-
vida, v.
 61.
Fluentium progn.
 V. 60.
Deficientia.
Sign. V. 39.
Progn. V. 57. VI.
 29.
Sanguis è naribus
juvat. V. 23.
Cura Suffitus. V.
 38.
Nimia.
Progn. V. 57.
Cura. V. 50.
Coloris vitiiati Cu-
ra. V. 36.
MORBUS.
Cautio in morbo.
 I. 2.
Progn. I. 12. II.
33. 34. 35. III.
 3. VIII. 1.
MORBI SEDES,
 five Focus. IV.
 33. 38. 39.
MORBUS FUTU-
RUS.
Tempus. III. 1.
 19.
Sign. II. 5.
Causa. Cibi copia.
 II. 17.
MORBI PRINCI-
PIUM.
Remissius est. II.
 30.
Ab atrâ bile lethar-
le. IV. 22.
Rarò purgandum.
 I. 22. 24.
Si quid movendum
statim move.
 II. 29. IV. 10.
Morbi Vigor.
Vehementior est.
 II. 30.
Dieta, tenuis. I.
 8. 20.
Nil movendum. II.
 29.
Morbi Finis.
Remissior est. II.
 30.
MORBUS ACU-
TUS.
Tem-

I N D E X. M.

Tempus. III. 9.

Sign. I. 7.

Ab urinâ. VII.

32. 35.

Prædictio incerta.

II. 29.

Progn. VIII. 10.

Mala, à suspi-
riis. VI. 54.

Frigore extrema-
rum. VII. 1.

Lethalis ab excre-
mentis. IV. 23.

In gravida. V.
30.

Diæta. I. 4. 7.

Purgatio. I. 24.
IV. 10.

Crisis in XIV. die-
bus. II. 23.

MORBUS LONGUS.

Futuri sign. I. 12.
II. 18. IV.
40. VII. 60.

A sudore. IV. 36.
37. 56.

Ab urinâ. VII.
31. 34.

Ab abscessu. IV.
51.

Existentis progn.ab
appetitu prostra-
to. VII. 6.

Ab excrementis.

IV. 23. VII. 6.

Ab alvi fluxu.

VIII. 5.

Diæta tenuis peri-
culosa. I. 4.

MORBUS PERICULOSUS.

In genere. II. 34.
VIII. 1. 8.

Remedium quale.
I. 6.

MORBUS.

Judicatu Facilis.
I. 12. III. 8.

Difficilis. I. 12.
III. 8. IV. 29.
30.

MORBUS RECIDIVUS.

Causa. II. 12.

Futuri sign. IV. 36.
61.

MORBUS INSANABIBIS. VIII. 6.

MORS.

Propinqua,

Sign. à variis. VI.
38. VIII. 11.
ad 18.

Ab excrementis.
IV. 23.

In feb. contin. IV.
49. VII. 73.

Certa. VI. 27.

Su-

I N D E X. M. N.

Subita Sign. II.

41. 44.

MORTIFERUM,

Lethale.

Θανάσιμον, Θανα-
τῶδες. II. I. III.

9. IV. 22. 24. 26.

34. 35. 37. 46.

48. 50. V. I. 2.

11. 14. 22. 30.

43. VI. 18. 27.

52. VII. 25. 72.

73. 79. VIII. II.

13. 14. 15. 16.

17. 18.

MOTUS, QUIES.

Se invicem curant.

II. 22. 48.

Effectus in purg.

II. 14. 15.

Progn. II. 51.

MULIER.

Non est ambidextra.

VII. 43.

*Fœcundæ tempera-
mentum.* V. 62.

Sign. V. 59.

*Infœcunda., crassa
p. n.* V. 46.

MUTATIONES.

Subitarum progn.

II. 51.

*Caloris, Colo-
ris, Tempesta-
tis.* vid. Ca-

lor, Color, Tem-
pestas. &c.

MUTUS.

Causa. VII. 58.

Progn. VI. 51.

Ab ebrietate. V. 5.

NARES.

*Progn. in feb. con-
tin.* IV. 49. VII.

73.

Humidarum ætas.

III. 31.

Et Siccarum progn.

VI. 2.

*Hæmorrhagiæ in
quartana progn.*

VIII. 3.

*Pus solvit dolorem
capitis.* VI. 10.

Compressarum vis.
V. 49.

NATURA.

Inimicum. vid.

Nimium.

Differentia. III. 2.

Progn. II. 34. VI.
2. VIII. I. 8.

NEPHRITIS.

Ætas. III. 31.

Sign. ab urina. VII.
34. 35.

Progn. VI. 36.

In senibus. VI. 6.

*Hæmorrhoides uti-
les.* VI. II.

NER-

I N D E X. N. O.

NERVUS.

Calor juvat. v. 18.

Frequentior debilitat. v. 16.

Refectus non coalescit. vi. 19.

vii. 28.

NIGROR.

Causa, frigus. v. 17. 20.

NIMIUM, Naturæ est inimicum.

In omnibus. ii. 51.

In cibo. i. 4. ii. 4. 17.

In somno, vig. ii. 3. vii. 71.

OCCASIO. *Celeris.* i. i.

OCULI.

Progn. iv. 52. viii. 2.

In febre continua. iv. 49. vii. 73.

In vomitu. vii. 3.

In somno. vi. 52.

Ophthalmia.

Tempus. iii. 11. 14. 16. 21.

Solutio. vi. 17.

Doloris cura. vi. 31. vii. 46.

Tarditatis &

Morsus *tempus.*

iii. 17.

Hebetudinis.

Glaucomatis &

Humiditatis *ætas.* iii. 31.

Cæcitas, *in melancholicis.* vi. 56.

OFFICIUM *medici, ægri, &c.* i. i.

OMENTUM.

Crassius, *infecundam facit.* v. 46.

Excidens *putrescit.* vi. 58.

ORGASMUS. *vid.* **Turgens** *materia.*

OS.

Ulcerationum. *tempus.* iii. 21.

Ætas. iii. 24.

Amari cura. iv. 17.

OSCITATIO.

Solvitur vino. vii. 56.

OSSA.

Frigus lædit. v. 18. 22.

Laborantis *progn.* vii. 2.

Nudati *progn.* vii. 19.

Cura, calor juvat. v. 22.

Dis-

I N D E X. P.

- Dissectum**, *non coalescit.* VI. 19.
 VII. 28.
Fracta calor juvat.
 V. 22.
Abcessus, *in ulcere diuturno.* VI. 45.
A sphacelo, VII. 77.
- Παράκοπή.
PAROXYSMUS.
Sign. I. 12. II. 13.
Progn. IV. 30.
Cibus nocet. I. II. 19.
- PARTUS DIFFICILIS.**
In tennitate p. n. a feb. V. 55.
Sternutatio juvat. V. 35.
- PECTEN.** Dolor *quid notet.* VII. 39.
- PECTUS.** *Frigus lædit.* V. 24.
 Dolor vid Dolor.
- PERINÆUM.**
 Dolor *quid nocet.* IV. 80. VII. 39.
- PERIPNEUMONIA.** vid. in Pleuritide.
- PERVERSA**, five
- Distorta pars.**
Progn. in febre. IV. 35. 49. VII. 58. 73.
- PHLEBOTOMIA.**
 vid. V. S.
- PHRENITIS.** vid. Delirio.
- PHTHISIS.**
Tempus. III. 13. 16. 22.
Ætas. III. 29. V. 9. VIII. 7.
Causa, a pleuritide. V. 15.
A sputo sanguinis. VII. 15, 16. 78.
Puris. VII. 16. 78.
Ab hæmorrhoidibus. VI. 12. •
Progn. lethalis
A tempore. III. 10
A naturâ. VIII. 8.
A diarrhæâ. V. 12. 14. VII. 78.
A sputo. V. 11. VII. 16. 78.
Puris purgatio sursum. VII. 78.
Diæta. V. 64.
Purgatio. IV. 8.
- S
- PIN-

I N D E X. P.

PINGUES, Crassi.

Progn. II. 35.

Mortis. II. 44.

Purgatio. II. 35.

IV. 7.

Gracilis.

Purgatio. II. 35.

IV. 6.

Gravidæ p. n.

progn. V. 44.

PITUITA.

Conclusæ solutio.

VII. 74.

Fluxus & capite.

VII. 30.

PLEURITIS.

Tempus. III.

23.

Ætas. III. 30.

Qui minus obnoxii.

VI. 33.

Progn. VII. II.

A sputo, quoad

tempus. I. 12.

V. 8. 15.

Diarrhæa lethalis.

VI. 16.

Dolor vid. Dolor

Lateris.

Peripneumonia.

Tempus. III. 23.

Ætas. III. 30.

Progn. VII. 12.

Mala a pleuritide.

VII. II.

Diarrhæa lethalis.

VI. 16.

PLUVIA. *vid. in*

Tempestate.

PODAGRA.

Tempus. III. 16.

20. VI. 55.

Ætas. III. 31.

Causa. VI. 29. 30.

Qui non obnoxii.

VI. 28. 29. 30.

Progn. VI. 49.

Dolorem frigida

solvit. V. 25.

POTUS.

Consuetus præfer-

tur. II. 38.

Effectus. II. II.

Multi progn. VII.

7.

PRÆDICTIO.

Acutorum incerta.

II. 19.

PRÆGNANS. *vid.*

Gravida.

PRÆPUTIUM.

Resectum non coa-

lescit. VI. 19.

PRURITUS.

Gingivarum. ætas.

III. 25.

Corporis totius,

ætas. III. 31.

PURGATIO PER

ALVUM.

Pur-

I N D E X. P.

- Purgandum.**
Venere. VI. 47.
Hyeme. IV. 4.
Nou purgandum. °
Æstate. I. 7. 9.
Sub cane &c. IV.
 5.
In vigore morbi.
 II. 29.
In extenuatis. II.
 35. IV. 6.
Qui purgandi. II.
 8. IV. 18. 20.
 VII. 67.
Quæ purgandæ. V. 36.
Purgandi.
Difficulter vomentes. IV. 7.
Metancholici. IV. 9.
Tabidi. IV. 8.
Oculis dolentes. VI.
 31.
Debilis sudans. VII.
 61.
Gravida, quando.
 IV. I - V. 29.
Purganda.
Concocta. I. 22.
Turgentia. IV. I.
 IO. V. 29.
Quâ viâ purgandum.
 I. 21. VII. 61.
Præparatio ad pur-
 gationem. II. 9.
 IV. 13. VII. 70.
- Quantâ purgatione**
 opus. I. 23.
Juvanda, aut
Sistenda, quomodo.
 IV. 14. 19.
Finis sign. IV. 12.
Progn. ab excre-
 mentis. IV. 21.
A spasmo. V. I.
 VII. 25.
Bonæ purgationis
 sign. I. 2. 23.
 25. IV. 2. 3.
Noxia.
 In genere. I. 2. 25.
 IV. 2. 3.
 Sub Cane &c. IV. 5.
 In sanis. II. 36.
 37. IV. 16.
 In Crisi. I. 20.
Spontanæ progn.
 I. I. 2.
Hypercatharsis.
 Progn. V. 4. VII. 41.
- PUS.**
Generationis sign.
 II. 47.
Calor juvat. V. 22.
Frigus impedit. V.
 20.
Progn. VI. 41.
 VII. 8.
Boni nota. VII. 44. 45.
Curæ Cautio. VI. 27.
Puris sputum.

I N D E X. P. Q. R.

- Causa, a sanguinis sputo.* VII.
15. 78.
A vomitu sanguinis. VII. 78.
Progn. VII. 14.
16. 78.
E capite effluens, *ejus dolorem solvit.* VI. 10.
In ventre, *Causa.* VI. 20. VII. 22.
In urinâ, *quid notet.* IV. 75. 81.
In utero, *Cura.* V. 47.
PUSTULÆ.
Ulcerosæ, Vere fiunt. III. 20.
Datae, quales sent. VI. 9.
PUTREDINES.
Tempus. III. 16. 21.
QUIES. vid. in *Motu.*
RABIES. vid. in *Delirio.*
RAUCEDO.
Tempus. III. 13. 20. 23.
Progn. in sene. II. 40.
RATIO. vid. *Mens.*
Rationi fidendum. II. 27. 52.
RECIDIVUS
- MORBUS.** vid.
Morbus recidivus.
REFECTIO. vid.
Cibus.
REGIO.
Cautio in Dietâ. I. 17.
In Medicamentis. I. 2.
Mutatio, quos juvet. II. 45.
REMEDIUM.
Quali opus. I. 6.
Gradus. VII. 6.
RENES.
Sanguinis profluentis sign. IV. 57. 78.
Suppuratorum symptomata. V. 58.
Ulceris sign. IV. 75.
Pili, & Carunculæ. IV. 76.
REPLETIO.
Differentia. II. II.
Extrema periculis. 3. 3. 4. II. 4. 17. 51. VI. 39.
Cura II. 22.
RESPIRATIO, *difficilis.* *Dyspnœa.*
Ætas. III. 31.
Progn. in febre. IV. 68.

In

INDEX. R. S.

In feb. contin. IV.
50.

RIGOR.

Causa, frigus. V.

17. 20.

Focus. V. 62.

*Signum est quoti-
dianæ feb.* IV. 63.

*Solvit feb. arden-
tem.* IV. 58.

Progn. in febre.

IV. 29. 46.

*Malus à multo po-
tu.* VII. 7.

*Cura. Calor miti-
gat.* V. 22.

RUCTUS ACIDUS

Progn. VI. 33.

*Bonus in Liente-
riâ. quando.* VI. 1.

SANGUIS.

Collecti in mam-

mas progn. V. 40.

Fluxus tempus.

III. 20.

Causa, calor. I. 16.

Frigus. V. 24.

Progn. in feb. IV.
27.

A convulsione &c.

V. 3. VII. 9.

Malus in ulcere.

VII. 21.

Diæta. V. 64.

Cura, frigus. V. 19. 23.

E capite progn. VI.
10.

Per nares.

Ætas. III. 27.

*Progn. in quarta-
nâ.* VIII. 3.

*Bonus in men-
struis deficien-
tibus.* V. 33.

Solvit surditatem.
VI. 60.

Capitis dolorem.

VI. 10.

Abscessum. IV. 74.

In ventrem progn.

VI. 20.

Sputum.

Ætas. III. 29.

Progn. VII. 15.
78.

In feb. contin. IV.
27.

*Spumans, e pulmo-
ne.* V. 13.

Vomitus.

*Progn. Bonus sine
febre.* VII. 37.

Malus. II. 25.

Cum febre. VII.
37.

Tabes sequitur.
VII. 78.

*Cum urinâ, quid
notet.* IV. 78. 80.

81. VII. 39.

I N D E X. S.

Per alvum.

Niger bonus. IV. 25.

Malus, bonus. IV.

21. 22.

SANITAS *Sign.* VI.

2.

SATIETAS. *Quæ*

mala. II. 4.

Vid. Repletio.

SATYRIASIS.

Ætas. III. 26.

SECUNDÆ.

Sternutatio expel-
lit. V. 49.

SEMEN. *Prog.* VI. 2.

SENEX. *vid. in*

Ætate.

SEPTUM TRANS-
VERSUM.

Vulnus lethale. VI. 81.

SICCITAS. *vid. in*
Tempestate.

SIGNA. *vid. Affe-*
ctus, cujus sunt.

SINGULTUS.

Causa. VI. 39.

Ab hepate inflam-
mato. V. 58.

Prog. malus in
hæmorrhagiâ. V. 3.

In hypercatharsi. V.

4. VII. 41.

A vomitu. VII. 3.

Ab Ileo. VII. 10.

Ab hepate inflam-

mato. VII. 17.

Cura. sternutatio.

VI. 13.

SITIS.

Non magna, ubi.

Prog. nocturna.

V. 27.

In purgante. IV. 19.

In feb. Leipuriâ.

IV. 48. VII. 72.

Dieta, Lac nocet.

V. 64.

Expletur citius,
quàm fames. II.

SOMNUS, VIGI-
LIÆ.

Mali. II. 3. VII.

71.

Somnus.

Prog. II. 1.

In febre. IV. 67.

In vertigine.

VIII. 15.

Bonus, in delirio.

II. 1.

Post sitim. V. 27.

Effectus. IV. 14. 15.

Longi tempus. I. 15.

Vigiliæ.

Ætas. III. 24. 31.

Prognosis mala. VII.

SPASMUS, Cor-
vulsiô.

Ætas. III. 25.

Causa,

INDEX. S.

Causa, Frigus. v. 17. 20.
Repletio aut Inanitio. vi. 39.
In melancholicis. vi. 56.
In ulcere, quando. v. 65.
Futuri in feb. sign. iv. 68.
Progn. in febre. ii. 26.
Malus in febre. iv. 66. 67.
In vigiliis. vii. 18.
In ardore. vii. 13.
In hæmorrhagiâ. v. 3. vii. 9.
In Ileo. vii. 10.
Ab Elleber. iv. 16.
Ab hypercatharsi. v. 4.
In fluore muliebri. v. 56.
Lethalis. In febre contin. iv. 49.
A purgante. vii. 25.
Ab Elleboro. v. 1.
In ebrio. v. 5.
In teste dextro. viii. 11.
In vulnere. v. 2.

Cura. Calor mitigat. v. 22.
Frigus levat. v. 25.
Solvitur à febre. iv. 57.
A quartanâ. v. 70.
Tetanus. *Causa, frigus.* v. 17. 20.
In ulcere, quando. v. 65.
Progn. v. 6.
Malus in ardore. vii. 13.
Cura, frigida. v. 21.
Calor mitigat. v. 22.
Solvitur à febre. iv. 57.
SPIRITUS. vid. *Respiratio.*
SPUMA. *Oris. progn.* ii. 43.
In sputo sanguinis, unde. v. 13.
In alvi excrementis, unde. vii. 30.
Bullæ in urinâ, quid notent. vii. 34.
SPUTUM. *Progn. in feb. contin.* iv. 47. vii. 69.
In pleuritide. i. 12.
 S 4 In

I N D E X. S.

- In phtkif.* v. 11.
 VII. 78.
 Sanguinis vid. Sanguinis sputum.
 Puris. vid. Puris sputum.
STATURA CORPORIS. 11. 54.
STERILIS.
 Mas. v. 63.
 Mulier. vid. Mulier.
STERNUTATIO.
Causa VII. 1.
Solvit singultum.
 VI. 13.
Juvat partum difficilem. v. 35.
Expellit secundas.
 v. 49.
STRANGULATIO
Progn. 11. 43.
STRANGURIA.
Tempus. III. 16.
 20. 22.
Ætas. III. 31.
 Symptomática. IV.
 80. v. 58. VII.
 39.
Progn. ab Ileo. VI.
 44.
Cura. V.S. & vinum. VII. 48.
STRUMA. Ætas.
 III. 26.
- STUPOR.**
Malus in vulnere Capitis. VII. 14.
SUDOR.
In febre, tempus.
 III. 6.
In morte, cui. v. 71.
Particularis, morbi sedem notat. IV. 38.
Prog. I. 12. VII. 79.
In febre IV. 36.
Malus in feb. contin. IV. 56.
In crisi, qualis.
 VIII. 4.
Horror malus.
 VII. 4.
Calidus, quid notet.
 IV. 42.
Frigidus, malus. IV. 42. VIII. 4.
Prog. in feb. IV. 37.
Multus & continuus, quid notet. IV. 42. VII. 61.
A somno, unde.
 IV. 41.
Ubi malus. VIII. 4.
Cura. IV. 41.
 VII. 61.
Hydroa. Tempus.
 III. 2.
SUFFITUS. vid.
 Fetus.
SUF-

I N D E X. S. T.

SUFFOCATIO.

Progn. in febre.

IV. 34.

SUPERCILIUM.

Distorti, in feb.

contin. progn. IV.

49. VII. 73.

SURDITAS.

In febre contin. le-

thalis. IV. 49.

VII. 73.

Solutio, per alvum.

IV. 28.

In febre. IV. 60.

SUSPIRIA.

In acutis, cum feb.

mala. VI. 54.

Vid. Respiratio.

TABES. Vid. Phthi-

sis.

TEMPESTAS ANNI.

Concedendum ei. I.

2. 17.

Morbos indicat.

I. 12.

In aliâ alii morbi

fiunt. III. 19.

Progn. II. 34. VIII. 8.

Mutatio.

Morbi causa. III.

I. 4. 8.

Quos juvet. II. 45.

Siccitas.

Salubris. III. 15.

Morbi. III. 7. 16.

Pluvia.

Minus Salubris.

III. 15.

Morbi. III. 16.

Ver.

Salubris. III. 9.

Pueris conducit.

III. 18.

Dieta. I. 15. 18.

Medicina facienda.

VI. 47. VII. 53.

Morbi. III. 20.

VI. 55.

Progn. III. II. 12.

Æstas.

Senibus utilis. III.

18.

Dieta. I. 18.

Purgatio. IV. 4. 6.

Morbi. II. 25. III.

6. 21.

Progn. III. 2. 6.

13. 14. VIII. 8.

Autumnus.

Ætas media valet.

III. 18.

Dieta. I. 18.

Periculosus est. III.

9.

Malus tabi. III. 10.

Morbi. II. 25. III.

4. 22. VI. 55.

Progn. III. 4. 13.

14.

Hyems.

INDEX. T.

- Hyems.**
Mediæ ætati com-
moda. III. 18.
Diata. I. 15. 18.
Purgatio. IV. 4.
 7. 9. 12.
Morb. II. 25.
 III. 23.
Progn. III. 2. II.
 12. VIII. 8.
- TENESMUS.**
Progn. in gravida.
 VII. 27.
- TERROR.**
Ætas. III. 24.
Malus in febre.
 IV. 67.
- TESTES.**
Progn. a convul-
sione. VII. II.
- TETANUS.** vid. in
 Spasmo.
- TIMOR.** Longi Ef-
 fectus. VI. 23.
- TONSILLÆ.**
Inflammationis
ætas. III. 26.
- TORPOR.** Effectus.
 V. 25.
- TRANSPIRATIO.**
Progn. VII. 79.
 VIII. 18.
In Viro. V. 63.
- TREMOR.**
Solutio in feb. ar-
 dente. VI. 26.
- TRISTITIA.** Lon-
 gæ.
Effectus. VI. 23.
- TUBERCULA,**
 Φύματα.
Tempus. III. 20.
Ætas. III. 26.
Progn. a ruptione.
 VII. 8.
Curæ Cautio. II. 15.
In articulis in feb.
 longis. IV. 44.
 VII. 63.
Causa, Cibi copia.
 IV. 45. VII. 64.
Cura, frigida le-
 vat. V. 25.
In urethra.
 Solutio. IV. 82.
 VII. 57.
- E'ξαρθήματα.** VI. 9.
- TUMOR.**
Progn. mollis bo-
nus. V. 67.
Evanescens prog.
 V. 65. —
In ulcere prog. V. 66.
- TURGENS materia**
Ubique & semper
educenda. I. 22.
 IV. I. IO. V. 29.
- TUSSIS.**
Tempus. III. 5.
 13. 20. 23.
 Ætas.

I N D E X. V.

Ætas. III. 24.

31.

Causa, frigus. v. 24.

*Progn. in hydrope
desperata.* VI.

35. VII. 47.

*Siccæ in feb. arden-
te progn.* IV. 54.

Gibbi a tussē, prog.
VI. 46.

VARICES.

Calvis non sunt.

VI. 34.

Solvunt delirium.

VI. 21.

VENÆ SECTIO.

Vere instituenda.

VI. 47. VII. 53.

Quanta opus. I. 23.
*juvat in Capitis
dolore.* v. 68.

*Solvit oculorum
dolorem.* VI. 31.

VII. 46.

Dysuriam. v. 36.

Stranguriam. VII.
48.

Fluxiones. VI. 22.

Nocet gravidæ. v.
31.

VENTRICULUS.

*Æstus & Dolor, in
feb. malus.* IV. 65.

Cura, Purgatio.
IV. 17.

Vulnus, lethale.
VI. 18.

VENTUS.

Auster. Morbi.

III. 5. 17.

Progn. III. 12. 13.

Boreas. Morbi. III.
5. 17.

Progn. II. 11. 12.
13. 14.

VENTRIS Muta-
tio. vid. Alvi
Mutatio.

Partes, vid. Pin-
guis.

Dolor, vid. Dolor.

Calor, vid. Calor.

Ventris turbatio.

Solvit surditatem.
IV. 60.

Spontanæ progn.
I. 2.

VER. vid. in Tem-
pestate.

VERATRUM, vid.
Elleborus.

VERMES &

VERRUCÆ. *Ætas.*
III. 26.

VERTICULUM.

Luxationis ætas.
III. 26.

VERTIGO.

Tempus. III. 17.
23.

Ætas.

INDEX. V.

- Ætas.* III. 31.
Tenebricosa, mala.
 VIII. 15.
 Cura, purgatio.
 IV. 17.
VESICA.
 Laborantis sign.
 IV. 80. VII. 39.
 Progn. in sene.
 VI. 6.
 Calor juvat. V. 22.
Calculi ætas. III.
 26.
 Sign. IV. 79.
Vulnus lethale. VI.
 18.
Ulceris sign. IV.
 75. 81.
Scabiei sign. IV.
 77.
VIGILIÆ, vid. in
 Somno.
VIGOR, vid. Morbi
 Vigor.
VINUM. *Curat.*
Θώρηξις fames. II.
 21.
Ἀφρητον oculorum
 dolores. VI. 31.
 VII. 46.
Ἰσοκρατές affectus
 varios. VII. 56.
VISCERA Dolor.
 vid. Dolor.
VISUS.
- Progn. in feb. con-*
tin. IV. 49. VII.
 73.
Hebetis tempus.
 III. 5.
Ætas. III. 31.
VITA.
 A calore est. VIII.
 18.
 Brevis est. I. 1.
ULCUS.
 Tempus. III. 20. 21.
 Progn. VI. 4.
 A pulsu. VII. 21.
 A tumore. V. 65.
 In hydrope. VI. 8.
 Juvat Calor. V. 22.
 Nocet frigus. V.
 20. 22.
 Diurni progn. VI.
 45.
 Oris. vid. Oris ul-
 ceratio.
UMBILICUS.
 Inflammationis
 ætas. III. 24.
 Doloris prog. IV. 11.
UNGUES.
 Nigrorum. progn.
 VIII. 12.
VOMITUS.
 Tempus. III. 21.
 Ætas. III. 24.
 A tuberculo rupto.
 VII. 8.

Ubi

I N D E X - V.

Ubi opus. IV. 17.

18. VII. 61.

Æstate convenit.

IV. 4. 6.

Præparatio VII. 70.

Progn. I. 23. VII. 3.

Malus in Ileo VII.

10.

In Lienteria hye-

me. IV. 12.

Spontaneus Progn.

I. 2.

Solvit diarrhæam.

VI. 15.

Sanguinis.

Progn. VII. 78.

A febr. VII. 37.

Malus. IV. 25.

Cura. VII. 37.

Solutio, per men-
strua. V. 32.

Bilis in Cerebro di-
viso. VI. 50.

Ab atra bile, le-
thalis. IV. 22.

URETHRA.

Tuberculi solutio.

IV. 82. VII.

57.

URINA.

Alba, pellucida,
mala. IV. 72.

Alba, multa cras-
sa, abscessu
liberat. IV.

74.

Crassæ, grumosæ,
paucæ, Progn.

IV. 69.

Multa, noctu quid
notet. IV. 83.

Solvit morbum. VI.

54. VII. 73.

Nubeculæ progn.

IV. 71.

Sedimentum.

Progn. IV. 69.

Biliosum, quid no-
tet. VII. 32.

Divulsa quid notet.

VII. 33.

Turbata, quid no-
tet. IV. 70.

Fœtida, quid no-
tet. IV. 81.

Bullarum progn.
VII. 34.

Pinguedo, quid no-
tet. VII. 35.

Sanguis, e renibus
aut vesica. IV.
75.

E renibus. IV. 78.

E vesica. IV. 80.

81. VII. 39.

Sanguis & grumi,
quid notent. IV.
80. VII. 39.

Grumosæ progn.
IV. 69.

Pus, unde. IV. 75.
81.

T

Ca-

I N D E X. V.

Carunculæ, &
Pili. unde. IV. 76.

Farinam crassio-
rem referentis
progn. in feb.
VII. 31.

Furfures, quid no-
tent. IV. 77.

Squammæ, quid
notent. IV. 81.

Arena calculi sign.
IV. 79.

Progn. in genere.
I. 12. VII. 66.
79.

In feb. contin. IV.
47. VII. 69.

UTERUS.

Temperies, mode-
rata fœcundita-
tis causa. V. 62.

Calor juvat. V. 22.

Os durum, clausum
est, V. 54.

In gravida clau-
sum est. V. 51.

Inflammati sign.
V. 58.

Suppurati Cura.
V. 47.

Erysipelas in gra-
vida lethale. V.
43.

VULNUS.

Progn. a tumore.
V. 66.

Spasmus lethalis.
V. 2.

Atrabilis per al-
vum lethalis. IV.
23.

Non coalescens.
VI. 19. 24. VII.
28.

Lethale. VI. 18.

Cerebri vid. Ce-
rebrum.

INSIGNIORES

Aliquot

SENTENTIÆ

*Selectæ ex libris Aurelii Cornelii Celsi
medici inter Latinos eloquentissimi.*

Ex Lib. PRIMO.

I. **U**T alimenta sanis corporibus Agricultura, sic sanitatem ægris medicina promittit. *præf. L. 1. p. 1.*

II. Desidia atque luxuria, hæc duo prius in Græcia corpora vitiarunt, deinde apud nos affligerunt. *præf. L. 1. p. 2.*

III. Non credunt posse eum scire quomodo morbos curare conveniat qui unde hi sint ignoret. *præf. L. 1. p. 4.*

IV. Eum rectè curaturum esse dicunt, quem prima origo causæ non fefellerit. *præf. L. 1. p. 5.*

V. Occursurum enim initio dicunt eum, qui originem non ignorarit. *præf. L. 1. p. 5.*

VI. Differunt pro natura locorum genera medicinæ. *præf. L. 1. p. 8.*

VII. Nam ne agricolam quidem, aut gubernatorem disputatione, sed usu fieri. *præf. L. 1. p. 9.*

VIII. Alii putant interesse non quid morbum faciat, sed quid tollat. *præf. L. 1. p. 10.*

IX. Morbi non eloquentia sed remediis curantur. *præf.* L. I. p. 10.

X. Neque quidquam est stultius, quam quale quid vivo homine est, tale existimare esse moriente, imo jam mortuo. *præf.* L. I. p. 11.

XI. Cujus rei non est certa cognitio, ejus opinio certum reperire remedium non potest: Verumque est quod ad ipsam curandi rationem nihil plus confert quàm experientia. *præf.* L. I. p. 13.

XII. (Medicina) est ars conjecturalis neque respondet ei plerumque non solum conjectura sed experientia. *præf.* L. I. p. 13.

XIII. Interest enim fatigatio morbum, an sitis, an frigus, an calor, an vigilia, an fames fecerit; an cibi vinique abundantia, an intemperantia libidinis. *præf.* L. I. p. 14.

XIV. Neque ignorare medicum oportet quæ sit ægri natura, humidum magis, an magis siccum corpus ejus sit, validi nervi, an infirmi, frequens valetudo an rara, eaque, cùm est, vehemens esse soleat an lenis, brevis an longa. *præf.* L. I. p. 14.

XV. Vix ulla perpetua præcepta Medicinalis ars recipit. *præf.* L. I. p. 17.

XVI. Hippocrates dixit mederi oportere communia & propria intuentem. *præf.* L. I. p. 16.

XVII. Non eadem omnibus, etiam in similibus casibus opitulantur. *præf.* L. I. p. 18.

XVIII. Qui secundis aliquando frustra cura-

SELECTÆ SENTENT. 3

curatus est , contrariis sæpe restituitur.
præf. L. i. p. 19.

XIX. Cùm par scientia sit , utiliore
tamen medicum esse (scias) amicum, quàm
extraneum. *præf. L. i. p. 19.*

Lib. I.

XX. Sanus homo , qui & benè valet, &
suæ spontis est , nullis obligare se legibus
debet , ac neque medico , neque iatroalipta
egere. Hunc oportet varium habere vitæ
genus , modò ruri esse , modò in urbe ,
sæpiùsque in agro : navigare, venari, quie-
scere interdum, sed frequentius se exerce-
re. Si quidem ignavia corpus hebetat , la-
bor firmat , illa maturam senectutem , hic
longam adolescentiam reddit. L. i. c. i.
p. 20.

XXI. Bis die cibum capere, potiùs quam
semel , potest homo , & semper quàm plu-
rimum , dummodo hunc concoquat. L. i.
c. i. p. 21.

XXII. Concubitus neque nimis concu-
piscendus , neque nimis pertimescendus
est : rarus, corpus excitat , frequens solvit.
Cùm autem frequens non numero sit , sed
natura ratione ætatis & corporis, scire licet
cum non inutilem esse , quem corporis ne-
que languor , neque dolor sequitur. L. i.
c. i. p. 21.

XXIII. Cavendum , ne in secunda vale-
tudine adversæ præsidia consumantur. L. i.
c. i. p. 21.

XXIV. Imbecillis stomacho , quo in nu-
mero

mero magna pars urbanorum, omnesque penè cupidi literarum sunt, observatio necessaria est, ut quod corpori vel loci vel studii ratio detrahit, cura restituat. Ex his igitur qui benè concoxit, manè tuto surget, qui parùm, quiescere debet, & si manè surgendi necessitas fuerit redormire: qui non concoxit ex toto conquiescere, ac neque labori se, neque exercitationi, neque negotio credere. L. I. c. 2. p. 21.

XXV. Scire licet integrum corpus esse, cùm quotidie manè urina alba, dein rufa est: illud concoquere, hoc concoxisse significat. L. I. c. 2. p. 22.

XXVI. Si lucubrandum est, non post cibum facere, sed post concoctionem. L. I. c. 2. p. 22.

XXVII. Quem interdium vel domestica vel civilia officia tenuerunt, huic tempus aliquod servandum curationi corporis est. Prima autem ejus curatio exercitatio est, quæ semper antecedere cibum debet: exercitationis autem modus & finis esse debet sudor, aut certè lassitudo quæ citra fatigationem sit. L. I. c. 2. p. 22.

XXVIII. Nunquam utilis est nimia satietas. Sæpe inutilis est nimia abstinentia. Sæpe si qua intemperantia subest, tutior est in potione quam in esca. L. I. c. 2. p. 23.

XXIX. Secunda mensa bono stomacho nihil nocet, in imbecillo coalescit. L. I. c. 2. p. 24.

XXX. Post satietatem nihil agendum. L. I. c. 2. p. 24.

XXXI. Ubi

SELECTÆ SENTENT. 5

XXXI. Ubi expletus est aliquis, facilius concoquit; si quicquid assumpsit: portione aquæ frigidæ includit, tam paulisper invigilat, deinde bene dormit. L. 1. c. 2. p. 24.

XXXII. Neque ex salubri loco in gravem, neque ex gravi in salubrem transitus satis tutus est. L. 1. c. 3. p. 24.

XXXIII. Neque verò ex multa fame nimis satietas, neque ex nimia satietate fames idonea est. L. 1. c. 3. p. 24.

XXXIV. Periclitatur & qui semel & qui bis die cibum incontinenter contra consuetudinem assumit. L. 1. c. 3. p. 25.

XXXV. Neque ex nimio labore subitum ocium, neque ex nimio ocio subitus labor sine gravi noxa est.

XXXVI. Cum quis mutare aliquid velit, paulatim debet assuescere. L. 1. c. 3. p. 25.

XXXVII. Nimis ociosa vita utilis non est, quia potest incidere laboris necessitas. L. 1. c. 3. p. 25.

XXXVIII. Illud nosse oportet quod ex labore sudanti frigidæ potio perniciosissima est, atque etiam cum sudor se remittit, itinere fatigatis inutilis. L. 1. c. 3. p. 26.

XXXIX. Levat lassitudinem etiam laboris mutatio: eumque, quem novum genus cujusdam laboris preffit, id quod in consuetudine est, reficit. L. 1. c. 3. p. 26.

XL. Quod contra consuetudinem est, nocet, seu molle, seu durum est. L. 1. c. 3. p. 27.

XLI. Ante omnia scire convenit naturam corporis : quia alii graciles , alii obesi sunt ; alii calidi , alii frigidiores , alii humidi , alii ficciores , alios adstricta , alios resoluta alvus exercet. L. I. c. 3. p. 27. & 28.

XLII. Raro quisquam non aliquam partem corporis imbecillam habet. L. I. c. 3. p. 28.

XLIII. Vomitus inutilis est gracilibus & imbecillum stomachum habentibus : utilis est plenis , & biliosis omnibus , si vel nimium se replerunt , vel parum concoxerunt. Nam siue plus est quàm quòd concoqui possit , periclitari ne corrumpatur non oportet : Si verò corruptum est , nihil commodius est , quàm id , qua via primum expelli potest , ejicere. L. I. c. 3. p. 29.

XLIV. (Vomitum) luxuriæ causa fieri non oportere confiteor. L. I. c. 3. p. 30.

XLV. Qui valere & senescere volet , (vomere) quotidianum non habeat. L. I. c. 3. p. 30.

XLVI. Dejectio autem medicamento petenda est , ubi venter suppressus parum reddit , ex eoque inflammationes , caligines , capitis dolores , aliaque superioris partis mala increfcunt. L. I. c. 3. p. 31.

XLVII. Sed purgationes quoque ut interdum necessariae sunt , sic , ubi frequentes sunt , periculum afferunt. Assuescit enim non ali corpus , & ob hoc infirmum erit , cùm omnibus morbis obnoxia maximè infirmitas sit. L. I. c. 3. p. 31.

XLVIII.

SELECTÆ SENTENT. 7

XLVIII. Vinum dilutius pueris, meracius senibus (convenit.) L. 1. c. 3. p. 32.

XLIX. Hyeme plus esse convenit minus, sed meracius bibere. At Vere paulum cibo demendum adjiciendumque potioni, sed dilutius tamen bibendum est. Æstate ut sæpius utendum cibo, sic exiguo est. Per Autumnum propter cæli varietatem periculum maximum est, itaque neque sine veste, neque sine calceamentis prodire oportet: Cibo verò jam pleniore uti licet, minus sed meracius bibere. L. 1. c. 3. p. 33. & 34.

L. Venus Hyeme non perniciofa, Vere tutissima: neque Æstate verò neque Autumno utilis est, tolerabilior tamen per Autumnum est. Æstate in totum, si fieri potest, abstinendum. L. 1. c. 3. p. 33. & 34.

LI. Capiti nihil æque prodest atque aqua frigida. L. 1. c. 4. p. 35.

LII. Semper post cibum conquiescere (oportet) neque intendere animum neque ambulatione quamvis leni dimoveri. L. 1. c. 6 p. 37.

LIII. Calor adjuvat omnia, quæ frigus infestat. L. 1. c. 9. p. 39.

Lib. II.

I. Saluberrimum Ver est, proxime deinde ab hoc Hyems, periculosior Æstas, Autumnus longè periculosissimus. Ex tempestatibus verò optimæ æquales sunt five
fri-

frigidaë , five calidaë : Pessimæ quæ variant maximè : quo fit ut Autumnus plurimos opprimat. L. II. c. I. p. 42.

II. Saluberrimi sunt sereni dies : meliores pluviï , quàm tantùm nebulosi , optimique Hyeme qui omni vento vacant : Æstate , quibus favonii perflant. Si genus aliud ventorum est , salubriores septentrionales quam subsolani vel austri sunt. L. II. c. I. p. 42.

III. Ventus ubique ferè à mediterraneis regionibus veniens salubris , à mari gravis. L. II. c. I. p. 43.

IV. Pessimum ægro est cælum , quod ægrum fecit. L. II. c. I. p. 43.

V. Ætas media tutissima est , quia neque juventæ calore , neque senectutis frigore infestatur. L. II. c. I. p. 43.

VI. Longis morbis senectus acutis adolescentia magis patet. L. II. c. I. p. 43.

VII. Corpus autem habilissimum , quadratum est , neque gracile neque obesum : Nam longa statura , ut in juvena decora est , sic matura senectute conficitur : Corpus gracile , infirmum : obesum hebes est. L. II. c. I. p. 43.

VIII. Inimicior senibus hiems , æstas adolescentibus est. L. II. c. I. p. 46.

IX. Omnis pueritia primum circa quadragesimum diem , deinde septimo mense , tum septimo anno , postea circa pubertatem periclitatur. L. II. c. I. p. 46.

X. Adolescentia morbis acutis , itemque comitialibus , tabique maxime objecta est. L. II. c. I. p. 47.

SELECTÆ SENTENT. 9

XI. Obesi plerumque acutis morbis, & difficultate spirandi strangulantur, subitoque sæpe moriuntur. L. II. c. 1. p. 47.

XII. Si speciosior & plenior aliquis & coloratior factus est, suspecta habere bona sua debet: quæ quia neque in eodem habitu subsistere, neque ultra progredi possunt, ferè retrò quasi ruina quadam revolvuntur. Pejus tamen signum est ubi aliquis contra consuetudinem emacruit, & decorem colorémque amisit, quoniam in his quæ superant, est quod morbus demat: in his quæ desunt non est quod ipsum morbum ferat. L. II. c. 2. p. 48.

XIII. Sunt quædam proprietates hominum, sine quarum notitia non facile quicquam in futurum præfagiri potest. L. II. c. 2. p. 49.

XIV. Facile securus est aliquis in iis quæ sæpe sine periculo evasit. L. II. c. 2. p. 49.

XV. Mali morbi testimonium est vehementer & crebro spirare. L. II. c. 4. p. 51.

XVI. Mali etiam morbi signum est nimis celeriter emacrescere. L. II. c. 4. p. 51.

XVII. Periculosum est etiam post arquatam morbum febrem oriri. L. II. c. 4. p. 52.

XVIII. Nulla acuta febris leviter terre nos debet. L. II. c. 4. p. 52.

XIX. Vomitus sinceræ pituitæ vel bilis periculosus, pejorque si viridis aut niger est: at mala urina est in qua subsidunt
sub-

subrubra aut livida, deterior, in qua quasi fila quædam tenuia atque alba, pessima ex his si tanquam ex furfuribus factas nubeculas repræsentat, diluta quoque atque alba vitiosa est, sed in phreneticis maximè. Alvus autem mala est ex toto suppressa. Periculosa etiam quæ inter febres fluens, conquiescere hominem in cubili non patitur; utique, si quod descendit, est perliquidum, aut albidum aut pallidum, aut spumans. Item quod excernitur malum est, exiguum, glutinosum, lividum, biliosum, cruentum, aut peioris odoris quam consuetudine, malum est & sincerum. L. II. c. 4. p. 52.

XX. Urina verò rubra & tenuis in magna cruditate esse consuevit. Pessima tamen est, præcipuè que mortifera, nigra, crassa, mali odoris. Alvus quoque varia & discreta reddens, pestifera est: sed ægrum in præcipiti jam esse denuntiat, quæ liquida, eademque vel nigra, vel pallida, vel pinguis est, utique si magna foeditas odoris accessit. L. II. c. 6. p. 56.

XXI. Qui spumantem sanguinem excreant, his in pulmone vitium est. L. II. c. 7. p. 61.

XXII. Mulieri si lac ex mammis profuit, imbecillum est quod intus gerit, duræ mammæ sanum illud esse testantur. L. II. c. 7. p. 62.

XXIII. Quibus causa doloris, neque sensus ejus est, his mens laborat. L. II. c. 7. p. 62.

XXIV. Si in ventrem sanguis confluit ibi in pus vertitur. L. II. c. 7. p. 62.

XXV.

SELECTÆ SENTENT. 11

XXV. Scire licet, inter ea quæ ars adhibet, naturam plurimum posse. L. 11. c. 8. p. 70.

XXVI. Omni resolutione nervorum ad medicinam non idonea sunt tempora hiems & autumnus; aliquid sperari potest vere & æstate. Isque morbus mediocris vix sanatur, vehemens sanari non potest. L. 11. c. 8. p. 76.

XXVII. Quartana æstiva brevis; autumnalis fere longa est, maxime quæ cœpit hieme appropinquante. L. 11. c. 8. p. 76.

XXVIII. Omne auxilium corporis aut demit aliquam materiam aut adjicit, aut evocat aut reprimat, aut refrigerat, aut calfacit, aut durat, aut mollit. L. 11. c. 9. p. 77.

XXIX. Sanguinem incisa vena mitti novum non est: sed nullum penè morbum esse in quo non mittatur, novum est. L. 11. c. 10. p. 77.

XXX. In mittendo sanguine non tam annos medicus numerare, quàm vires ægrotantis æstimare debet. L. 11. c. 10. p. 78.

XXXI. Tenuioribus magis sanguis, plenioribus magis caro abundat. L. 11. c. 10. p. 78.

XXXII. Satius est anceps experiri auxilium, quàm nullum. L. 11. c. 10. p. 79.

XXXIII. Cùm sit crudo minime mittendus sanguis, tamen ne id quidem perpetuum est, neque enim semper concoctionem res expectat: Nam si ex superiore

riore parte decidit aliquis, si contusus est, si ex aliquo subito casu sanguinem vomit: quamvis paulò antè sumpsit cibum, tamen protinus ei materia demenda est: idemque etiam in aliis repentinis casibus dictum sit. L. II. c. 10. p. 79.

XXXIV. Si morbi ratio patitur, sanguinis detractiōni tempus aptissimum est dies adversæ valetudinis secundus aut tertius. Sed ut aliquando etiam primo die sanguinem mittere necesse est, sic nunquam utile post diem quartum est, cum jam spatio ipso materia & exhausta est & corpus corrumpit, ut detractio imbecillum id facere possit, non possit integrum. L. II. c. 10. p. 80.

XXXV. Quòd si vehemens febris urget in ipso impetu ejus sanguinem mittere, hominem jugulare est. Expectanda ergo intermissio, & ista medicina ferè in bidduum dividenda: Satius enim est primò levare ægrum, deinde perpurgare, quàm simul omni vi effusa fortasse præcipitare. L. II. c. 10. p. 81.

XXXVI. Mittere autem sanguinem cùm sit expeditissimum usum habenti, tamen ignaro difficillimum est, juncta est enim vena arteriis, his nervi, ita si nervum scalpellus attigit, sequitur nervorum distentio ea quæ crudeliter hominem consumit. At arteria incisa neque coit neque sanescit, interdum etiam ut sanguis vehementer erumpat efficit. L. II. c. 10. p. 81.

XXXVII. Incidenda ad medium vena est, ex qua cum sanguis erumpit, colorem

SELECTÆ SENTENT. 13

rem habitumque ejus oportet attendere : Nam si is crassus & niger est , vitiosus est , ideoque utiliter effunditur : Si rubet & pellucet , integer est : eaque missio sanguinis adeò non prodest , ut etià noceat : protinusque is supprimendus est. L. II. c. 10. p. 81.

XXXVIII. Semper antè finis faciendus est , quàm anima deficiat. L. II. c. 10. p. 82.

XXXIX. Vehementi malo nisi æquè vehemens auxilium succurrere non potest. L. II. c. 11. p. 84.

XL. Medicamenta stomachum ferè lædunt. L. II. c. 12. p. 84.

XLI. Alvus si vehementius fluit , aut sæpius ducitur , hominem infirmit. L. II. c. 12. p. 84.

XLII. Medicamentum non semper ægris prodest , nocet semper sanis. L. II. c. 13. p. 87.

XLIII. Initia morborum primum famem sitimque desiderant , ipsi deinde morbi , moderationem , ut neque alius quàm expedit , neque ejus ipsius nimium sumatur. Neque enim convenit juxta inediam protinus satietatem esse. Quod si sanis corporibus etià inutile est , ubi aliqua necessitas famem fecit , quantò inutilius est in corpore ægro ? Neque ulla res magis adjuvat laborantem quàm tempestiva abstinentia. L. II. c. 16. p. 92.

XLIV. Pertinet ad rem omnium proprietates nosse. L. II. c. 18. p. 96.

XLV. Plus alimenti est in pane quàm in ullo alio cibo. L. II. c. 18. p. 97.

XLVI. Omne animal si lactens est, minus alimenti præstat. L. II. c. 18. p. 98.

XLVII. Omne ferum animal domestico levius est. L. II. c. 18. p. 99.

XLVIII. Ovum durum valentissimæ materiæ est; molle, vel forbile, imbecillissimæ. L. II. c. 8. p. 99.

XLIX. Brassica subcruda alvum movet, bis cocta stringit. L. II. c. 29. p. 106. L. II. c. 30. p. 107.

L. Ad cataplasma calefaciens valentior omnis farina est ex mulso, quàm ex aqua cocta. L. II. c. 33. p. 110.

Lib. III.

I. Natura repugnante nihil medicina proficit. Magis tamen ignoscendum medico est parum proficienti in acutis morbis quàm in longis, hîc enim breve spacium est, intra quod, si quod non profuit auxilium, æger extinguitur: ubi & mutationi remediorum & deliberationi tempus patet, aded ut rarò, si inter initia medicus accessit, obsequens æger sine illius vitio pereat. L. III. c. I. p. 112.

II. Illud ignorari non oportet, quòd non omnibus ægris eadem auxilia conveniunt. L. III. c. I. p. 112.

III. Oportet itaque ubi aliquid non respondit, non tanti putare authorem quanti ægrum, & experiri aliud atque aliud. L. III. c. I. p. 112.

IV. In

SELECTÆ SENTENT. 15

IV. In acutis morbis ferius æger alendus est , ut primò dempta materia impetum frangat : In longis maturius , ut sustinere spatium affecturi mali possit. L. III. c. 2. p. 114.

V. Multum interest ab initio quis rectè curatus sit , an perperam , quia curatio minus his prodest in quibus assiduè frustra fuit. L. III. c. 2. p. 114.

VI. Omnium optima sunt quies & abstinentia : solaque abstinentia sine ullo periculo medetur. L. III. c. 2. p. 114. & 115.

VII. Non dubium est quin vix quisquam , qui non dissimulavit , sed per hæc maturè morbo occurrit , ægrotet. L. III. c. 2. p. 115.

VIII. Asclepiades officium esse medici dicit , ut tutò , ut celeriter , ut jucundè curret , id votum est , sed ferè periculosa esse nimium & festinatio , & voluptas solet. Qua verò moderatione utendum sit ut quantum fieri potest omnia ista contingant , quæritur qua ratione primis diebus æger continendus sit. Antiqui medicamentis quibusdam datis concoctionem moliebantur , eò quòd cruditatem maximè horrebant. Deinde eam materiam quæ lædere videbatur , ducendo sæpius alvum subtrahabant. Asclepiades , medicamenta sustulit , alvum non toties , sed ferè tamen in omni morbo subduxit. Febre verò ipsa infestante se remedio hoc uti professus est , convellendas enim vires ægri putavit , luce , vigilia , siti ingenti , sic , ut ne eos qui-

V 3

dem

dem primis diebus elui fineret. Quo magis falluntur qui per omnia jucundam ejus disciplinam esse contendunt. Etenim ulterioribus quidem diebus cubantis etiam luxuriæ subscripsit, primis verò tortoris vicem exhibuit. Ego autem medicamentorum dari potiones & alvum duci non nisi rarò debere concedo. Et id non ideo tamen agendum, ut ægri vires convellantur existimo: quoniam ex imbecillitate summum periculum est. Minui ergo tantum exsuperantem materiam oportet, quæ naturaliter digeritur ubi nihil novi accedit. Itaque abstinendus à cibo primis diebus, in luce habendus æger, nisi infirmus interdiu est, isque cubare quam maximo conclavi debet. Quod ad sitim verò formumque pertinet, moderandum id est, ut interdiu vigilet, noctu, si fieri potest, conquiescat: ac neque potet, neque nimium siti crucietur. Os etiam ejus elui potest, ubi & siccum est & ipsi fœtet, quamvis id tempus aptum potioni non est: Commodèque Erasistratus dixit, sæpe inferiore parte humorem non requirente, os & fauces requirere. L. III. c. 4. p. 117, 118, 119.

IX. Optimum medicamentum est opportunè cibus datus, qui quando primum dari debeat quæritur, aliis quintum diem, aliis sextum expectantibus. Asclepiades ubi ægrum triduo per omnia fatigaverat, quarto die cibum indulgebat. At Themison non quando cœpisset febris, sed quando delisset aut certe levata esset, & ab illo

SELECTÆ SENTENT. 17

lo tempore expectato die tertio cibum dabat. Nihil autem horum utique perpetuum est: nam potest primo die dari, potest secundo, potest tertio, potest non nisi quarto aut quinto. potest post unam accessionem, potest post duas, potest post plures. Refert enim qualis morbus sit, quale corpus, quale cœlum, quæ ætas, quod tempus anni; minimeque in rebus multum inter se differentibus perpetuum esse præceptum temporis potest. L. III. c. 4. p. 119.

X. Illud est unum semper & ubique servandum, ut ægri vires subinde assidens medicus inspiciat, & quandiu supererunt, abstinencia pugnet: Si imbecillitatem vereri cœperit, cibo subveniat. Id enim ejus officium est, ut ægrum neque supervacua materia oncret, neque imbecillitatem fame perdat. L. III. c. 5. p. 120.

XI. Antiquos admodum celebres Pythagorici numeri fefellerunt, cum hîc medicus non numerare dies debeat, sed ipsas accessiones intueri, & ex his conjectare quando cibus dandus sit. L. III. c. 4. p. 122.

XII. Fere graviorem accessionem levior nox sequitur, quo fit, ut graviorem accessionem nox quoque tristior antecedit. L. III. c. 5. p. 124.

XIII. Matutinum tempus remissius ferè est ægris. L. III. c. 5. p. 125.

XIV. A tempore meridiano omnis æger ferè peior fit. L. III. c. 5. p. 125.

XV. Matutinum tempus natura sua levissimum est. L. III. c. 5. p. 125.

XVI. Integro corpore, cibo tempus aptius est. L. III. c. 6. p. 126.

XVII. Scire oportet optimum cibo tempus esse febre finita. L. III. c. 5. p. 127.

XVIII. Cum ægros semper securos agere conveniat, ut corpore tantum non etiam animo laborent, tum præcipuè ubi cibum sumpserunt: itaque si qua sunt quæ exasperatura sunt eorum animos, optimum est ea dum ægrotant eorum notitiæ subtrahere. L. III. c. 5. p. 127.

XIX. Venis maxime credimus, fallacissimæ rei, quia sæpe istæ lentiores celerioresve sunt, & sexu, & ætate & corporum natura. L. III. c. 6. p. 129.

XX. Periti medici est non protinus, ut venit, apprehendere manu brachium, sed primum residere hilari vultu, percontarique quemadmodum se habeat: & si quis ejus metus est, eum probabili sermone lenire: tum deinde ejus corpori manum admove. L. III. c. 6. p. 129.

XXI. Medicus neque in tenebris neque à capite ægri residere debet, sed illustri loco adversus eum, ut omnes notas ex vultu quoque cubantis perspiciat. L. III. c. 6. p. 130.

XXII. Cibus febricitantibus humidus est aptissimus, aut humori certe quam proximus: utique ex materia quam levissima; maximeque sorbitio, eaque si magnæ febres fuerunt, quam tenuissima esse debet. L. III. c. 6. p. 130.

XXIII.

XXIII. Apponendi sunt ægro varii cibi, sicut Aſclepiades præcepit, tum demum ubi fastidio urgetur, neque ſatis vires ſufficiunt, ut paulum ex ſingulis deguſtando famem vitet. At ſi neque vis neque cupiditas deest, nulla varietate ſollicitandus æger eſt, ne plus aſſumat quàm concoquat. Neque verum eſt quod ab eo dicitur, facilius concoqui varios cibos: eduntur etiam facilius, ad concoctionem autem materiæ genus & modus pertinent. L. III. c. 6. p. 131.

XXIV. Neque inter magnos dolores, neque increſcente morbo tutum eſt ægrum impleri cibo, ſed ubi inclinata jam in melius valitudo eſt. L. III. c. 6. p. 131.

XXV. Id quoque videndum eſt quod quidam ſolum præcipiunt, aſtriſtum corpus ſit, an profluat. Quorum alterum ſtrangulat, alterum digerit. nam ſi aſtriſtum eſt, ducenda alvus eſt, movenda urina, eliciendus omni modo ſudor: contra ſi profluat, ſudor coercendus, quies adhibenda erit, tenebris ſomnoque quando-cunque volet, utendum, non niſi levi geſtatione corpus agitandum, & pro genere mali ſubveniendum. L. III. c. 6. p. 132.

XXVI. In febre peſtilente minime utile eſt aut fame aut medicamentis uti, aut ducere alvum. Si vires ſinunt, ſanguinem mittere optimum eſt, præcipuéque ſi cum dolore febris eſt. L. III. c. 7. p. 133.

XXVII. Ex toto, non ſic pueri, ut viri, curari debent. L. III. c. 7. p. 134.

XXVIII.

XXVIII. Non facile sanguinem mittere, non facile ducere alvum, non cruciari vigilia fameve aut nimia siti, non vino curare satis convenit. L. III. c. 7. p. 134.

XXIX. Cum vero in summo incremento morbus est, utique non ante diem quartum magna siti antecedente, frigida aqua copiosè præstanda est, ut bibat etiam ultra satietatem, & cum jam venter & præcordia ultra modum repleta sunt satisque refrigerata, vomere debet. Quidam ne vomitum quidem exigunt, sed ipsa aqua frigida tantum ad satietatem data pro medicamento utuntur. Ubi utrumlibet factum est, multa veste operiendus est & collocandus ut dormiat, ferèque post longam sitim & vigiliam, post multam satietatem, post infractum calorem, plenus somnus venit, per quem ingens sudor effunditur: idque præsentissimum auxilium est: sed in his tamen in quibus præter ardorem nulli dolores, nullus præcordiorum tumor: nihil prohibens vel in thorace, vel in pulmone, vel in faucibus, non ulcus, non defectio, non dejectio, non profluvium alvi fuit. L. III. c. 7. p. 135.

XXX. Cum eadem omnibus convenire non possunt, ferè quos ratio non restituit, temeritas adjuvat. L. III. c. 9. p. 138.

XXXI. Notæ inflammationis sunt quatuor, rubor & tumor, cum calore & dolore. L. III. c. 10. p. 139.

XXXII. Sæpe etiam pertinacia juvantis,
malum

SELECTÆ SENTENT. 21

malum corporis vincit. L. III. c. 12. p. 142.

XXXIII. Quartana neminem jugulat ; sed si ex ea facta quotidiana est , in malis æger est. Quod tamen nisi culpa vel ægri vel curantis , nunquam fit. L. III. c. 15. p. 146.

XXXIV. Vetus quartana rarò nisi vere solvitur. L. III. c. 16. p. 147.

XXXV. Si quartana quievit , diu meminisse ejus diei convenit , eoque vitare frigus , calorem , cruditatem , lassitudinem , facile enim revertitur nisi à sano quoque aliquandiu timetur. L. III. c. 16. p. 147.

XXXVI. Ex phreneticis alii hilares, alii tristes sunt , alii facilius continentur & intra verba desipiunt , alii insurgunt & violentè quædam manu faciunt , atque ex his ipsis alii nihil nisi impetu peccant , alii etiam artes adhibent , summamque speciem sanitatis in captandis majorum operum occasionibus præbent , sed exitu deprehenduntur. Ex his autem eos qui intra verba desipiunt , aut leviter etiam manu peccant , onerare asperioribus coërcitionibus super-
vacuum est : eos verò qui violentius se gerunt vincere convenit , ne vel alteri vel sibi noceant. Neque credendum est si victus aliquis dum levare vinculis cupit , sanum jam se fingat , quamvis prudenter & miserabiliter loquantur , quoniam is dolus insanientis est. Adversus omnium sic insanientium animos gerere se pro cujusque natura necessarium est. L. III. c. 18. p. 149. & 151.

XXXVII.

XXXVII. Asclepiades perinde esse dixit his sanguinem mitti, ac si trucidentur, rationem hanc sequutus, quod neque infania esset nisi cum febre intenta, neque sanguis nisi in remissione ejus, rectè mitteretur, L. III. c. 18. p. 150.

XXXVIII. Multa in præcipiti periculo rectè fiunt, aliàs omittenda. L. III. c. 18. p. 150.

XXXIX. Phreneticis, somnus difficilis & præcipuè necessarius est; sub hoc enim plerique sanescunt. L. III. c. 18. p. 152.

XL. Somnus illis medicamentis accersendus est (quæ soporifera sunt,) habita scilicet eadem moderatione quæ hîc necessaria est, ne quem obdormire volumus, excitare postea non possimus. L. III. c. 18. p. 153.

XLI. Neque ignorare oportet leviozem esse morbum cum risu quàm serio infanientium. L. III. c. 18. p. 154.

XLII. Aquæ inter cutem tres species sunt: communis est humoris nimia abundantia, ob quam ne ulcera quidem in his ægris facîle sanescunt. L. III. c. 21. p. 160. 161.

XLIII. Facilius in servis quàm in liberis tollitur (*hydropisis*) quia cum desideret famem, sitim, & mille alia tædia, longamque patientiam, promptius his succurritur qui facîle coguntur, quàm quibus inutilis libertas est. Sed ne hi quidem qui sub alio sunt, si ex toto sibi temperare non possunt, ad salutem perducuntur. Ideoque non ignobilis medicus Chryssippi discipulus

lus apud Antigonom regem amicum quendam ejus, notæ intemperantiæ, mediocriter eo morbo implicitum, negavit posse sanari. Cumque alter medicus Epirotes Philippus se sanaturum polliceretur, respondit, illum ad morbum ægri respicere, se ad animum. Neque eum res fefellit. Ille enim cum summa diligentia non medici tantummodo sed regis custodiretur, tamen malagmata sua devorando, bibendoque suam urinam, in exitium se præcipitavit. L. III. c. 21. p. 161.

XLIV. Inter initia non difficillima curatio est, si imperata sunt, quies, sitis, inedia. At si malum inveteravit, non sine magna molestia discutitur. L. III. c. 21. p. 161.

XLV. Multum ambulandum, currendum aliquando est, superiores maximè partes sic perfricandæ ut spiritum ipse contineat. Evocandus est sudor non per exercitationem tantum sed etiam in arena calida, vel Laconico, vel clibano similibusque aliis: maximèque utiles naturales & siccæ sudationes sunt, quales super Bajas habemus in myrtetis. Balneum atque omnis humor alienus est. L. III. c. 21. p. 162.

XLVI. Potio non ultra danda est quàm ut vitam sustineat, optimaque est quæ urinam movet. L. III. c. 21. p. 162.

XLVII. Hydropicis alvum moliri cibo melius est quàm medicamento. L. III. c. 21. p. 162.

XLVIII. Non alienum erit metiri potio-

24 AUR. CORN. CELSI

nem hydropici & urinam, nam si plus humoris excernitur quam assumitur, ita demum secundæ valetudinis spes est. L. III. c. 21. p. 163.

XLIX. Ubi convaluit aliquis (*ex hydrope*) diu tamen alienus ei veneris usus sit. L. III. c. 121. p. 166.

L. Qui de phthisi dubitant an sit hac nota utuntur: Quod excreatum est si in ignem impositum mali odoris est. L. III. c. 22. p. 168.

LI. Phthisis ætate firmissima maximè oritur, id est ab anno duo de vigesimo usque ad annum quintum & trigésimum. L. III. c. 22. p. 169.

LII. Lac quod in capitis doloribus & in acutis febribus pro veneno est, in phthisi tamen sicut in omnibus longis difficilibusque febriculis rectè dari potest. L. III. c. 22. p. 170.

LIII. Comitialis morbus sæpius viros quàm fœminas occupat. L. III. c. 23. p. 172.

LIV. Omnis vomicæ finis est ut rumpatur. L. III. c. 27. p. 181.

Lib. IV.

I. Nihil pestiferum est, nisi quod pulmonem exulcerat. L. IV. c. 3. p. 191.

II. Alvus ducta sæpe superiores partes resolvit. L. IV. c. 3. p. 195.

III. Sæpe fœminæ quibus sanguis per menstrua non respondet, hunc exspuunt. L. IV. c. 4. p. 202.

IV. Exercitatio quæ superiores partes maximè

SELECTÆ SENTENT. 25

maximè moveat in omnibus stomachi vitiis aptissima est. L. iv. c. 5. p. 206.

V. In omnibus stomachi vitiis præcipiendum est, ut, quo modo se quisque æger refecerit, eodem sanus utatur. L. iv. c. 5. p. 206.

VI. Peripneumonia plus periculi quàm doloris habet. L. iv. c. 7. p. 212.

VII. Uno die fluere alvum sæpe pro valetudine est, atque etiam pluribus dum febris ablit, & intra septimum diem conquiescat: Purgatur enim corpus, &, quod intus læsurum erat, utiliter effunditur. Verum spacium periculosum est: interdum enim tormina & febriculas excitat, viresque consumit: interdum autem evenit ut id neglectum pluribus diebus curari difficilimum sit. L. iv. c. 19. p. 229.

VIII. Quisque experimentis in se credere debet. L. iv. c. 19. p. 230.

IX. Medicamentis uti nisi in vehementibus malis supervacuum est. L. iv. c. 19. p. 232.

X. Podagricis equitare alienum est. L. iv. c. 25. p. 240.

XI. Quibus articulorum dolor certis temporibus revertitur, hos à curioso victu cavere oportet, ne inutilis materia corpori superfit. L. iv. c. 25. p. 240.

Lib. V.

I. Medicamentorum usum magna ex parte Asclepiades non sine causa sustulit, cum omnia ferè stomachum lædant, ma-

lique fucci sint: ad ipsius victus rationem potius omnem suam curam transtulit. Verum ut illud in plerisque morbis utilius est, sic multa admodum corporibus nostris incidere consueverunt, quæ sine medicamentis ad sanitatem pervenire non possunt. Illud ante omnia scire convenit, quod omnes medicinæ partes ita connexæ sunt, ut ex toto separari non possint, sed ab eo nomen trahant à quo plurimum petunt. Ergo ut illa quæ victu curat, aliquando medicamentum adhibet, sic illa quæ præcipuè medicamentis pugnat, adhibere etiam rationem victus debet, quæ multum admodum in omnibus malis corporis proficit. L. v. *præf.* p. 241.

II. Uti somniferis nisi nimia necessitas urget alienum est: sunt enim ex vehementibus medicamentis & stomacho alienis. L. v. c. 25. p. 278.

III. Est prudentis hominis primùm eum qui servari non potest, non attingere, ne videatur occidisse quem fors ipsius interemit. Deinde ubi gravis metus est, sine certa tamen desperatione, indicare necessariis periclitantis in difficili rem esse, ne si victa ars malo fuerit, vel ignorasse vel fefellisse videatur. Sed ut hæc prudenti viro conveniunt, sic rursus histrionis est parvam rem attollere, quo plus præstitisse videatur. L. v. c. 26. p. 183.

IV. Periculosa vulnere sunt ubicunque venæ majores sunt, quoniam exhaurire hominem profusione sanguinis possunt. L. v. c. 26. p. 284.

V. Pessima

SELECTÆ SENTENT. 27

V. Pessima quæque plaga curva est : tutissima , quæ lineæ modo recta est. L. v. c. 26. p. 284.

VI. Facilius fanescit puer vel adolescens quàm senior ; valens quàm infirmus : neque nimis tenuis , neque nimis plenus , quàm si alterum ex his est : Integri habitus quàm corrupti ; exercitatus quàm iners : sobrius & temperans , quàm vino venerique deditus. L. v. c. 26. p. 285.

VII. Opportunissimum curationi tempus , vernum est , aut certè neque fervens , neque frigidum ; si quidem vulnera & nimius calor , & nimium frigus infestant ; maximèque tamen horum varietas : ideoque perniciosissimus autumnus est. L. v. c. 26. p. 285.

VIII. Perniciosa febris est quæ vel levi vulnere supervenit ; vel ultra tempus inflammationis durat , vel delirium movet. vel si nervorum rigorem aut distentionem , quæ ex vulnere orta est , ea non finit. L. v. c. 26. p. 296.

IX. Vomitus biliosus non voluntarius vel protinus , ut percussus est aliquis , vel dum inflammatio manet , malum signum est in his duntaxat , quorum vel nervi , vel etiam nervosi loci vulnerati sunt. L. v. c. 26. p. 296.

X. Si lividus , aut pallidus , aut varius aut niger color est , scire licet malum vulnus esse. L. v. c. 26. p. 296.

XI. Album aut rubicundum esse vulnus commodissimum est. L. v. c. 26. p. 296.

XII. Opti-

28 AUR. CORN. CELSI

XII. Optimum medicamentum quies est. L. v. c. 26. p. 298.

XIII. Vinum omnibus dum febris, dum inflammatio est, alienum est. L. v. c. 26. p. 299.

XIV. Omnis cancer non solum id corrumpit quod occupavit, sed etiam serpit. L. v. c. 26. p. 30.

XV. Canceri initium quidem recipit curationem: ubi verò penitus infedit, insanabile est. plurimique sub frigido sudore moriuntur. L. v. c. 26. p. 301.

XVI. Vetus ulcus scalpello circumcidendum est, excidendæque ejus oræ, &, quidquid super eas livet, æque incidendum. L. v. c. 26. p. 301.

XVII. Omnis feræ morsus habent quoddam virus. L. v. c. 27. p. 307.

XVIII. Maxima pars venenorum frigore interimit. L. v. c. 27. p. 310.

XIX. Pus quo crassius & albicins est, eo periculi minus est. L. v. c. 28. p. 321.

XX. Pustulæ maximè vernis temporibus oriuntur. L. v. c. 28. p. 336.

Lib. VI.

I. Quo gravior inflammatio est, eo magis leniri medicamento debet. L. vi. c. 6. p. 353.

II. Aphthæ longe periculossissima sunt ulcera; sed in pueris, quos sæpe consumunt. L. vi. c. 11. p. 386.

III. In quibusdam hæmorrhoides parum tuto supprimuntur, qui sanguinis profluvio imbecilliores non fiunt, habent enim pur-

purgationem hanc, non morbum. L. VI. c. 18. p. 401.

Lib. VII.

I. Eadem medicamenta sæpe salutaria, sæpe vana sunt. L. VII. Præf. p. 405.

II. Esse chirurgus debet adolescens, aut certe adolescentiæ propior, manu strenua, stabili, nec unquam tremiscente, caque non minus sinistra quam dextra promptus, acie oculorum acri, claraque; animo intrepidus, immisericors, sic, ut sanari velit eum, quem accepit, non ut clamore ejus motus, vel magis, quam res desiderat, properet, vel minus, quam necesse est, fecet; sed perinde faciet omnia, ac si nullus ex vagitibus alterius affectus oria-
tur. L. VII. Præf. p. 406.

III. Fere sine cicatrice potest esse is locus, qui expertus ferrum non est. L. VII. c. 2. p. 409.

IV. Semper ubi scalpellus admovetur, id agendum est, ut & quàm minimæ & quàm paucissimæ plagæ sint: cum eo tamen, ut necessitati succurramus, & in modo & in numero L. VII. c. 2. p. 409.

V. Medici partium est, eniri ad rep-
erendam sanitatem. L. VII. c. 3. p. 411.

VI. Duo genera curationum sunt, alia, in quibus eligere tempus non licet, sed utendum est eo, quod incidit; sicut in vulneribus & fistulis: alia, in quibus nullus dies urget, & expectare tutissimum & facile est, sicut evenit in iis quæ & tardè increſcunt, & dolore non cruciant. L. VII. c. 7. p. 424.

BASILEÆ,

Typis EMANUELIS THURNISIÆ.

1756.





A. C. Celsi S. P. 28. v. S. Sanitorii
de med. Ratica. S. III. aphor. 7.
Si nocturna tibi noceat pu
tio vini
Hoc tu manè bibas iterum.
fecrit medicina.

Alley

A



PATHOLOGY SPECIAL

61 E 10

PAYNE

29174

Sweating Sickness.

By H. Stubbe.

4to.

London 1671



